

## 急救理论知识考试试题库及答案

1、一患 MODS 病人，在呼吸机机械通气期间，口腔培养为绿脓杆菌感染，细菌来源可能性小的是

- A、床上用品
- B、口腔菌群感染
- C、暖瓶塞
- D、医护人员的手
- E、水龙头

答案：B

2、患者，女，23 岁。因被路人发现晕倒在地而送来急诊，体检：神志恍惚，瞳孔缩小，呼出气无特殊气味，心率 120 次/分，律齐，BP90/60mmHg,上臂可见多处注射针眼该患者最有可能的诊断是

- A、有机磷中毒
- B、鸦片类中毒
- C、乙醇中毒
- D、口服地西洋中毒
- E、以上都不是

答案：B

3、常用抗精神类药物的并发症以下除外

- A、幻觉
- B、动作迟缓
- C、片状皮疹
- D、直立性虚脱

答案：A

4、烧伤后血容量减少最快的时间是

- A、伤后 10 小时
- B、伤后 8 小时
- C、伤后 7 小时
- D、伤后 2~3 小时
- E、伤后 9 小时

答案：D

5、心肺复苏指南中胸外按压的部位为\_\_\_\_\_。

- A、双乳头之间胸骨正中部
- B、心尖部
- C、胸骨中段

D、胸骨左缘第五肋间

答案：A

6、关于胸导联电极的安放，下列不正确的是

A、V1-----胸骨右缘第四肋间

B、V2-----胸骨左缘第四肋间

C、V3-----V2 与 V4 连线中点

D、V5-----左腋前线 V4 水平处

E、V6-----左腋中线水平处

答案：E

7、下列进行破伤风抗毒素脱敏注射，正确的一项是：

A、分 2 次，剂量一样，平均每隔 20 分钟一次

B、分 2 次，剂量一样，平均每隔 20 分钟一次

C、分 2 次，剂量一样，平均每隔 20 分钟一次

D、分 4 次，剂量由小到大，平均每隔 20 分钟一次 E 分 4 次，剂量由大到小，平均每隔 20 分钟一次

答案：D

8、有机磷农药中毒所致的呼吸肌瘫痪应选用

A、新斯的明

B、琥珀酰胆碱

C、阿托品

D、解磷定

E、可拉明

答案：D

9、下列哪一项对腰椎穿刺描述不正确

A、了解颅内压

B、了解脑脊液性状、细胞数和生化改变

C、了解有无颅内感染

D、可以引流脑脊液及椎管内给药

E、属常规检查，不需要签置知情同意书

答案：E

10、下列哪项是引起心电-机械分离的原因

A、冠状动脉粥样硬化性心脏病

B、休克

C、严重心肌损伤

D、麻醉

答案：C

11、下列哪组属于甲类传染病

- A、鼠疫、霍乱；
- B、传染性非典型肺炎，人感染高致病性禽流感；
- C、肺结核、肺炭疽。

答案：A

12、大量饮清水后尿量增多，主要是由于

- A、肾小球滤过率↑
- B、血浆胶体渗透压↓
- C、抗利尿激素分泌↓
- D、醛固酮分泌↓
- E、囊内压↓

答案：C

13、下列哪种情况不是使用洋地黄的禁忌症

- A、低钾引起的室性心律失常
- B、I度房室传导阻滞伴心力衰竭
- C、II度II型房室传导阻滞伴心力衰竭，无心脏起搏条件
- D、肥厚性主动脉瓣狭窄
- E、预激综合征并房颤

答案：B

14、癫痫的常见原因

- A、产伤
- B、颅内肿瘤
- C、脑炎
- D、脑囊虫病
- E、以上都是

答案：E

15、成人心肺复苏时胸外按压实施多久时间应交换按压操作为

- A、5分钟
- B、3分钟
- C、10分钟
- D、2分钟

答案：D

16、下列哪一项为左侧心力衰竭最早最常见的症状

- A、咳嗽

- B、咯血
- C、心悸
- D、呼吸困难
- E、以上都正确

答案：D

17、患者，男性，23岁，踝关节扭伤6小时，局部肿胀、疼痛明显，需进行冷敷，其目的是

- A、促进末梢循环
- B、促进炎症的消散
- C、促进炎症的局限
- D、减轻局部出血、疼痛
- E、使血管扩张，减轻深部组织充血

答案：D

18、外伤性伤口处理的正确方法是

- A、自来水冲洗伤口
- B、碘酊涂擦伤口
- C、拔出刺入伤口的异物
- D、干净敷料保护伤口

答案：D

19、不属于血压监测四定原则的是

- A、定时间
- B、定听诊器
- C、定部位
- D、定血压

答案：B

20、服用某些磺胺药时同服碳酸氢钠的目的是

- A、预防过敏反应
- B、避免影响血液酸碱度
- C、增加药物疗效
- D、增加尿中药物溶解度析出结晶
- E、减少消化道反应

答案：D

21、重症中暑热衰竭的突出表现为

- A、高热
- B、肌肉疼痛

- C、脑水肿
- D、周围循环衰竭
- E、急性肝衰竭

答案：D

22、判断病人是否出现心跳骤停时，在判断病人反应和检查循环体征的时间均不要超过（）秒

- A、5 秒
- B、10 秒
- C、20 秒
- D、30 秒

答案：B

23、某病人，男性，67岁，冠心病史20余年，在全麻、低温体外循环下行冠脉搭桥术，术中置入桡动脉压监测管，术后进入ICU治疗进入ICU后，对病人进行动态监测及护理，针对桡动脉压监测，下列错误的护理是

- A、严格无菌操作，防止感染
- B、每4~6h调试零点一次
- C、保持导管通畅，防止凝血或血液流入换能器
- D、观察动脉穿刺部位是否有出血、红肿
- E、可经桡动脉穿刺管输入药物

答案：E

24、关于心律失常的治疗下述哪项是错误的

A、面部降温法也称潜水反射法，患者取坐位，嘱其深吸气后摒气并迅速将面部浸入装有5~10℃的冷水的脸盆中，或用冰冻后的毛巾冷敷面部，用于治疗阵发性室上性心动过速

B、抗凝治疗是我国慢性房颤患者治疗的薄弱环节，大量的患者由于没有得到及时规范的抗凝治疗而发生了血栓栓塞性疾病。因此必须要加强对抗凝治疗的重视和宣传，让患者得到及时正规的治疗

C、电复律疗法的危险性较大，故应在较轻的心律失常患者使用

D、对于目击下发生的室颤，急救时如果现场有除颤器，必须立即为患者实施电击除颤，绝不能因为实施其他抢救措施（如胸外心脏按压、气管插管、静脉注射利多卡因等）而延误电击除颤

E、如果患者为较重的心律失常，故现场急救时应原则上首选电复律，其次选择静脉用药。由于口服药物起效较慢，只有在无法静脉用药的情况下才能口服给药

答案：C

25、高钙血症的血清钙浓度应大于

- A、1.2mmol/L
- B、2.2mmol/L
- C、2.6mmol/L
- D、4.8mmol/L
- E、10.5mmol/L

答案：C

26、不会影响 SP02 监测的因素是

- A、血红蛋白的质量
- B、脉搏的强弱
- C、血液中的静脉燃料
- D、肤色深浅
- E、放置探头距离心脏的位置

答案：E

27、下列哪种病人可采用催吐法进行治疗：

- A、昏迷
- B、惊厥
- C、胃底静脉曲张
- D、强酸强碱中毒
- E、误服敌敌畏且神志清醒者

答案：E

28、心电图可见无法辨认的 QRS 波群及 ST 段、T 段、频率 450-500 次/分，  
诊断室

- A、房扑
- B、窦性停搏
- C、窦性自搏心律
- D、室扑
- E、室颤

答案：E

29、冠心病患者出现心前区收缩期喀喇音及收缩晚期吹风样杂音，是由于

- A、心室壁瘤
- B、心力衰竭
- C、二尖瓣相对性关闭不全
- D、乳头肌功能不全致二尖瓣脱垂
- E、室间隔穿孔

答案：D

30、成批伤员出现，现场分类时，对随时有生命危险，即危及呼吸、循环、意识的患者（如窒息、大出血、休克，室颤），应标记为

- A、绿色
- B、黄色
- C、红色
- D、黑色

答案：C

31、一氧化碳中毒时最容易遭受损害的脏器是：

- A、肺和脑
- B、脑和心脏
- C、肝和肾
- D、胰腺
- E、肾和肺

答案：B

32、支气管哮喘发作时，下列哪些因素能降低支气管扩张剂的疗效

- A、酸中毒
- B、缺氧未纠正
- C、感染未控制
- D、未并用糖皮质激素
- E、未充分补液

答案：A

33、仅对强烈刺激可有较弱的防御反应，此为

- A、昏睡
- B、嗜睡
- C、轻度昏迷
- D、中度昏迷

答案：B

34、下列各项中错误的是

- A、医护人员在采血 输血前后要洗手
- B、每批一次性注射器均应注明出厂日期 消毒日期和有效期
- C、使用过的一次注射器 输血器材应消毒毁形或焚烧
- D、实验工作人员不能用口吸管，处理污物时要带手套
- E、艾滋病的潜伏期内无传染性

答案：E

35、胸外心脏按压时，外周动脉收缩压不应低于

- A、5. 3KPa40mmHg
- B、6. 7KPa50mmHg
- C、8. 0KPa60mmHg
- D、9. 3KPa70mmHg
- E、10. 6KPa80mmHg

答案：C

36、下列哪项不是监护型救护车技术性能要求。

- A、最高时速不低于 160km/小时；
- B、具有外接电源 220 伏可变电源；
- C、固定供氧；
- D、自动充气轮胎。

答案：D

37、哮喘持续状态是指经一般支气管扩张药治疗后仍有

- A、大量黏脓痰
- B、明显发绀
- C、哮喘 24 小时以上
- D、肺不张
- E、浅昏迷

答案：C

38、骨盆骨折最危险的并发症是

- A、骨盆腔出血
- B、膀胱破裂
- C、尿道断裂
- D、骶丛神经损伤
- E、直肠损伤

答案：A

39、以下哪项方法不适合治疗急性一氧化碳中毒

- A、高压氧舱；
- B、脱水；
- C、改善脑代谢；
- D、输鲜血浆。

答案：D

40、判断急性有机磷患者洗胃是否彻底可参考

- A、洗胃液量



- B、洗出液是否澄清无味
- C、临床症状是否好转
- D、洗出液量

答案：B

41、男性，20岁。肌注青霉素后突然昏倒，血压测不到，最主要的抢救措施是

- A、立即静脉滴注低分子右旋糖酐
- B、静脉滴注地塞米松
- C、立即静脉注射肾上腺素
- D、静脉滴注间羟胺

答案：C

42、下列哪一种疾病，最易发生呼吸衰竭

- A、阻塞性肺气肿
- B、肺癌
- C、细菌性肺炎
- D、大量胸腔积液
- E、支气管扩张

答案：A

43、脑血栓形成最常见的病因是

- A、风湿性心脏病
- B、脑动脉粥样硬化
- C、高血压
- D、休克
- E、先天性脑底动脉瘤

答案：B

44、发生过敏性休克的时，先使病人平卧的目的时是

- A、防止发生创伤
- B、有利于脑部血液循环
- C、缓解呼吸困难
- D、方便抢救
- E、方便观察荨麻疹

答案：B

45、下列有关食物中毒的错误说法是

- A、可在一个家庭中发生
- B、发病与进食有关

- C、有腹痛症状
- D、患者的粪便中分离出不同的病菌

答案：D

46、一氧化碳中毒最早累及的器官是

- A、中枢神经系统
- B、心脏
- C、消化系统
- D、泌尿系统
- E、呼吸系统

答案：A

47、以下哪项方法不适合治疗急性一氧化碳中毒\_\_\_\_\_

- A、高压氧舱；
- B、脱水；
- C、改善脑代谢；
- D、输鲜血浆。

答案：D

48、经抢救治疗后，反应补充血容量成功的最好的临床指标是

- A、血压回升
- B、尿量增加
- C、体温回升
- D、精神平衡
- E、脉压下降

答案：B

49、重度有机磷中毒的主要表现是

- A、瞳孔明显缩小，大汗，流涎，视力模糊
- B、瞳孔明显缩小，大汗，流涎，步态蹒跚，腹泻
- C、瞳孔明显缩小，肌肉颤动，大汗，流涎，昏迷，肺水肿，呼吸衰竭
- D、瞳孔明显缩小，大汗，流涎，神志模糊，血压上升
- E、瞳孔明显缩小，大汗，流涎，肌肉颤动，心率加快

答案：C

50、急性脑血管疾病伴脑疝形成，最急需的措施是

- A、脑CT
- B、脑MIL1
- C、腰椎穿刺
- D、静脉滴注甘露醇

E、脑血管造影

答案：D

51、张力性气胸在危急状况下可用一粗针头在患侧第肋间锁骨中线处刺入胸膜腔。

A、2

B、3

C、4

D、5

答案：A

52、不属抢救设备管理的“四定”内容是：

A、消毒时间

B、品种

C、数量

D、位置

E、专人管理

答案：A

53、使用止血带止血时，应每隔多长时间放松3~5分钟

A、30分钟

B、35分钟

C、40分钟

D、45分钟

E、50分钟

答案：E

54、开放性气胸的紧急处理原则是：

A、立即缝合胸壁伤口

B、立即作胸腔穿刺抽气

C、用无菌纱布覆盖包扎伤口

D、立即做胸腔闭式引流

答案：C

55、高血压急症诊断依据哪个不正确

A、可能有高血压、肾炎、妊娠中毒等病史

B、突然出现剧烈头痛、头晕、恶心呕吐、心悸、烦躁不安、视力模糊、皮肤潮红等症状

C、血压急剧上升，收缩压超过200mmHg或舒张压超过130mmHg

D、口吐粉红色泡沫样痰

答案：D

56、成人心肺复苏开通气道时，伤病者头部后仰呈\_\_\_\_\_角度。

- A、90 度
- B、60 度
- C、30 度
- D、20 度

答案：A

57、有关急诊范围，下列哪项是错误的？

- A、急性疾病
- B、发热病人（体温大于 37 摄氏度）
- C、慢性疾病急性发作
- D、急性创伤

答案：B

58、胸部外伤后，胸壁软化，主要病理生理紊乱为

- A、吸气时软化区鼓起，呼气时内陷
- B、呼气时软化区鼓起，吸气时内陷
- C、二氧化碳潴留，缺氧
- D、呼吸循环衰竭
- E、胸内压力增高

答案：C

59、休克治疗的基本原则是()

- A、持气道畅通
- B、维持足够供气及换气
- C、制止出血
- D、维持足够血液循环
- E、以上都是

答案：E

60、刘某，在海中游泳时不甚溺水，被送到急诊室，查体：神志不清，口流海水，呼吸微弱，心率 45/min，血压 90/60mmHg，医生不在场，护士处理正确的是

- A、立即呼叫医生等待医嘱
- B、立即头偏一侧，吸出口腔异物，吸氧
- C、立即心外按压
- D、立即心电监护
- E、先测生命体征

答案：B

61、大面积严重烧伤病人转运前应首先

- A、持续中心静脉压测定
- B、彻底清创
- C、建立输液途径
- D、消毒敷料包扎创面以免再感染

答案：C

62、麻醉处方就保存几年？

- A、5年
- B、3年
- C、2年

答案：B

63、创伤性窒息的特征是：

- A、广泛皮下气肿
- B、泡沫样血痰
- C、颈静脉怒张
- D、面部、眼结膜、上胸部淤血
- E、呼吸时闻及喘鸣音

答案：D

64、下列哪种中毒不会引起中毒性溶血

- A、苯胺
- B、砷化氢
- C、毒覃
- D、亚硝酸盐
- E、硝基苯

答案：D

65、婴幼儿低钾血症的原因描述错误的是

- A、钾摄入量不足
- B、钾丢失增加
- C、钾分布异常
- D、各种原因的碱中毒
- E、呼吸性酸中毒

答案：E

66、多发伤急救现场处理错误的是()

- A、原则是不耽误抢救

- B、检查要简便易行
- C、尽量减少搬动伤员
- D、尽快将伤者移到安全地带
- E、必要时做心肺复苏

答案：D

67、在对心跳呼吸骤停患者进行基本生命支持时，以下哪种说法不正确。

- A、用6-10秒（不超过10秒）检查是否存在正常呼吸；
- B、对除怀疑颈椎损伤的所有病人使用仰头抬颏法开放气道；
- C、如果人工通气未使胸廓起伏，应继续进行人工通气直到有效胸廓起伏；
- D、每名急救人员最好只连续进行2分钟左右的胸外按压后轮换，以保证按压质量。
- E、对怀疑颈椎损伤的所有病人使用双手推举下颌法开放气道；

答案：C

68、室性心动过速的临床特点，下列哪项不符合

- A、症状突发突止
- B、心率162-200次/分，心律轻度不齐
- C、心尖区第一心音强弱不等
- D、诱发呕吐后发作突然终止或无变化
- E、大多有器质性心脏病

答案：D

69、病人，女，72岁，高处坠落致多发伤，下列不属于多发伤的临床特点的是

- A、创伤后全身反应严重、伤势变化迅速死亡率高
- B、失血量大，休克发生率高
- C、低氧血症发生率高
- D、免疫系统一般不受影响
- E、容易发生感染

答案：D

70、敌百虫中毒病人禁用下列哪种洗胃溶液

- A、生理盐水
- B、温开水
- C、2%~4%碳酸氢钠
- D、1:15000~1:20000高锰酸钾
- E、1%盐水

答案：C

71、属于钾通道阻滞剂，同时具有I、II类和III类作用的药物是

- A、阿托品
- B、胺碘酮
- C、利多卡因
- D、多巴胺
- E、镁剂

答案：B

72、以下关于有机磷农药中毒的论述哪些是错误的()

- A、有机磷农药是我国使用广泛、用量最大的杀虫剂
- B、临床上有机磷农药中毒主要包括急性中毒患者表现的胆碱能兴奋或危象，其后的中间综合征以及迟发性周围神经病
- C、有机磷中毒的烟碱样症状主要有恶心、呕吐、腹痛、多汗、流泪、流涕、流涎、腹泻、尿频、大小便失禁、心跳减慢、瞳孔缩小、支气管痉挛和分泌物增加、咳嗽、气急，严重时发生肺水肿
- D、中度有机磷中毒患者的胆碱酯酶活力一般在30%~50%
- E、早期彻底洗胃以及后续的间断洗胃是抢救有机磷中毒的关键措施之一

答案：C

73、眼睛被消毒液灼伤后，首先采取的正确方法是

- A、点眼药膏
- B、立即开大眼睑，用清水冲洗眼睛
- C、马上到医院看急诊

答案：B

74、气管切开术的方法包括()

- A、气管切开术
- B、经皮气管切开术
- C、环甲膜切开术
- D、微创气管切开术
- E、以上都是

答案：E

75、( ) 2972. 前胸刀刺伤、休克、颈静脉怒张，首先应考虑

- A、胸腔内大出血
- B、闭合性血胸
- C、开放性气胸
- D、心包填塞
- E、严重肺损伤

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/008027065102006035>