

2023 年执业药师之西药学综合知识与技能押题练习

试题 B 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、（2018 年真题）患者,女,34 岁,因易疲劳、体重增加、反应迟钝、肌肉痉挛就诊,化验结果显示 TSH 增高 FT3、FT4 减低,临床诊断为甲状腺功能减退使用左甲状腺素钠 100 μ g qd 治疗。药师对该患者的用药指导,正确的是（ ）

- A. 早餐后半小时,顿服
- B. 早餐前半小时,顿服
- C. 睡前顿服
- D. 晚餐后顿服
- E. 可在一天中任意时间服用

【答案】 B

2、药师日常承接的用药咨询以何种方式居多

- A. 被动方式
- B. 质问方式
- C. 指令方式
- D. 主动方式
- E. 教育方式

【答案】 A

3、（2017 年真题）慢性阻塞性肺病急性加重期伴脓痰者宜选用的治疗方案是（ ）

- A. 长效 β 2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素
- B. 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂

- C. 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素
- D. 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药
- E. 吸入型糖皮质激素+祛痰药+镇咳药

【答案】 C

4、口服避孕药可能导致

- A. 血白细胞减少
- B. 血清血红蛋白升高
- C. 血清总胆固醇升高
- D. 血清碱性磷酸酶升高
- E. 粪便细胞显微镜检出真菌

【答案】 C

5、治疗幽门螺杆菌感染的一线方案，其典型组方中不包括的药物是

- A. 胶体果胶铋
- B. 甲硝唑
- C. 克拉霉素
- D. 西咪替丁
- E. 兰索拉唑

【答案】 D

6、“将药物治疗的成本与所产生的效益归化为以货币为单位的数字，用以评估药物治疗方案的经济性”是指

- A. 最大效果分析

- B. 最小成本分析
- C. 成本-效益分析
- D. 成本-效用分析
- E. 成本-效果分析

【答案】 C

7、血尿酸升高的相关疾病是

- A. 流感
- B. 痛风
- C. 过敏性鼻炎
- D. 湿疹
- E. 恶性贫血

【答案】 B

8、“主要对成本进行量化分析、也同时考虑效果，用于两种或多种药物治疗方案的选择”是指

- A. 最大效果分析
- B. 最小成本分析
- C. 成本-效益分析
- D. 成本-效用分析
- E. 成本-效果分析

【答案】 B

9、干扰敏感细菌细胞壁黏肽的合成，使细菌细胞壁缺损的药物是

- A. 青霉素
- B. 链霉素
- C. 四环素
- D. 磺胺嘧啶
- E. 甲氧苄啶

【答案】 A

10、属于 C 级高危药品的是

- A. 血液透析液
- B. 全胃肠外营养液
- C. 5%葡萄糖注射液
- D. 50%葡萄糖注射液
- E. 0.9%氯化钠注射液

【答案】 A

11、中成药麻杏止咳片具有镇咳、祛痰、平喘的功效，与其合用可增加对心脏的毒性，引起心律失常的药物是.

- A. 甲氧氯普胺
- B. 复方利血平
- C. 氯苯那敏
- D. 地高辛
- E. 乳酶生

【答案】 D

12、血管紧张素转化酶抑制剂

- A. 阿米洛利
- B. 雷米普利
- C. 阿利吉仑
- D. 依普利酮
- E. 氨力农

【答案】 B

13、（2019年真题）患者，男，34岁，有吸毒史。因过量使用阿片类药物昏迷入急诊抢救，表现为针尖样瞳孔、呼吸抑制，可选用的解救药物是

- A. 亚甲蓝
- B. 纳洛酮
- C. 二巯丙醇
- D. 维生素K
- E. 乙酰半胱氨酸

【答案】 B

14、慢性沙眼患者禁用的药品是

- A. 酞丁安滴眼剂
- B. 硫酸锌滴眼剂
- C. 利福平滴眼剂
- D. 醋酸可的松滴眼剂
- E. 磺胺醋酰钠滴眼剂

【答案】 D

15、患者,男,65岁,临床诊断:2型糖尿病、周围神经病变、冠心病。

- A. 选用美托洛尔缓释片不合理
- B. 单硝酸异山梨酯缓释片用量不合理
- C. 瑞格列奈片用量不合理
- D. 选用阿卡波糖片不合理
- E. 甲钴胺片用量不合理

【答案】 B

16、 $90\text{g/L} \leq \text{Hb}$ 量 $<$ 正常参考范围下限可诊断为

- A. 基本正常
- B. 轻度贫血
- C. 中度贫血
- D. 重度贫血
- E. 极重度贫血

【答案】 B

17、成人末梢血白细胞(WBC)计数正常参考区间是

- A. $180 \sim 220\text{g/L}$
- B. $170 \sim 200\text{g/L}$
- C. $(4.0 \sim 10.0) \times 10$
- D. $(15.0 \sim 20.0) \times$
- E. $(6.0 \sim 7.0) \times 10$

【答案】 C

18、可提示完全梗阻性黄疸的是

A. STB $17.1 \mu\text{mol} / \text{L} \sim 34.2 \mu\text{mol} / \text{L}$

B. STB $34.2 \mu\text{mol} / \text{L} \sim 171 \mu\text{mol} / \text{L}$

C. STB $17.1 \mu\text{mol} / \text{L} \sim 171 \mu\text{mol} / \text{L}$

D. STB $>342 \mu\text{mol} / \text{L}$

E. STB $<85.5 \mu\text{mol} / \text{L}$

【答案】 D

19、运动员禁用药物中，利尿剂产生的危害是

A. 诱发高血压、冠心病、心肌梗死、脑动脉硬化和脑血管破裂，以及引起肝癌、肾癌等疾患

B. 能使伤口进一步恶化、导致呼吸困难和药物依赖

C. 易造成人体严重脱水、肾衰竭

D. 长期使用后突然停药，则会引发心跳过速、心肌梗死，乃至突然死亡

E. 长期服用，会有头痛、心慌、焦虑、失眠、耳鸣、颤抖等不良反应

【答案】 C

20、药物对医学检查指标异常结果的影响,可能导致血清总胆固醇升高的药物是

A. 氯氮平

B. 胰岛素

C. 苯妥英钠

D. 阿司匹林

E. HMG-CoA 还原酶抑制剂

【答案】 A

21、口服普萘洛尔用于解救

- A. 硝西泮中毒
- B. 瘦肉精中毒
- C. 苯丙胺中毒
- D. 氯丙嗪中毒
- E. 苯巴比妥中毒

【答案】 B

22、再生障碍性贫血、巨幼细胞性贫血可导致

- A. 红细胞生成过多
- B. 红细胞生成减少
- C. 红细胞丢失过多
- D. 血红蛋白生成减少
- E. 红细胞生成素产生减少和作用迟钝

【答案】 B

23、1型糖尿病患者首选的药物是

- A. 胰岛素
- B. 格列喹酮
- C. 二甲双胍
- D. 格列苯脲
- E. 阿卡波糖

【答案】 A

24、属于护士用药咨询的是

- A. 抗菌药物的合理应用
- B. 减肥、补钙、补充营养素
- C. 栓剂、气雾剂的正确使用方法
- D. 注射剂溶媒的正确选择
- E. 药品生产方法

【答案】 D

25、出血是肝素最常见的不良反应，对明显出血者选用的特异性拮抗药是

- A. 氟马西尼
- B. 鱼精蛋白
- C. 地塞米松
- D. 烯丙吗啡
- E. 酚磺乙胺

【答案】 B

26、药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

- A. 慢乙酰化者服异烟肼半衰期延长至 2~4.5h
- B. 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停
- C. 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病
- D. 月经期服用常规剂量的避孕药和地西洋，药理效应增强

E. 羟化酶缺乏者服用一半剂量的苯妥英钠可能引起神经毒性

【答案】 C

27、易引起冠脉痉挛、心肌缺血的药物

A. 阿霉素

B. 环磷酰胺

C. 氟尿嘧啶

D. 紫杉醇

E. 多西紫杉醇

【答案】 C

28、哺乳期妇女泌尿道感染应该选用的药物是

A. 米诺环素

B. 磺胺嘧啶

C. 氨苄西林

D. 依托红霉素

E. 左氧氟沙星

【答案】 C

29、二巯丙醇用于解救

A. 汞中毒

B. 三唑仑中毒

C. 有机磷中毒

D. 氰化物中毒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/018042134141006033>