

[医学类考试密押题库与答案解析]初级护士专业实践能力模拟试题

107

初级护士专业实践能力模拟试题 107

一、

问题:1. 能反映肃杀、收敛、沉降属性的事物是

A.火

B.土

C.水

D.木

E.金

答案:E

问题:2. 患者,女性,62岁。心前区剧烈疼痛2h入院。患者恶心、呕吐、烦躁,大汗淋漓,经休息和含服硝酸甘油后疼痛未见缓解。患者病情尚不稳定,提示可能发生室颤的心律失常是

A.窦性心动过速

B.窦性心动过缓

C.室上性心动过速

D.偶发房性期前收缩

E.室性心动过速

答案:E 该患者为典型的急性心肌梗死,出现室性心动过速时,应高度警惕心室颤动的发生。

心室颤动常是急性心肌梗死早期(尤其是 24h 以内)最主要的致死原因。

问题:3. 王某,40 岁,慢性菌痢,用 2%黄连素灌肠,下述哪项不妥。

- A.于晚上睡前灌入
- B.药量 < 200ml
- C.病人取右侧卧位
- D.插入肛管 12cm 长
- E.嘱病人保留 1~2 小时

答案:C[解析] 保留灌肠

问题:4. 患者,女性,51 岁,因牙龈反复出血就诊。查体:面色灰暗,颈部及胸部有蜘蛛痣;实验室查:血红蛋白 75g/L,白细胞 $4.0 \times 10^9/L$,血小板 $57 \times 10^9/L$;丙氨酸转移酶 < 40U,白蛋白 35g/L,球蛋白 33g/L。护士为患者解释出血的原因,最可能是

- A.脾功能亢进
- B.再生障碍性贫血
- C.白血病
- D.慢性胃溃疡
- E.肝硬化

答案:E

问题:5. 初产妇,临产 10h,宫口开大 4cm,2h 后宫口扩张仍为 4cm,患者担忧生产情况而向护士询问,护士的判断是

- A.第一产程延长
- B.活跃期停滞

C.第二产程停滞

D.活跃期延长

E.难产

答案:B

问题:6. 选择静脉注射穿刺部位,下列哪项不妥。

A.选择粗直、弹性好的静脉

B.穿刺部位应避开关节

C.由近心端到远心端选择血管

D.避免在皮肤炎症处进针

E.不宜在静脉瓣部位进针

答案:C[解析] 静脉注射法

问题:7. 患者,男性,40岁,诊断为急性胃肠炎,需给予静脉补充10%的氯化钾30ml。

用于稀释的溶液至少需要

A.250ml

B.500ml

C.800ml

D.1000ml

E.1500ml

答案:D[解析] 静脉补钾时浓度 $\leq 0.3\%$ 。

问题:8. 铺床时不符合节力原理的是

A.使用肘部力量,动作平稳

B.降低重心,扩大支撑面

- C.按使用顺序放置用物
- D.上身保持一定弯度
- E.减少走动次数

答案:D

问题:9. 患者男性,35岁,上腹隐痛半年,无节律性。1月前钡餐检查,见胃角部有2.5cm突出腔外的龛影,近3天来每天解成形黑便1次,量不多,血压正常,血红蛋白95g/L,最可能的诊断是

- A.慢性浅表性胃炎
- B.十二指肠球部溃疡
- C.胃角溃疡
- D.胃癌
- E.胃黏膜脱垂症

答案:C

问题:10. 患者,女性,30岁。因乳腺癌做根治术并经化疗,出院前进行健康指导,以下哪项对预防复发最重要

- A.加强营养
- B.参加体育活动增强体质
- C.五年内避免妊娠
- D.经常自查乳房
- E.定期来院复查

答案:C[解析] 术后5年内应避免妊娠,以免促使乳腺癌的复发。

问题:11. 出院病人床位处理错误的一项是 。

- A.污被服撤下、送洗
- B.被褥曝晒 6 小时
- C.床、床旁桌椅用洗涤剂擦洗
- D.脸盆、痰杯用消毒液浸泡
- E.铺备用床

答案:C[解析] 病人出院前病床单位的处理

问题:12. 患者,女性,35岁。溃疡病合并幽门梗阻,长期呕吐可引起

- A.低钾高氯性碱中毒
- B.低钾低氯性碱中毒
- C.高钾高氯性碱中毒
- D.低钾高氯性酸中毒
- E.低钾低氯性酸中毒

答案:B[解析] 幽门梗阻患者长期呕吐胃内容物,丢失大量的胃液,其中含有大量的钾、氯及酸性液体,易引起低钾低氯性碱中毒。

问题:13. 留 24 小时尿标本做 17-羟类固醇检查,为防止尿中激素被氧化时,其标本应加

- A.甲苯
- B.浓盐酸
- C.甲醛
- D.稀盐酸
- E.碳酸钠

答案:B 常用防腐剂的作用和用法。①甲醛:防止细菌生长和固定尿中有机成分。用于尿爱迪计数。②浓盐酸:防止尿中激素被氧化,用于内分泌系统的检验,如 17-酮类固醇,17-

羟类固醇；③甲苯：防止细菌污染和延缓尿液中化学成分的分解，用于尿蛋白定量、尿糖定时、测定尿中肌酐、肌酸、钾、钠、氯等。

问题:14. 取用无菌溶液时，下列哪项是错误的

- A.首先核对瓶签
- B.认真检查药液的质量
- C.倾倒溶液时，标签朝上
- D.手不可触及瓶口及盖的内面
- E.必要时，可将无菌纱布直接伸入瓶内蘸取

答案:E

问题:15. 患者，男性，66岁，肝癌中晚期。患者极度消瘦，不思饮食，护士为其插胃管补充营养。判断胃管是否在胃内的最好方法是

- A.将胃管末端放入盛水碗中观察有无气泡逸出
- B.用注射器向胃内注入 10ml 空气听气过水声
- C.用注射器向胃内注入 10ml 生理盐水听气过水声
- D.用注射器抽取胃内容物
- E.让病人晃动身体感觉胃内是否有异物存在

答案:D

问题:16. 某人突然发生贫血。全身皮肤黏膜出血，并且发热。经查血中有大量不成熟白细胞。诊为急性白血病。何化验有助确诊

- A.血中有大量杆状核粒细胞
- B.血中有大量晚幼红细胞
- C.血中原始及早幼粒细胞数 > 0.9

D.血中有大量晚幼粒细胞

E.血有大量网织红细胞

答案:C

问题:17. 发生空气栓塞时应使病人采取

A.左侧卧位和头低足高位

B.端坐位双腿下垂

C.右侧卧位和头低足高位

D.右侧卧位和头高足低位

E.左侧卧位和头高足低位

答案:A

问题:18. 患儿,5岁,体检时发现心前区Ⅲ级收缩期杂音,拟诊室间隔缺损。为明确诊断,最重要而又无创伤的辅助检查是

A.磁共振成像

B.动态心电图

C.超声心动图

D.心导管造影

E.血常规检查

答案:C 超声心动图是一种无创检查技术,不仅可以提供详细的心脏解剖结构信息,还能提供心脏功能及部分血流动力学信息。

问题:19. 8个月婴儿,体重6.5kg,身长70cm,腹部皮下脂肪0.5cm,精神不振,爱哭闹。判断该患儿最可能是

A.佝偻病

- B.轻度营养不良
- C.中度营养不良
- D.重度营养不良
- E.中度脱水

答案:B 8个月婴儿的正常体重为 $6+8\times 0.25=8\text{kg}$, $(8-6.5)\div 8=18.75\%$, 该患儿体重低于标准体重 18.75% ($15\%\sim 25\%$) , 即轻度营养不良 ; 腹壁脂肪厚度 0.5cm ($0.4\sim 0.8\text{cm}$) , 也符合轻度营养不良。

问题:20. 当个体发生疾病时采取的第三线防卫是

- A.正确对待问题
- B.正确对待情感
- C.向朋友寻求帮助
- D.减少压力的生理性影响
- E.寻求医护人员的帮助

答案:E 第一道防卫——生理防卫和心理防卫 : 生理防卫包括遗传素质、身体状况、营养状态及免疫功能等。心理防卫是指心理上对应激做出适当反应的过程 , 如焦虑、否认、忽视、压抑、转移等。第二道防卫——自我帮助 : 当应激源较强 , 应激反应严重 , 而个体第一道防卫相对较弱时 , 就必须采用自我帮助来对抗和控制反应 , 以减少疾病的产生。第三道防卫——专业帮助 : 第二道防卫失败 , 就必须及时寻找帮助 , 由医护人员提供药物治疗、心理治疗、物理治疗、健康教育等 , 以提高患者的应对能力 , 有利于心身疾病的痊愈。

问题:21. 罗先生 , 男 , 34岁 , 因蹦极外伤至截瘫 , 卧床已3个月 , 病人一般状况差 , 骶尾部可见一面积为 $2\text{cm}\sim 4\text{cm}$ 、较深的创面 , 有脓液流出 , 创面周可见少量黑色坏死组织。

以下护理措施最恰当的是

- A.剪去坏死组织，用 0.02%呋喃西林冲洗后，外敷药物
- B.仅用红外线照射即可
- C.用生理盐水冲洗后，自然干燥
- D.用 50%酒精按摩创面及周围皮肤
- E.用厚层滑石粉包扎

答案:A 根据病人骶尾部情况判断，该病人处于褥疮的坏死溃疡期。该期的治疗措施为清洁疮面，去除坏死组织，保持引流通畅，促进愈合。可用生理盐水、0.02%呋喃西林和 1:5000 高锰酸钾或 3%过氧化氢溶液等溶液冲洗疮面，用 3%~5%碘酒涂擦创面，根据细菌培养和药敏试验选用药物外敷，并按外科换药处理，必要时可行植皮手术。故选项 E 正确。选项 A 是错误的，局部发红就禁忌按摩；选项 B 不用于治疗褥疮；选项 C，仅用生理盐水冲洗是不够的；选项 D 缺少清洁疮面的措施。

问题:22. 50%葡萄糖溶液 40ml IV qd，执行时间是 。

- A.每日上午 8 时
- B.每日晚上 8 时
- C.隔日上午 8 时
- D.隔日晚上 8 时
- E.每日中午 12 时

答案:A[解析] 给药途径及次数和时间

问题:23. 护士收集健康资料的目的中，错误的是

- A.为了解病人的隐私，确立护理诊断提供依据
- B.为寻找病因、制定护理措施提供依据
- C.为了解病情变化，制订治疗方案提供依据

D.为了解病人的心理特征，选择护理实施方法提供依据

E.为了解治疗反应，评估护理行为提供依据

答案:A 病人有维护隐私的权利，了解病人隐私不是收集健康资料的目的。

问题:24. 患者，女性，18岁。反复出现皮肤瘀点，伴有鼻出血、月经过多，近来出现贫血、脾大，血小板 $32 \times 10^9/L$ 。不正确的护理措施是

A.卧床休息、限制活动

B.预防便秘

C.不可抓挠皮肤

D.鼻腔内血痂应剥去

E.高蛋白、高维生素、低渣饮食

答案:D

问题:25. 自1964年以来，中国护理界的群众性学术团体称 。

A.中华护士会

B.中华护士学会

C.中华护理学会

D.中国护士学会

E.中国护理学会

答案:C[解析] 我国护理学的发展

问题:26. 患儿张某，3岁，入院前可以自行大小便，但因肺炎住院后常发生尿床、大小便不能自理的现象，此患儿使用的心理防卫机制是 。

A.否认

B.压抑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/018105137045006035>