

上海小儿外科模拟题 2021 年(96)

(总分 92.XX02,考试时间 120 分钟)

A1/A2 题型

1. 以下哪项可以确诊新生儿 ABO 溶血病
 - A. 母子血型不合
 - B. 母亲血中游离的血型抗体滴度明显升高
 - C. 患儿血中游离抗体试验阳性
 - D. 患儿外周血提示贫血及网织红细胞升高
 - E. 释放抗体试验阳性
2. 关于窒息目前诊断参考指标是哪一项
 - A. 羊水Ⅲ度
 - B. Apgar1 分钟评分 ≤ 7 分
 - C. 出生后 1 小时动脉血 pH 小于 7. 0
 - D. 出生后需正压通气复苏
 - E. 肌张力低下
3. 以下哪项可确诊新生儿缺氧缺血性脑病
 - A. EEG 的特异性表现
 - B. 头颅 CT
 - C. 头颅 B 超
 - D. MRI
 - E. MRS
4. 新生儿败血症的抗生素治疗中, 下列哪项正确①抽血培养后即开始用抗生素②选用有杀菌作用的药物③开始时宜采用静脉分次给药④因肝肾功能不完善, 抗生素用药不应超过 7 天⑤注意药物剂量及其毒性反应
 - A. ②、③、④、⑤
 - B. ①、②、③、④
 - C. ①、③、④、⑤
 - D. ①、②、③、⑤
 - E. ①、②、③、④、⑤
5. 下列哪项是早产儿视网膜病变的临床表现
 - A. 急性期血管发生向无血管视网膜区过渡
 - B. 病变早期在视网膜有血管区与无血管区之间出现分界线
 - C. 分界处无增生性病变
 - D. 视网膜血管走行正常
 - E. 无牵拉性视网膜剥离
6. 先天性梅毒青霉素的用法是

- A. 每次 5 万 U / kg im q12h 共 7 天, 后改为每次 5 万 U / kg im q8h 共 10~14 天
- B. 每次 10 万 U / kg im q12h 共 7 天, 后改为每次 10 万 U / kg im q8h 共 10~14 天
- C. 每次 5 万 U / kg ivgtt q8h 7 天, 后改为每次 5 万 U/kg ivgtt q12h 共 10~14 天
- D. 每次 5 万 U / kg ivgtt q12h 7 天, 后改为每次 5 万 U / kg ivgtt q8h 共 10~14 天
- E. 每次 10 万 U / kg ivgtt q12h 7 天, 后改为每次 10 万 U / kg ivgtt q8h 共 10~14 天
7. 目前采用的新生儿低血糖的诊断是
- A. 血糖小于 2. 2mmol / L
- B. 足月儿 3 天以内血糖低于 1. 7 mmol / L
- C. 足月儿 3 天以内血糖低于 2. 2mmol / L
- D. 早产儿 3 天以后血糖低于 2. 2mmol / L
- E. 早产儿 3 天以内血糖低于 1. 1mmol / L
8. 下列关于新生儿寒冷损伤综合征的说法, 正确的是
- A. 足月儿体温调节中枢完善, 不容易发生寒冷损伤综合征
- B. 皮下饱和脂肪酸含量高, 其熔点高, 低体温时容易凝固而出现皮肤硬肿
- C. 早产儿体表面积相对较大、皮下脂肪少、皮肤薄、容易失热
- D. 骨骼肌是寒冷时产热的主要物质
- E. 该病仅发生于寒冷地区
9. 新生儿寒冷时产热的主要方式是
- A. 骨骼肌震颤产热
- B. 葡萄糖氧化供能
- C. 棕色脂肪组织化学性产热
- D. 饱和脂肪酸代谢产热
- E. 消耗储备的氨基酸产热
10. 关于新生儿血糖异常, 下列说法正确的是
- A. 窒息只会导致低血糖
- B. 败血症只会导致低血糖
- C. 低体温只会导致低血糖
- D. 早产儿既可出现低血糖又可很快出现高血糖
- E. 酸中毒只会导致高血糖
11. 出生后 5 天男婴, 发现乳腺有一鸽蛋大小肿块, 应该如何处理
- A. 挤压肿块
- B. 局部热敷
- C. 手术切除
- D. 无须处理
- E. 局部用药
12. 孕 42+周分娩男婴, 出生体重 4000g, 羊水III度, 生后出现气促、发绀、呻吟, 三凹征, 双肺可闻及粗湿啰音, 摄胸片可表现为
- A. 胸片可见斑片状、面纱或云雾状密度增高, 或有叶间积液, 多伴有肺气肿心胸比例增大
- B. 胸片可见肺大疱、脓胸或脓气胸
- C. 胸片缺乏特异性改变, 初期肺纹理增粗, 亦可呈局灶性改变, 条索状阴影或大块实变征
- D. 胸片显示两肺透亮度增强伴有节段性或小叶肺不张, 也可仅有弥漫性浸润影或并发气胸纵隔气肿
- E. 胸片显示两肺透亮度普遍降低。可见弥漫性均匀网状阴影和支气管充气征, 重者呈"白肺"

13. 37 孕周新生儿出生时 Apgar 评分 1 分钟、5 分钟及 10 分钟分别为 3 分、5 分、7 分，生后 12 小时小儿肌张力增高，有吸吮、呕嘴等自主运动。最可能的诊断是
- A. 低血糖
 - B. 缺氧缺血性脑病
 - C. 大脑中动脉梗死
 - D. 蛛网膜下腔出血
 - E. 先天性脑发育不全
14. 一个胎龄 30 周患儿，生后曾患新生儿肺透明膜病，现纠正，胎龄 34 周，在眼科门诊行眼底检查发现视网膜血管区与无血管区出现白色线样分界线。属早产儿视网膜病变的第几期
- A. 1 期
 - B. 2 期
 - C. 3 期
 - D. 4 期
 - E. 5 期
15. 某新生儿临床诊断坏死性小肠结肠炎，下列处理正确的是
- A. 给予稀释奶喂养
 - B. 每日供给热量可按 $209\text{kJ} / \text{kg}$ 计算，以后增加至 $418\sim 427\text{kJ} / \text{kg}$
 - C. 可输入新鲜冰冻血浆，预防出血
 - D. 有腹腔脓肿但未穿孔可内科保守治疗
 - E. 可输大剂量丙种球蛋白加强支持治疗
16. 某新生儿发生寒冷损伤综合征，其硬肿范围为双下肢、臀部及双上肢，其硬肿范围量化评分为
- A. 35%
 - B. 52%
 - C. 64%
 - D. 39%
 - E. 40%
17. 下列哪一项与新生儿肺透明膜病的发病关系密切
- A. 肺表面活性物质缺乏
 - B. 剖宫产
 - C. 胎膜早破
 - D. 母亲吸烟、吸毒
 - E. 巨大儿
18. 关于母乳性黄疸描述正确的是
- A. 绝大多数母乳喂养的新生儿都会产生黄疸
 - B. 母乳性黄疸以非结合和结合胆红素增高为主
 - C. 母乳性黄疸都需要停喂母乳
 - D. 母乳性黄疸可在生后与生理性黄疸重叠，也可在生后 12 周才消退
 - E. 母乳性黄疸是因为母乳中缺乏 β -葡萄糖醛酸苷酶
19. 新生儿缺氧缺血性脑病治疗中正确的是
- A. 都需要供氧
 - B. 控制输液量 $60\sim 80\text{ml} / (\text{kg}\cdot\text{d})$
 - C. 都需要用多巴胺
 - D. 都需要纠正酸中毒
 - E. 都需要用脱水剂
20. 关于颅内出血的描述正确的是

- A. 早产儿常常有典型的表现
 - B. 脑脊液检查正常可除外颅内出血
 - C. 影像学检查可确诊
 - D. 临床出现前囟张力增高可诊断
 - E. 头颅 CT 比头颅 B 超诊断效果好
21. 新生儿早发型败血症是指
- A. 生后 1 天内起病
 - B. 生后 1 周尤其 3 天内起病
 - C. 生后 3~7 天发病
 - D. 出生 7 天后发病
 - E. 出生 10 天发病
22. 早产儿视网膜病变的阈前病变和阈值病变包括
- A. I 区的任何病变、后极部异常的血管和视网膜血管扩张、迂曲
 - B. II 区的 2 期+、后极部异常的血管和视网膜血管扩张、迂曲
 - C. III 区的 3 期+、后极部异常的血管和视网膜血管扩张、迂曲
 - D. 后极部异常的血管和视网膜血管扩张、迂曲
 - E. I 区和 II 区的 3 期+相邻病变达 5 个钟点或累及 8 个钟点
23. 新生儿巨细胞病毒感染最常见的后遗症是
- A. 智力低下
 - B. 运动障碍
 - C. 癫痫
 - D. 感觉神经性耳聋
 - E. 牙釉质钙化不全
24. 下列关于新生儿持续性肺动脉高压, 说法正确的是
- A. 发病率大约为 1 / 100~2 / 100
 - B. 该病不容易并发慢性肺疾病
 - C. 是指新生儿生后由于持续性的体血管阻力增高而使其不能转变为正常的宫外循环方式
 - D. 任何时候新生儿表现为严重的中心性发绀均应怀疑有该病可能
 - E. 早产儿常见
25. 新生儿持续性肺动脉高压的病因描述, 正确的是
- A. 早产或低出生体重
 - B. 肺血管发育不良
 - C. 新生儿贫血
 - D. 存在先天性心脏病
 - E. 气胸
26. 下列哪项因素与新生儿坏死性小肠结肠炎发病关系最密切
- A. 寒冷
 - B. 溶血
 - C. 配方奶喂养
 - D. 早产
 - E. 双胎或多胎
27. 关于新生儿寒冷损伤综合征复温措施的描述, 正确的是
- A. 轻度硬肿, 产热良好的患儿, 可在 6~12 小时内恢复正常体温
 - B. 重度硬肿应尽快复温至正常体温

- C. 重度硬肿复温时，应当每小时升高体温 2~3℃
D. 复温时以腋温为体温平衡指标
E. 重度硬肿复温时，开放式暖箱床而温度从 32℃开始
28. 患儿，日龄 5 天，因"腹泻 2 天伴尿少 1 天"入院，查血气分析，最容易出现以下哪种酸碱失衡
- A. 呼吸性碱中毒
B. 代谢性酸中毒合并呼吸性酸中毒
C. 代谢性碱中毒
D. 代谢性酸中毒
E. 呼吸性酸中毒
29. 生后 5 天，体重 1200g 早产儿，已光疗、输白蛋白等积极治疗 1 天。胆红素仍为 285 $\mu\text{mol/L}$ ，以下治疗正确的是
- A. 继续光疗
B. 准备换血
C. 输高效丙种球蛋白
D. 输白蛋白
E. 输血浆
30. 早产儿胎龄 28 周，娩出过程顺利，生后 24 小时出现频繁的呼吸暂停。最可能的原因是
- A. 低体温
B. 红细胞增多症
C. 肺炎
D. 颅内出血
E. 肺透明膜病
31. 一患儿 20 天日龄，足月顺产，生后 3 天起开始颜面黄疸，呈进行性加重，近两日出现白陶土样大便。查 CMV 抗体阳性，给予更昔洛韦治疗，其副作用主要是
- A. 肾功能损害
B. 贫血
C. 抽搐
D. 失明
E. 白细胞和血小板减少
32. 某新生儿临床考虑持续性肺动脉高压，现在吸氧条件下发绀仍不能缓解，对于该新生儿目前治疗的关键是
- A. 积极治疗原发病
B. 积极纠正低氧血症和酸中毒
C. 尽快关闭动脉导管
D. 防治并发慢性肺疾病及颅内出血
E. 扩血管药物
33. 在新生儿初步复苏中正确的步骤是
- A. 保暖→吸引→擦干→体位→刺激
B. 刺激→保暖→体位→吸引→擦干
C. 擦干→保暖→体位→吸引→刺激
D. 保暖→体位→吸引→擦干→刺激
E. 保暖→体位→刺激→吸引→擦干
34. 以下哪个配对会引起新生儿 Rh 溶血病

- A. 母: DccEe 子: Dccee
B. 母: DCcEe 子: dccEe
C. 母: DccDe 子: DCcEe
D. 母: DCcEe 子: Dcceee
E. 母: dCcEe 子: dccEe
35. 新生儿缺氧缺血性脑病诊断主要靠
A. EEG
B. CT
C. B 超
D. MRI
E. 临床表现
36. 关于黄疸的治疗描述正确的是
A. 光疗是治疗黄疸最简单、有效的方法
B. 可供给白蛋白, 阻止胆红素产生
C. 都要使用碱性液, 以利胆红素与白蛋白连接
D. 在早期使用酶诱导剂常可很快降低胆红素
E. 新生儿高胆红素血症时可使用高效丙种球蛋白降低胆红素
37. 关于新生儿感染疾病, 哪项是正确的①新生儿早期病原菌以革兰阳性球菌为多②血清 IgM 测定作为宫内感染的辅助诊断是有用的③胎膜早破母亲生的新生儿易发生感染疾病④新生儿败血症时, 发热、白细胞增多是必发的症状
A. ①、④
B. ②、④
C. ①、③、④
D. ②、③
E. ①、②、③
38. 早产儿视网膜病变的治疗原则是
A. 对 III 区的 1 期或 2 期病变密切观察病情变化
B. 对阈前病变不需处理
C. 对阈值病变行光凝或冷凝治疗
D. 对阈值病变行手术治疗
E. 对 4 期和 5 期病变行光凝或冷凝治疗
39. 下列哪项是新生儿危重病例的单项指标
A. 血糖小于 2.2mmol/L
B. 出生体重 $\leq 1000\text{g}$
C. 反复抽搐, 经处理持续 2 小时以上不缓解
D. 高胆红素血症但无换血指征者
E. 体温 $\leq 35^\circ\text{C}$ 或 $> 39^\circ\text{C}$
40. 下列腹部 X 线检查结果可作为确诊新生儿坏死性小肠结肠炎依据的是
A. 肠曲形态不规则及肠壁僵硬
B. 门静脉积气及肠壁积气
C. 肠间隙增宽明显
D. 立位片见较多液平面及腹胀
E. 钙化点
41. 关于低血糖的治疗, 下列说法正确的是

- A. 不管有无症状，都要及时治疗
 - B. 对于无症状性低血糖者，应立即静脉注射葡萄糖
 - C. 对于极低出生体重儿，每分钟葡萄糖输注量应大于 $8\text{mg} / \text{kg}$ ，以增加糖原储备
 - D. 持续或反复低血糖，可加用儿茶酚胺类药物治疗
 - E. 对早产儿而言，暂时性低血糖可先观察，严密监测血糖，不必立即治疗以防止高血糖
42. 下列因素中，葡萄糖储备不足的原因为
- A. 低出生体重儿
 - B. 母亲产前用过地塞米松
 - C. 发热
 - D. 小于胎龄儿
 - E. 生后应用氨茶碱
43. 临床诊断新生儿持续性肺动脉高压，应当除外下列哪种先天性心脏病
- A. 先天性房间隔缺损
 - B. 先天性室间隔缺损
 - C. 法洛四联症
 - D. 动脉导管未闭
 - E. 卵圆孔未闭
44. 出生后 6 天女婴，反应好，阴道流出少量血性液体，未处理，2 天后自止，考虑诊断为
- A. 假月经
 - B. 新生儿出血症
 - C. 外伤出血
 - D. 血友病
 - E. 凝血因子缺乏
45. 新生儿娩出 1 分钟时心率 140 次 / 分，呼吸 25 次 / 分，不规则，四肢活动差，稍屈曲，弹足底无反应，全身青紫。Apgar 评分可评为
- A. 7 分 B. 6 分
 - C. 5 分 D. 4 分
 - E. 3 分
46. 足月儿，出生时 Apgar 评分 1 分钟 3 分，5 分钟 8 分，10 分钟 10 分，出生后 6 小时入院检查患儿激惹、哭吵、无抽搐，BP65 / 42mmHg，R54 次 / 分，面色红润，四肢肌张力正常，拥抱反射增强。以下治疗正确的是
- A. 头罩给氧
 - B. 苯巴比妥镇静
 - C. 甘露醇减轻脑水肿
 - D. 用碳酸氢钠
 - E. 用多巴胺或多巴酚丁胺
47. 门诊急诊室接诊一患儿，日龄 2 小时，足月顺产，母无特殊疾病，孕期体健，因生后不哭、呼吸微弱曾在当地医院行复苏抢救治疗。现查体：昏迷状，面色尚可，R50 次 / 分，HR100 次 / 分，BP55 / 30mmHg，左锁骨骨折，原始反射均消失。该患儿应住哪个病房
- A. PICU
 - B. NICU
 - C. 新生儿内科
 - D. 新生儿外科
 - E. 骨科

48. 一早产儿，体温 30℃，反应较差，对其治疗下列说法正确的是
- A. 热量开始按每天 335kJ / kg，并逐渐增至 418~427kJ / kg
 - B. 早期有血压不稳定者，可选用多巴胺治疗
 - C. 有 DIC 及出血倾向者，应立即使用肝素
 - D. 有肺出血时立即采用呼吸机辅助呼吸
 - E. 快速复温
49. 早产儿，男，胎龄为 30 周，临床诊断新生儿坏死性小肠结肠炎，下列说法正确的是
- A. 一时难以明确为何种细菌感染时，可用第一代头孢菌素
 - B. 经内科积极治疗后病情仍继续恶化，无论有无穿孔，均可考虑外科手术治疗
 - C. 病情恢复，尽早开奶
 - D. 应进行动态腹部 B 超检查，以明确有无肠穿孔
 - E. 重症病例疗程为 7~10 天
50. 胎粪吸入综合征的临床特点，下面哪一项正确
- A. 生后数小时出现呼吸急促、呼吸困难、发绀、呻吟、三凹征、胸廓前后径增加
 - B. 严重病例不伴有意识障碍、颅压增高、惊厥等中枢神经系统症状
 - C. 易并发 PPHN，但不伴发心力衰竭表现
 - D. 胎粪吸入只导致化学性炎症
 - E. 仅见于过期产儿
51. 在新生儿窒息复苏中哪项正确
- A. 皮囊面罩使用的速率为 60~80 次 / 分
 - B. 皮囊面罩正压通气大于 2 分钟应插胃管
 - C. 皮囊面罩正压通气每隔 1 分钟测一次心率
 - D. 心率>80 次 / 分，有自主呼吸，停止通气
 - E. 胸外心脏按压位置在胸骨的 1 / 2 处
52. 以下关于新生儿溶血病的说法哪项是正确的
- A. 第一胎不会发生 Rh 溶血
 - B. 母子血型不合都会发生溶血病
 - C. 母亲未接受过输血不会在第一胎发生 Rh 溶血
 - D. 母亲 Rh 阳性不会使胎儿发生溶血
 - E. 胎儿为"O"型血可发生溶血病
53. 以下哪类颅内出血最常发生在极低出生体重儿
- A. 硬膜下出血
 - B. 蛛网膜下腔出血
 - C. 脑室周围-脑室内出血
 - D. 小脑出血
 - E. 脑实质内出血
54. 新生儿败血症最常见的感染途径是
- A. 产后脐部感染
 - B. 产前羊水穿刺感染
 - C. 暖箱感染
 - D. 产时产程延长
 - E. 皮肤毛囊炎感染
55. 关于新生儿破伤风的特点，下列哪一项是正确的
- A. 潜伏期大多为 4~7 天，刺激患儿易引起痉挛发作

- B. 潜伏期大多为 4~7 天，接生时窒息易引起
- C. 潜伏期大多为 2~4 天，牙关紧闭
- D. 潜伏期大多为 2~4 天，呈苦笑面容
- E. 潜伏期大多为 2~4 天，抽搐
56. 早产儿视网膜病变可分为几期
- A. 1 期 B. 2 期
- C. 3 期 D. 4 期
- E. 5 期
57. 关于正常血液循环宫外转变特征的描述，下列说法正确的是
- A. 随着第一次呼吸的产生和脐动脉的结扎，肺血管阻力迅速升高
- B. 动脉血氧增加使动脉导管开放
- C. 血液在动脉导管水平的右向左分流可使肺循环血流增加
- D. 已经关闭的动脉导管仍可能重新开放
- E. 卵圆孔开放
58. 导致新生儿坏死性小肠结肠炎肠管黏膜损伤机制的说法正确的是
- A. 低氧血症导致肠黏膜血管防御性收缩，导致肠管损伤
- B. 动脉导管未闭导致体循环血流增加
- C. 红细胞刺激肠黏膜微循环
- D. 母乳喂养
- E. 肠道细菌先感染肠黏膜
59. 关于新生儿高血糖的临床表现，下列说法正确的是
- A. 可导致肺出血
- B. 可导致脑水肿
- C. 可表现为多尿、体重增加
- D. 可没有症状
- E. 可导致呼吸暂停
60. 胎龄为 39 周的新生儿，出生体重为 3899g，其体重位于同胎龄标准的第 97 百分位，下列哪个诊断准确
- A. 过期产儿，巨大儿
- B. 足月儿，大于胎龄儿
- C. 足月儿，巨大儿
- D. 过期产儿，大于胎龄儿
- E. 足月儿，适于胎龄儿
61. Rh 溶血病患儿，其血型是 O. CcDEe，其母血型为 A. ccdee，如需换血疗法。下列哪一种血型最合适
- A. O. CcDEe
- B. A. ccdEe
- C. O. CCDEE
- D. A. CcdEe
- E. O. ccdee
62. 29 周早产新生儿，生后第 2 天出现双目凝视、前囟张力增高，头颅 B 超提示生发基质区出血，脑室内出血面积为 30%，出血范围分级为
- A. I 级 B. II 级
- C. III 级 D. IV 级

E. V级

63. 新生儿内科新入院一男性患儿，日龄 26 天，胎龄 31 周，体重 1700g，体温不升。颜面、胸、腹、臀、背及四肢均明显硬肿，且有出血倾向。应转到哪个病房

A. NICU

B. PICU

C. 特需病房

D. 新生儿外科

E. 血液科

64. 一名 3 日龄足月儿，其母患糖尿病，患儿于今日上午查体见心率 175 次 / 分。目前最需要做的检查是

A. 胸片

B. 头颅 B 超

C. 血糖

D. 心脏彩超

E. 头颅 CT

65. 早产儿的胎龄应是

A. >25 周至小于 37 足周

B. >26 周至小于 37 足周

C. >27 周至小于 38 足周

D. >28 周至小于 37 足周

E. >28 周至小于 38 足周

66. 新生儿肺透明膜病的临床特点为

A. 口吐白沫、呛奶、肺部常无异常体征

B. 多在生后 4~6 小时出现呼吸急促、发绀伴呼气性呻吟，进行性加重

C. 出生后不久出现青紫、呼吸困难，吸氧后症状不缓解

D. 出生后 2~5 小时出现呼吸急促、唇周青紫，呼吸 60 次 / 分以上，反应正常，哭声响

E. 有窒息抢救史，复苏后呼吸不规则或气促

67. 复苏时以下哪种情况需要气管插管

A. 出生后复苏 1 分钟，心率小于 80 次 / 分

B. 羊水 III 度，Apgar1 分钟评分 9 分

C. 怀疑膈疝

D. 产重小于 2000g 的新生儿复苏时

E. 孕周 35 周，产重 2100g，5 分钟评分 8 分

68. 新生儿生后 24 小时内出现黄疸，应首先考虑的诊断是

A. 生理性黄疸

B. 新生儿溶血病

C. 败血症

D. 新生儿肝炎

E. 胆道闭锁

69. 新生儿缺氧缺血性脑病的病因中最容易被忽略的是

A. 产前慢性缺氧

B. 产时窒息

C. 宫内窘迫

D. 产后患儿呼吸衰竭

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/027106111011006042>