

1.

- A.鼻咽癌占鼻咽部恶性肿瘤的 98%以上
- B.绝大多数浸润性生长为主
- C.肿瘤可顺肌束、神经血管束及纤维-脂肪组织界面蔓延
- D.GD-DTPA增强扫描肿瘤呈明显强化
- E.少数较表浅的鼻咽癌以外生性生长为主，向鼻腔内突出

2. 下列卵巢癌的 CT表现中，不正确的是（ ）

- A.盆腔肿块
- B.淋巴转移和血行播散也较常见
- C.可见腹水
- D.腹膜腔播散
- E.大网膜转移

3. 诊断急性主动脉夹层首选的影像学方法是（ ）

- A.心电图和心肌酶检查
- B.床旁超声心电图
- C.CTA和 MRA
- D.心血管造影
- E.心脏三位像

4. 肺动脉栓塞临床中最常见的原因因为（ ）

- A.脂肪栓塞
- B.空气栓塞
- C.血栓栓塞
- D.医源性栓塞
- E.其他

5.HRCT扫描主要优点是（ ）

- A.图像边缘模糊
- B.相对密度分辨率提高
- C.噪声小
- D.相对空间分辨率提高
- E.时间分辨率高

6.

- A.脑室内出血
- B.脑水肿
- C.脑内血肿
- D.脑沟、脑池密度增高
- E.脑梗死

7.关于“多囊肾”的CT表现，下列错误的是（ ）

- A.囊肿大小、分布不均呈蜂窝状
- B.囊肿大小、密度、分布均匀
- C.增强扫描囊肿不强化
- D.婴儿型者，肾盂、肾盏、肾外形多正常
- E.成人型者，肾影常增大，肾盂、肾盏受压、变形

8.蛛网膜下腔出血，首选的检查方法为（ ）

- A.MRI
- B.PET
- C.EEG
- D.CT
- E.ECT

9.疑消化道穿孔，观察膈下游离气体应首选摄影位置为（ ）

- A.左侧卧水平投照
- B.右侧卧水平投照
- C.仰卧水平投照
- D.仰卧后前位
- E.站立后前位

10.眼直肌增粗最常见于下列哪种疾病（ ）

- A.肢端肥大症
- B.眼眶蜂窝织炎
- C.突眼性甲状腺肿
- D.结节病
- E.炎性假瘤

11.

- A. 盗甲心
- B. 上纵隔影增宽
- C. 心脏搏动减弱
- D. 心影明显增大
- E. 部分患者可有胸腔积液

12. 肺动脉高压的诊断要点为

- A. 出现 Kerley B 线
- B. 肺野透亮度减低
- C. 多继发于左心衰
- D. 肺纹理增粗，结构模糊
- E. 肺动脉段突出，各肺动脉主干增粗

13. 肝脏 MR增强检查常规使用的对比剂是

- A. 碘海醇
- B. 碘克沙醇
- C. Gd-DTPA
- D. 碘氟醇
- E. 泛影葡胺

14. 二尖瓣狭窄患者的声像图改变不包括

- A. 三尖瓣反流
- B. 肺动脉增宽
- C. 左室增大
- D. 左房增大
- E. 右室增大

15. 鼻窦黏液囊肿 CT的典型征象为

- A. 轮廓规则锐利
- B. 骨壁变薄外移或部分消失，可吸收破坏
- C. 腔内密度均匀而偏低
- D. 窦腔膨大，有环形均匀薄层囊壁包围
- E. 增强检查无强化效应

16.

- A.后前位胸片，纵隔位于胸部中央
- B.主要由心脏、大血管和气管构成
- C.肺门位于下纵隔
- D.心脏位于中、下纵隔
- E.四分法，上纵隔位于胸片柄下缘与第4胸椎下缘连线以上

17. 室间隔小缺损指（ ）

- A.<0.5cm
- B.<0.6cm
- C.<0.8cm
- D.<0.9cm
- E.<1cm

18. 亚急性血肿在 MRI 上的信号为（ ）

- A.等 T1 和等 T2
- B.等 T1 和短 T2
- C.长 T1 和等 T2
- D.短 T1 和长 T2
- E.长 T1 和长 T2

19. 脑转移瘤最常见的部位是（ ）

- A.大脑灰质
- B.大脑白质
- C.灰白质交界
- D.小脑半球
- E.脑干和脑膜

20. 下列胸腔积液的描述，正确的是（ ）

- A.中等量积液常有纵隔移位
- B.显示斜裂叶间积液，以侧位片为佳
- C.立位胸片，肺底积液呈外高内低的致密影
- D.包裹性积液多位于前胸壁
- E.立位后前位胸片，可显示 100ml 以下积液

21.

- A. 软组织充血、水肿
- B. 骨质破坏
- C. 骨质增生
- D. 死骨形成
- E. 骨膜反应

22. 肺循环血量增多，而左心室和体循环血量减少的，是下列哪种疾病

- A. 法洛三联症
- B. 肺动脉狭窄
- C. 房间隔缺损
- D. 室间隔缺损
- E. 动脉导管未闭

23. 转移性肝癌最常见的 CT 强化类型是

- A. 充填式强化
- B. 环形强化
- C. 不强化
- D. 明显均匀强化
- E. 包膜征

24. 肺静脉高压的病因不包括以下哪一项

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 肺栓塞
- D. 左房黏液瘤
- E. 主动脉狭窄

25. 根据 CT 值的定义公式，空气的 CT 值为 ()

- A. -700HU
- B. -800HU
- C. -900HU
- D. -1000HU
- E. -1100HU

26.

- A.眼外肌增厚以肌腹肥厚为著
- B.泪腺无增大
- C.眼球壁不增厚
- D.视神经增粗
- E.眶脂肪密度低

27. 下列关于肾筋膜和肾间隙的正确描述是 ()

- A.肾脏前缘和吉氏筋膜前层之间为肾前间隙
- B.两侧肾周间隙之间没有交通
- C.左右肾后间隙之间相通
- D.肾筋膜外为液体
- E.肾上腺、肾血管位于肾周间隙

28. 关于肺内支气管与肺动脉的下列描述中, 正确的是 ()

- A.肺动脉分支的管径与伴行的支气管管径相近
- B.正常情况下, 肺动脉管径是伴行的支气管管径的 1.5 倍
- C.肺外围一般能显示支气管的断面
- D.肺外围一般不能显示肺动脉分支的断面
- E.伴行的支气管比相邻肺动脉粗 2 倍以上才可以诊断为支气管扩张

29.MRCP显示的“双管征”最常发生于 ()

- A.胰头癌
- B.胰体癌
- C.胰尾癌
- D.弥漫性胰腺癌
- E.胰腺炎

30. 高血压脑出血最常见的部位是 ()

- A.基底节
- B.小脑
- C.脑干
- D.颞叶
- E.枕叶

31.

- A.密度多均匀
- B.平扫呈稍高密度
- C.增强扫描显著强化
- D.颅底骨质破坏
- E.与周围邻近结构界线清楚

32. 下述疾病与心脏增大描述不相符的是 ()

- A.法洛四联症——右心室增大
- B.房间隔缺损——左心房增大
- C.二尖瓣关闭不全——左心室增大
- D.肺动脉狭窄——肺动脉段膨隆
- E.动脉导管未闭——“漏斗”征

33. 目前诊断椎管内肿瘤的可靠方法是 ()

- A.平片
- B.CT
- C.MRI
- D.脊髓造影
- E.穿刺活检

34. 下列哪一项不属于胆囊癌声像图类型 ()

- A.蕈伞型
- B.硬化型
- C.厚壁型
- D.混合型
- E.实块型

35.CT 表现为脑基底池增强的炎性病变，通常不包括以下哪项 ()

- A.脑膜型囊虫病
- B.化脓性
- C.真菌性
- D.病毒性
- E.结核性

36.

- A.壳核
- B.内囊
- C.尾状核头
- D.丘脑
- E.基底节

37. 主动脉夹层动脉瘤 DeBakey I型是指 ()

- A.内膜破口位于升主动脉近端，夹层可累及降主动脉
- B.内膜破口位于升主动脉近端，夹层局限于升主动脉
- C.内膜破口位于升主动脉近端，夹层可累及主动脉弓、降主动脉、腹主动脉及其分支
- D.内膜破口位于左锁骨下动脉远端，夹层常向下扩展至胸降主动脉或腹主动脉
- E.内膜破口位于升主动脉近端，夹层局限于升主动脉及主动脉弓

38. 正常成人颅骨侧位 X线片测量蝶鞍前后径和深径的平均值分别为 ()

- A.10.5mm, 9.5mm
- B.11.7mm, 9.5mm
- C.12mm, 10mm
- D.5mm, 10mm
- E.10mm, 20mm

39. 有关 CT检查的临床应用中，以下哪项不对 ()

- A.颅脑肿瘤的检查首选普通 X线，次选 CT
- B.脑梗死的检查首选 CT, 次选血管造影
- C.椎间盘突出检查首选 CT, 次选脊髓造影
- D.椎管内肿瘤的检查首选 CT, 次选脊髓造影
- E.弥漫性轴索损伤首选 CT, 次选 MRI

40. 下述肺间质病变 CT表现，错误的是 ()

- A.小叶间隔增厚
- B.肺内长线状影
- C.胸膜下线
- D.网状阴影
- E.肺内致密结节影

41.

- A.呈新月形或半月形影，位于脾缘处
- B.呈圆形或椭圆形影，位于脾内
- C.相邻脾实质受压变平或呈内凹状
- D.新鲜血液的CT值略高或相近于脾的密度
- E.对比增强扫描脾实质强化而血肿不强化

42. 不符合脑结核的CT表现的是（ ）

- A.多位于幕下
- B.早期等密度，不均匀强化
- C.中期略高密度，环状强化
- D.晚期其中心形成钙化结节
- E.早中期可见灶周水肿

43. 目前诊断半月板撕裂，敏感性和特异性最高的影像学检查方法是（ ）

- A.CT
- B.X线关节造影
- C.X线平片
- D.MRI检查
- E.关节镜检查

44. 动静脉畸形（AVM）以下描述有误的是（ ）

- A.AVM多发生于幕上
- B.脑血管造影诊断最准确
- C.可见供血动脉和引流静脉
- D.可见钙化灶
- E.多有瘤内出血

45. 患者，女，20岁，小便失禁数年，MRI扫描见椎管内蚯蚓状流空信号，应诊断为（ ）

- A.星形细胞瘤
- B.椎管内动静脉畸形
- C.室管膜瘤
- D.血管网状细胞瘤
- E.未见异常

- A. 早期脑回之间界限模糊
- B. 早期可无异常发现
- C. 早期脑沟、脑池、大脑纵裂处密度增高
- D. 早期脑表面出现细条状或脑回状强化
- E. 早期室管膜或脑表面钙化

47. 不符合化脓性脑膜炎 CT表现的是 ()

- A. 基底池密度增高
- B. 增强后脑膜强化
- C. 脑室壁强化
- D. 脑实质内片状低密度区
- E. 脑室扩大

48. 颈椎病发病率最高的是 ()

- A. 脊髓型
- B. 椎动脉型
- C. 交感型
- D. 神经根型
- E. 混合型

49. 动静脉畸形的最佳检查方法为 ()

- A. CT
- B. MRI
- C. MRA
- D. DSA
- E. 增强 MRI

50. 儿童化脓性骨髓炎的脓肿，不易进入关节腔内的原因是 ()

- A. 脓肿容易局限和吸收
- B. 关节囊对关节腔有保护作用
- C. 干骺端骺板起屏障作用
- D. 儿童的关节有较强的抵抗力
- E. 新生骨膜起到屏障作用

- A.法洛三联症——右心室增大
- B.房间隔缺损——左心房增大
- C.二尖瓣关闭不全——左心室增大
- D.肺动脉狭窄——肺动脉段膨隆
- E.动脉导管未闭——“漏斗”征

52. 右下肺动脉正常直径范围为 ()

- A.9~16mm
- B.9~17mm
- C.10~15mm
- D.11~17mm
- E.11~16mm

53. 胆总管扩张分五型, 最常见的是 ()

- A. I型: 胆总管囊状或梭形扩张
- B. II型: 胆总管单发憩室胆总管正常
- C. III型: 胆总管下端在十二指肠壁内扩张并突入肠腔
- D. IV型: 多发囊肿, 肝内和肝外囊肿或多发肝外囊肿
- E. V型: 单发或多发肝内胆管囊肿即 Caroli 病

54. 前列腺癌发生部位主要是 ()

- A.70%发生于后部及周边区
- B.70%发生于前部和中央部
- C.90%发生于周边区
- D.5%发生于前部并突至膀胱
- E.5%发生于周边部突至直肠前凹

55. 腹部透视诊断肠梗阻的主要依据是 ()

- A.膈下游离气体
- B.间位结肠
- C.肠腔气液平
- D.肠壁钙化
- E.肠管扩张

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/067040032020006050>