

医生三基三严考试试题与答案

1、针对患者因迷走神经张力过高所致气道狭窄，宜选用的药物是（ ）（ ）

- A、白三烯调节剂
- B、异丙托溴铵
- C、吸入型糖皮质激素
- D、沙丁胺醇

答案：B

2、阿片类药物的使用需要一个（ ）的方案（ ）

- A、单一化、多模式、综合的
- B、系统化、单模式、综合的
- C、系统化、多模式、综合的
- D、系统化、多模式、单一的
- E、非系统化、多模式、综合的

答案：C

3、男，45岁。突发心脏骤停，经心肺复苏后血压70/40mmHg，心率34次/分。该患者应选用的药物是（ ）（ ）

- A、阿托品
- B、普罗帕酮
- C、利多卡因
- D、胺碘酮

答案：A

4、下列不属于不合理用药的原因的是（ ）（ ）

- A、未注意药物配伍的禁忌（理化）
- B、抗菌药物使用太广
- C、未注意药物之间药效学和药动学的影响
- D、药价低廉
- E、医务人员的业务水平所限

答案：D

5、下述关于胃X线解剖知识，错误的是（ ）

- A、角切迹至幽门间为胃窦
- B、仰卧位检查，胃窦靠背侧，胃体靠腹侧
- C、胃大弯侧的黏膜皱襞为斜行、横行而呈现不规则锯齿状
- D、胃底黏膜皱襞走向不规则
- E、双重对比造影能显示胃小区和胃小沟

答案：B

6、（ ）系统内的变化导致疼痛持续存在；疼痛导致大脑神经回路的改变（ ）

- A、循环
- B、中枢神经
- C、内分泌
- D、运动
- E、肺循环

答案：B

7、经腹壁胃肠超声检查，下列要求正确的是（ ）

- A、应在胃镜检查之后行超声检查
- B、超声检查小肠必须饮水
- C、超声检查大肠癌必须洗肠
- D、检查直肠前应排便
- E、检查胃必须饮水 400ml 以上

答案：D

8、超声引导穿刺时，常遇到穿刺针尖显示不清的情况，是由于（ ）

- A、声速失真
- B、棱镜伪像
- C、入射角较大产生回声失落
- D、旁瓣伪像
- E、增益过大

答案：C

9、男，51 岁。体检时诊断为高血压，并伴有左心室肥厚，该患者最宜服用的降压药物是（ ）（ ）

- A、钙通道阻滞剂
- B、利尿剂
- C、中枢性降压剂
- D、血管紧张素转换酶抑制剂

答案：D

10、以下哪项不是引起疼痛和敏化的主要因子（ ）（ ）

- A、NMDA 受体、钠通道、钙通道
- B、通过血清素激活途径的下行调节系统
- C、痛感因子
- D、激活 α_2 肾上腺素受体的去甲肾上腺素系统
- E、前列腺素、细胞因子和炎性介质

答案：C

11、对肺炎链球菌抗菌活性最强的是（ ）（ ）

- A、莫西沙星
- B、加替沙星
- C、左氧氟沙星
- D、吉米沙星
- E、斯帕沙星

答案：D

12、功效为清热燥湿，利尿通淋的中成药是（ ）（ ）

- A、复方石韦片
- B、三金片
- C、尿感宁颗粒
- D、复方金钱草颗粒

答案：A

13、严重脂肪肝演变为肝硬化时超声表现需除外的是（ ）

- A、腹水
- B、肝脏体积缩小
- C、肝内胆管扩张
- D、门静脉高压
- E、血管显示不清

答案：C

14、较大剂量阿司匹林引起的不良反应最为常见的是（ ）（ ）

- A、胃肠道反应
- B、凝血障碍
- C、诱发哮喘
- D、水杨酸反应

答案：A

15、先天性心脏病中多普勒超声检查呈双期连续性分流者为（ ）

- A、房间隔、室间隔缺损
- B、完全型心内膜垫缺损
- C、法洛四联症
- D、艾森门格综合征
- E、动脉导管未闭及主动脉窦瘤破裂

答案：E

16、大腿深部骨组织病变，深度达 15~18cm，应选用的探头频率为（ ）

- A、2.0MHz
- B、3.5MHz
- C、7.0MHz
- D、8.5MHz
- E、10.0MHz

答案：B

17、下列为下腔静脉主要属支的是（ ）

- A、髂总静脉、肝静脉、肠系膜上静脉
- B、髂总静脉、胃左静脉、脾静脉
- C、髂总静脉、肾静脉、肝静脉
- D、髂总静脉、胃左静脉、肠系膜下静脉
- E、髂总静脉、肝静脉、胃左静脉

答案：C

18、苯二氮卓类药物过量可用（ ）药物拮抗而解救（ ）

- A、碘解磷定
- B、阿托品
- C、氟马西尼
- D、纳洛酮

答案：C

19、关于氯胺酮的说法错误的是（ ）（ ）

- A、氯胺酮可应用于全身麻醉诱导、小儿基础麻醉以及复合麻醉
- B、氯胺酮不可应用于抗抑郁症治疗
- C、氯胺酮的“消费主体”呈现出以青少年为主的辐射状
- D、氯胺酮成本低廉，为贩卖氯胺酮的人员提供巨大的利润空间
- E、对吸食人员来说，吸食氯胺酮将会影响其心肺及神经中枢的功能

答案：B

20、长期用氯丙嗪治疗精神病，最常见的不良反应是（ ）（ ）

- A、锥体外系反应
- B、过敏反应
- C、痴呆
- D、内分泌障碍

答案：A

21、麻醉药品和第一类精神药品处方印刷用纸为（ ）（ ）

- A、白色
- B、黑色

- C、浅红色
- D、浅绿色
- E、浅蓝色

答案：C

22、连接甲状腺左右叶部位的名称是（ ）

- A、锥状叶
- B、尾状叶
- C、舌叶
- D、峡部
- E、喉头

答案：D

23、脉冲波多普勒超声最适用于检测（ ）

- A、最大血流速度
- B、高速血流的时相
- C、高速血流的性质
- D、选定部位的血流速度
- E、取样容积内红细胞数量

答案：D

24、下列哪一项不是应用激素的指征（ ）

- A、类风湿病伴心包炎
- B、风湿性心肌炎
- C、川崎病伴冠状动脉瘤
- D、系统性红斑狼疮
- E、过敏性紫癜有消化道症状

答案：C

25、动脉导管未闭与室间隔缺损的鉴别诊断要点是（ ）（ ）

- A、左心室扩大
- B、右心室扩大
- C、左心房扩大
- D、肺血增加
- E、主动脉扩张

答案：E

26、先天性无阴道常合并的畸形是（ ）

- A、残角子宫
- B、幼稚子宫

- C、先天性无子宫
- D、不全纵隔子宫
- E、单角子宫

答案：C

27、决定空间分辨率的主要因素是（ ）

- A、扫描方式
- B、有效视野
- C、重建矩阵
- D、显示矩阵
- E、探测器数目

答案：C

28、超声显示正常胃壁为五层回声，强弱排序从胃壁内至外正确的是（ ）

- A、强-弱-强-弱-强
- B、强-弱-强-强-弱
- C、强-弱-强-弱-弱
- D、弱-强-弱-强-弱
- E、弱-强-强-弱-强

答案：A

29、可授予限制使用级抗菌药物处方权的是（ ）（ ）

- A、具有高级专业技术职务任职资格的医师，经培训并考核合格后，方可授予
- B、具有中级以上专业技术职务任职资格的医师，经培训并考核合格后，方可授予
- C、具有初级专业技术职务任职资格的医师，经培训并考核合格后，方可授予
- D、具有初级专业技术职务任职资格的药师，经培训并考核合格后，方可授予
- E、具有中级以上专业技术职务任职资格的药师，经培训并考核合格后，方可授予

答案：B

30、烷化剂抗癌作用的机制是（ ）（ ）

- A、影响核酸生物合成
- B、直接破坏 DNA 并阻止其复制
- C、干扰转录过程阻止 RNA 合成
- D、影响蛋白质合成

E、影响激素平衡

答案：B

31、经眼睑行二维超声眼部检查，最佳探头频率是（ ）

A、3.0MHz

B、3.5MHz

C、4.5MHz

D、5.5MHz

E、7.5MHz

答案：E

32、对舒张期的快速充盈期叙述，下列错误的是（ ）

A、心室压力低于心房压力

B、出现在舒张早期

C、房室瓣开放

D、在此期 60%~80%的血液从心房充盈心室

E、即舒张末期，心房血液大量充盈心室

答案：E

33、男，12岁。有癫痫病史，服用苯妥英钠治疗，症状控制。近来停用苯妥英钠。改服中药7天。就诊当天，患儿突然癫痫发作，诊断为癫痫持续状态，抢救时应首选（ ）（ ）

A、丙戊酸钠

B、苯巴比妥

C、地西泮

D、卡马西平

答案：C

34、下列正常甲状旁腺解剖、生理和超声检查的叙述，不正确的是（ ）

A、甲状旁腺位于甲状腺左、右深面的上下极

B、甲状旁腺左右各2个，大小为长5mm、宽3mm、厚1mm

C、甲状旁腺呈圆形或椭圆形，回声较甲状腺稍低

D、甲状旁腺分泌甲状旁腺激素，调节血钙

E、用2~3MHz频率的超声探头可直接显示正常甲状旁腺

答案：E

35、成人颅脑超声对下列解剖结构可检测的是（ ）

A、脑中线

B、脑垂体

C、第三脑室

D、透明隔腔

E、松果体

答案：A

36、以下行为中，医疗机构不承担赔偿责任的是：（ ）

A、违反法律、行政法规、规章以及其他有关诊疗规范的规定

B、医务人员在诊疗活动中未尽到与当时的医疗水平相应的诊疗义务，造成患者损害

C、隐匿或者拒绝提供与纠纷有关的病历资料

D、限于当时的医疗水平难以诊疗

答案：D

37、经腹超声诊断前置胎盘时，膀胱应（ ）

A、适度充盈

B、过度充盈

C、排空后再充盈

D、少量充盈

E、无需充盈

答案：A

38、颈总动脉分叉为颈内、外动脉的正确部位是（ ）

A、胸锁乳突肌中点软骨环处

B、平锁骨水平

C、颌下腺上缘处

D、甲状软骨上缘处

E、第四气管环处

答案：D

39、属于时间依赖性的抗菌药物是（ ）（ ）

A、氨基糖苷类

B、大环内酯类

C、氟喹诺酮类

D、酮内酯类

E、两性霉素 B

答案：B

40、杏苏止咳颗粒主治（ ）（ ）

A、风热咳嗽

B、风寒感冒咳嗽

C、燥热咳嗽

D、气虚咳嗽

答案：B

41、合并双侧肾动脉狭窄的高血压患者降压不宜首选（ ）（ ）

A、钙通道阻滞剂

B、血管紧张素转换酶抑制剂

C、利尿剂

D、 β 受体阻滞剂

答案：B

42、下列不属于抗菌药物临床应用监测的是（ ）（ ）

A、抗菌药物临床应用基本情况调查

B、抗菌药物联合应用情况

C、减少抗菌药物联合应用

D、感染患者微生物标本送检率

E、分级管理制度的执行情况

答案：C

43、急性胆囊炎的超声表现，下列描述错误的是（ ）（ ）

A、胆囊增大

B、胆囊壁增厚，呈双边影

C、常伴有结石

D、胆囊收缩功能亢进

E、胆囊内可见细弱光点沉积

答案：D

44、男，60 岁。前列腺增生症 2 年，有尿频、尿痛、尿急、排尿困难，治疗药物不包括（ ）（ ）

A、非那雄胺

B、琥珀胆碱

C、特拉唑嗪

D、坦索罗辛

答案：B

45、心包积液时，下列超声表现不正确的是（ ）

A、当液暗区超过 25mm 时，积液量常>1000ml

B、少量积液即可清晰显示

C、少量积液多见于右心室前壁之前

D、大量积液时，下腔静脉内径增宽

E、坐位探查时心尖部液性暗区加宽

答案：C

46、下列哪种药物不加速胆红素代谢和排泄（ ）（ ）

- A、泼尼松
- B、白蛋白
- C、苯巴比妥
- D、三黄汤
- E、地西泮

答案：E

47、肾功能不全患者无需调整剂量的是（ ）（ ）

- A、利奈唑胺
- B、万古霉素
- C、替考拉宁
- D、达托霉素
- E、头孢菌素

答案：A

48、亚硝酸盐中毒的解救药是（ ）（ ）

- A、阿托品
- B、亚甲蓝
- C、解磷定
- D、纳洛酮

答案：B

49、下述 5 种法定性病中，何种系衣原体所致（ ）（ ）

- A、梅毒
- B、淋病
- C、软下疳
- D、性病性淋巴肉芽肿
- E、腹股沟肉芽肿

答案：D

50、容易引起严重低血糖的药物是（ ）（ ）

- A、噻唑烷二酮类
- B、格列奈类
- C、磺酰脲类
- D、双胍类

答案：C

51、超声造影应用微气泡做造影剂，下列不是微气泡必须具有的要点是（ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/077130166066006041>