

## 医院新入职护士理论考核试题与答案

1. 静脉输液发生空气栓塞而导致病人死亡，其原因是空气阻塞了：（）
  - A. 上腔静脉入口
  - B. 下腔静脉入口
  - C. 肺静脉入口
  - D. 肺动脉入口(正确答案)
  - E. 主动脉入口
2. 使用止血带止血时，应注意：（）
  - A. 扎止血带时间不宜>2h，每 30min 松带一次，间歇 30s~1min
  - B. 扎止血带时间不宜>1h，每 30min 松带一次，间歇 30s~1min(正确答案)
  - C. 扎止血带时间不宜>1h，每 30min 松带一次，间歇 30min~1h
  - D. 扎止血带时间不宜>30min，每 1h 松带一次，间歇 30s~1min
  - E. 扎止血带时间不宜>2h，每 1h 松带一次，间歇 30s~1min
3. 判断口对口人工呼吸法是否有效，首先观察：（）
  - A. 口唇紫绀是否改善
  - B. 瞳孔是否缩小
  - C. 吹气时阻力大小
  - D. 病人胸廓是否起伏(正确答案)
  - E. 剑突下隆起
4. 一般成人鼻饲胃管插入深度为：（）
  - A. 20~30cm
  - B. 35~40cm
  - C. 45~55cm(正确答案)
  - D. 40~60cm
  - E. 60~65cm
5. 询问患者：如“你现在在什么地方？”是对哪项能力的评估：（）

- A. 时间定向力
  - B. 地点定向力(正确答案)
  - C. 空间定向力
  - D. 人物定向力
  - E. 认知能力
6. 暖箱的温度应根据患儿的什么设定：（）
- A. 体重(正确答案)
  - B. 年龄
  - C. 体温
  - D. 肛温
  - E. 身高
7. 吸痰机、床旁负压吸引器多长时间清洁擦拭一次：（）
- A. 每天
  - B. 2周
  - C. 3周
  - D. 4周
  - E. 每周(正确答案)
8. 经口气管插管时，放置牙垫的位置是：（）
- A. 上、下臼齿之间(正确答案)
  - B. 上、下门齿之间
  - C. 上、下智齿之间
  - D. 上、下第三牙齿之间
  - E. 上、下第四牙齿之间
9. 手法开放气道时，应给患者：（）
- A. 仰卧位(正确答案)
  - B. 头高足低位
  - C. 头低足高位
  - D. 侧卧位

E. 仰卧位头偏向一侧

10. 肠鸣音活跃是指肠鸣音：（）

A. >5次/分

B. >8次/分

C. >10次/分(正确答案)

D. >9次/分

E. >7次/分

11. 吸痰机的引流瓶应在清洁后放入有效氯 500mg/L (50010-6 ) 消毒剂浸泡多长时间：（）

A. 10 min

B. 20 min

C. 30 min (正确答案)

D. 40 min

E. 60 min

12. 给病人洗胃时，每次注入的洗胃液量是：（）

A. 100~200ml

B. 200~250ml

C. 300~500ml(正确答案)

D. 100~250ml

E. 600~700ml

13. 清除物品上除芽孢以外的所有致病微生物的方法称为：（）

A. 灭菌(正确答案)

B. 无菌

C. 消毒

D. 清洁

E. 抑菌

14. 关于血压的叙述中，正确的是：（）

A. 女性血压高于男性

- B. 右臂血压高于左臂 10~20mmHg(正确答案)
- C. 运动时, 血压降低
- D. 下肢血压高于上肢 50~60mmHg
- E. 血压在傍晚时较清晨稍低
15. 外用溶液开启后, 其使用的时间不能超过: ( )
- A. 4 小时
- B. 12 小时
- C. 24 小时(正确答案)
- D. 8 小时
- E. 48 小时
16. 气管插管低张气囊一般多长时间放气一次: ( )
- A. 30min~1h
- B. 1~2h
- C. 2~3h
- D. 4~6h(正确答案)
- E. 7~8h
17. 静脉输液发生空气栓塞应立即让病人采取的卧位是: ( )
- A. 直立位
- B. 垂头仰卧位
- C. 左侧卧位及头低足高位(正确答案)
- D. 右侧卧位
- E. 半坐卧位
18. 酒精擦浴后体温低于多少度时应撤去冰袋: ( )
- A. 37℃
- B. 37.5℃
- C. 38℃
- D. 38.5℃
- E. 39℃(正确答案)

19. 为了预防患者跌倒，尽量将床的高度设置为：（）
- A. 随患者意愿
  - B. 最高位
  - C. 最低位(正确答案)
  - D. 方便医护人员操作
  - E. 方便患者家属护理
20. 行膀胱冲洗时，冲洗液的流速一般为：（）
- A. 40~50 滴 / 分
  - B. 80~100 滴 / 分(正确答案)
  - C. 130 滴 / 分
  - D. 110 滴 / 分
  - E. 120 滴 / 分
21. 医院内所有的区域都应当采取：（）
- A. 消毒隔离
  - B. 标准预防(正确答案)
  - C. 接触隔离
  - D. 飞沫隔离
  - E. 空气隔离
22. 糖尿病酮症酸中毒和尿毒症酸中毒的病人可出现哪种呼吸异常：（）
- A. 呼吸过速
  - B. 呼吸过缓
  - C. 深度呼吸(正确答案)
  - D. 浅快呼吸
  - E. 间断呼吸
23. 为尿潴留患者首次导尿时放出的尿量不应超过：（）
- A. 500ml
  - B. 800ml
  - C. 1000ml(正确答案)

D. 1500ml

E. 2000ml

24. 以下哪项不是冷疗的禁忌症：（）

A. 血液循环障碍

B. 慢性炎症

C. 深部化脓病灶

D. 组织损伤破裂

E. 软组织损伤 48h 内(正确答案)

25. 氧气筒内氧气不能用尽，一般需留  $5\text{kg} / \text{cm}^2$ ，其目的是：（）

A. 便于再次充气

B. 防充气时引起爆炸(正确答案)

C. 便于检查氧气装置有无漏气

D. 便于调节氧流量

E. 使流量平稳，便于使用

26. 行氧气雾化吸入时，其氧流量应调节为：（）

A.  $4\sim 5\text{L} / \text{min}$

B.  $3\sim 5\text{L} / \text{min}$

C.  $6\sim 8\text{L} / \text{min}$ (正确答案)

D.  $10\text{L} / \text{min}$

E.  $9\text{L} / \text{min}$

27. 患者男性，65岁，因呼吸困难行气管插管呼吸机辅助呼吸，第二天突然出现  $\text{SpO}_2$  下降至 90%，呼吸机高压报警，听诊双肺湿啰音，正确的处理方法是：

（）

A. 给患者翻身叩背

B. 调整呼吸机参数

C. 雾化吸入

D. 即给患者吸痰(正确答案)

E. 应用呼吸兴奋剂

28. 服用洋地黄类药物时，护士应重点观察：（）

- A. 胃肠道反应
- B. 是否成瘾
- C. 心率、心律(正确答案)
- D. 体温
- E. 有无皮疹

29. 跌倒被认为是老年人最常见的：（）

- A. 并发症
- B. 意外事件(正确答案)
- C. 临床症状
- D. 致病因素
- E. 致病诱发因素

30. 洗手时不符合手卫生要求的是：（）

- A. 洗手时应注意清洗指甲、指尖、指甲缝和指关节
- B. 手拧式开关，应采用防止手部再污染的方法关闭水龙头
- C. 冲洗时，手指朝上，让污水从指尖流至前臂(正确答案)
- D. 防止水溅到衣服和地面 E、冲洗至皂液洗液为止

31. 从静脉注射部位沿静脉走向出现条索状红线、肿痛等症状时宜：（）

- A. 适当活动患肢
- B. 降低患肢并用 50%硫酸镁湿敷
- C. 抬高患肢并用 50%硫酸镁湿敷(正确答案)
- D. 生理盐水热敷
- E. 70%酒精湿热敷

32. 张女士，消化道溃疡久治不愈，今突然呕血约 700ml，立即给予输血，10min 后病人主诉头痛，发热，四肢麻木，腰背部剧烈疼痛伴胸闷，气促。病情继续发展可能出现：（）

- A. 寒战，高热不退
- B. 喉头水肿，呼吸困难

- C. 严重缺氧，心跳骤停
  - D. 黄疸，血红蛋白尿(正确答案)
  - E. 咳嗽，咯粉红色泡沫样痰
33. 血糖试纸开启后，多长时间不能再使用：（）
- A. 一个月
  - B. 二个月
  - C. 三个月(正确答案)
  - D. 半年
  - E. 没具体规定
34. 隔离衣一般多长时间更换一次：（）
- A. 每天(正确答案)
  - B. 每周
  - C. 每三天
  - D. 每月
  - E. 每二天
35. 铜绿假单胞菌感染的患者应选用的漱口液是：（）
- A. 1%~4%碳酸氢钠溶液
  - B. 1%~3%过氧化氢溶液
  - C. 0.1%醋酸溶液(正确答案)
  - D. 2%~3%硼酸溶液
  - E. 0.02%呋喃西林溶液
36. 护理压疮时，用50%乙醇按摩局部皮肤的目的是：（）
- A. 消毒皮肤
  - B. 润滑皮肤
  - C. 去除污垢
  - D. 促进血液循环(正确答案)
  - E. 降低体温



37. 怀疑患者颈椎脊髓损伤时，专业救护者打开患者气道应使用的方法是：  
( )

- A. 仰头举颞法
- B. 举头抬颈法
- C. 双手推举(托)下颌法(正确答案)
- D. 头部前屈法
- E. 仰头(面)抬颈法

38. 对口腔粘膜的护理评估包括口腔气味、口唇色泽、口腔粘膜是否完整等，当患者出现肝昏迷会表现： ( )

- A. 烂苹果味
- B. 氨臭味(正确答案)
- C. 大蒜味
- D. 口唇发绀
- E. 口唇樱桃红色

39. 经气管套管吸痰插管深度为： ( )

- A. 3~5cm
- B. 5~6cm
- C. 7~8cm
- D. 8~9cm
- E. 10~-20cm(正确答案)

40. 实施有创或高危护理活动前，不得仅以床号作为识别患者的依据，应主动使用几种以上的患者识别方法： ( )

- A. 一种
- B. 二种以上(正确答案)
- C. 三种以上
- D. 四种以上
- E. 五种以上

41. 长期使用暖箱的患儿，应多长时间更换一次暖箱： ( )

- . 1周(正确答案)
  - B. 3天
  - C. 2周
  - D. 1个月
  - E. 3周
42. 标准化的 OGTT 抽血的正确时间顺序为：（）
- A. 服 75g 葡萄糖前，服糖后 30 min，60min，120min，180min(正确答案)
  - B. 服 75g 葡萄糖前，服糖后 30min，60min，90min
  - C. 服 75g 葡萄糖前，服糖后 1h，2h，3h
  - D. 服 75g 葡萄糖后 30min，60min，120min
  - E. 服 75g 葡萄糖后 1h，2h，3h，4h
43. 下列哪些疾病禁用生理盐水灌肠：（）
- A. 肝昏迷
  - B. 充血性心力衰竭(正确答案)
  - C. 顽固性便秘
  - D. 伤寒
  - E. 高热惊厥
44. 成人气管插管高容量低压气囊注气量一般为：（）
- A. 3~5ml
  - B. 5~8 ml
  - C. 8~10 ml (正确答案)
  - D. 10~12 ml
  - E. 12~15 ml
45. 以下患者不需要进行特殊口腔护理的是：（）
- A. 高热患者
  - B. 昏迷患者
  - C. 下肢外伤患者(正确答案)
  - D. 危重患者

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/108054034116006023>