

## 中医眼科学试题及答案

1、胞睑厚硬, 睑内颗粒累累, 色红而坚, 伴赤膜下垂, 眼内灼热刺痛, 沙涩羞明者, 宜用

- A. 银翘散
- B. 除风清脾饮
- C. 归芍红花汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 清脾散

**【答案】** E

2、糖尿病可以引起眼部多种并发症, 其中最常见. 最严重的并发症是

- A. 眼肌麻痹
- B. 糖尿病性白内障
- C. 缺血性视神经病变
- D. 糖尿病性视网膜病变
- E. 新生血管性青光眼

**【答案】** D

3、针眼脓肿成熟, 脓头位于眼睑皮肤面者, 治疗应

- A. 切开排脓, 切口应与睑缘平行
- B. 切开排脓, 切口应与睑缘垂直
- C. 切开排脓, 切口应与眶缘垂直

- D. 切开排脓, 切口应与睑板面垂直
- E. 切开排脓, 切口应与皮肤面垂直

【答案】A

4、以下哪项不是聚星障的眼部体征

- A. 抱轮红赤
- B. 黑睛表面点状混浊
- C. 黑睛病灶呈树枝状
- D. 黑睛病灶呈地图状
- E. 黑睛病灶状如豆腐渣

【答案】E

5、患儿5岁, 裸眼视力右0.1, 左0.2, 眼外观无明显异常, 屈光间质无混浊, 眼底大致正常, 须行屈光状态检查, 应选

- A. 睫状肌麻痹验光
- B. 插片验光
- C. 电脑验光
- D. 综合验光仪验光
- E. 以上都不是

【答案】A

6、凝脂翳的障翳形态特征是

- A. 状如豆腐渣, 干燥, 粗糙, 易刮下

- B. 状如凝脂. 表面湿润. 不易刮下
- C. 状如凝脂. 表面干燥. 不易刮下
- D. 状如凝脂. 表面湿润. 易刮下
- E. 状如凝脂. 表面干燥. 易刮下

**【答案】** B

7、与血脉瘀滞有关的眼病有

- A. 聚星障
- B. 络阻暴盲
- C. 青盲
- D. 圆翳内障
- E. 撞击伤目

**【答案】** BCE

8、患儿 5 岁, 裸眼视力右 0. 1, 左 0. 2, 眼外观无明显异常, 屈光间质无混浊, 眼底大致正常, 须行屈光状态检查, 应选

- A. 睫状肌麻痹验光
- B. 插片验光
- C. 电脑验光
- D. 综合验光仪验光
- E. 以上都不是

**【答案】** A

9、睫状体扁平部占睫状体的

A. 0.3

B. 0.6.....7

C. 0.25

D. 0.4

E. 0.16.....67

**【答案】** B

**【解析】**

10、过熟期白内障,晶状体皮质分解.乳化成乳白色颗粒,名称为

A. KP

B. Kayser-Fleischer 环

C. Morgagnian 小体

D. Fuchs 斑

E. 以上都不是

**【答案】** C

11、五轮辨证结合脏腑生克关系,对先发白睛红赤,继而出现黑睛星翳,应属

A. 土壅木郁

B. 肾水克脾土

C. 肺金乘肝木

D. 肝木克脾土

E. 心火乘肺金

**【答案】C**

12、火疳后期,眼痛轻,白睛血丝紫暗,局部结节隆起不甚,全身潮热额红,鼻干咽燥,舌红少津,脉细数,应选用的方剂是

A. 龙胆泄肝汤

B. 清胃汤

C. 养阴清肺汤

D. 银翘散

E. 化坚二陈汤

**【答案】C**

13、《原机启微》“其病隐涩不自在,稍觉眵噪,视物微昏”所描述的“热积必溃之病”是指( )

A. 漏睛

B. 漏睛疮

C. 睑弦赤烂

D. 针眼

E. 蟹睛

**【答案】A**

14、十二经脉中,以本经直接上连目系

- A. 手少阴心经
- B. 足厥阴肝经
- C. 足太阴脾经
- D. 手太阴肺经
- E. 足少阴肾经

【答案】B

15、患者自幼双眼内斜,眼球向个方向运动不受限制,其诊断是

- A. 风牵偏视
- B. 通睛
- C. 瞳神反背
- D. 疳积上目
- E. 以上都不是

【答案】B

16、双眼上胞下垂,起病缓慢,晨起病轻,午后加重,休息后减轻,劳累后加重,辨证考虑为

- A. 先天不足
- B. 脾虚气弱
- C. 肝肾亏虚
- D. 风痰阻络
- E. 肝郁气滞

**【答案】** B

17、患者黑睛浑浊,表面粗糙,边界模糊,发展迅速,伴目赤疼痛,属于

- A. 新翳
- B. 宿翳
- C. 赤膜
- D. 白膜
- E. 以上都不是

**【答案】** C

18、五轮辨证中,胞睑肿硬,并见白睛红赤,应属

- A. 肝胆火盛
- B. 肝胆湿热
- C. 脾胃湿热
- D. 心火亢盛
- E. 肺脾实热

**【答案】** E

19、中医眼科从什么朝代开始独立成为一门专科

- A. 隋朝
- B. 唐朝
- C. 宋朝

D. 元朝

E. 明朝

**【答案】** C

20、患者真睛破损, 伤眼剧痛, 视力剧降, 头痛如裂, 胞睑瘀血肿胀, 白睛混赤, 神水混浊, 晶珠破损混浊。下列哪一方剂适用

A. 驱风散热饮子

B. 除风益损汤

C. 五味消毒饮

D. 退热散和五味消毒饮

E. 补中益气汤

**【答案】** D

21、眼外伤后患眼瞳神不圆, 呈 D 形, 当属

A. 胞睑受伤

B. 黄仁受伤

C. 白睛受伤

D. 晶珠受伤

E. 黑睛受伤

**【答案】** B

22、胞睑红肿热痛, 伴大便干结, 多为

A. 外感风热



- B. 阳明实火
- C. 脾胃湿热
- D. 心火上炎
- E. 肝胆火炽

【答案】B

23、某人踢球撞击右眼一小时后,发现前房出血,面部眼部无伤口,你选择哪一种治法

- A. 加压包扎双眼,内服活血祛瘀药物
- B. 冷敷,包双眼,服止血药,半坐卧位休息
- C. 热敷,包右眼,服止血药
- D. 即行前房穿刺,抽尽积血,以避免堵塞房角,引起继发性青光眼
- E. 安静卧床,观察出血是否进行性增加,再决定是否使用活血祛瘀药

【答案】B

24、患者 15 岁,胞睑内生硬核,皮色如常,按之不痛,睑内呈灰蓝色隆起,舌苔薄白,脉缓,宜采用下列何方加减治疗

- A. 化坚二陈汤
- B. 温胆汤
- C. 四君子汤
- D. 仙方活命饮
- E. 以上都不是

**【答案】** A

25、患者双目珠干涩,黑睛星翳时隐时现,伴有头晕.口干.心烦失眠,舌红少苔,脉细数,应采用以下何种方法

- A. 退翳明目法
- B. 补益肝肾法
- C. 滋阴降火法
- D. 益气养血法
- E. 以上都不是

**【答案】** C

26、混睛障的翳障形态特征是:

- A. 黑睛表层呈圆盘状灰白色混浊,荧光素染色阳性
- B. 黑睛深层呈圆盘状灰白色混浊,荧光素染色阴性
- C. 黑睛深层呈圆盘状灰白色混浊,荧光素染色阳性
- D. 黑睛深层呈地图状灰白色混浊,荧光素染色阴性
- E. 黑睛表层呈圆盘状灰白色混浊,荧光素染色阴性

**【答案】** B

27、胎风内障的病因是

- A. 外伤
- B. 先天
- C. 年老

D. 中毒

E. 辐射

**【答案】B**

28、验光时为准确获得调节静止状态的屈光度数,应在

A. 充分休息后

B. 点用抗疲劳眼液后

C. 睫状肌麻痹后

D. 充分阅读后

E. 充分望远后

**【答案】C**

29、患者,女,76岁。眼痛,畏光流泪,抱轮红赤,黑睛深层灰白色混浊,由周边向中央蔓延,兼见头痛、鼻塞、舌红,苔薄黄,脉浮数,辨证属何证型

A. 肝经风热证

B. 肝胆热毒证

C. 湿热内蕴证

D. 虚火上炎证

E. 正虚邪留证

**【答案】A**

30、患者,女,45岁,左眼碇涩疼痛1周,曾自用氧氟沙星滴眼液未见好转,伴有畏光流泪,检查见白睛混赤,黑睛浅层点状混浊互相融合成树枝状,全身见胁痛,口苦咽干,溺黄;舌红苔黄,脉弦数。其中医诊断为

- A. 凝脂翳
- B. 聚星障
- C. 混睛障
- D. 湿翳
- E. 花翳白陷

【答案】B

31、某人踢球撞击右眼一小时后,发现前房出血,面部眼部无伤口,你选择哪一种治法

- A. 加压包扎双眼,内服活血祛瘀药物
- B. 冷敷,包双眼,服止血药,半坐卧位休息
- C. 热敷,包右眼,服止血药
- D. 即行前房穿刺,抽尽积血,以避免堵塞房角,引起继发性青光眼
- E. 安静卧床,观察出血是否进行性增加,再决定是否使用活血祛瘀药

【答案】B

32、眼球穿通伤最严重的并发症是

- A. 角膜穿破,遗留白斑
- B. 眼内感染致视力突降

- C. 发生交感性眼炎
- D. 产生外伤性白内障
- E. 引起伤眼视网膜脱离

【答案】C

33、眼之能够明视万物, 辨别颜色, 是赖

- A. 肾精充养
- B. 脾气温养
- C. 肝气条达
- D. 肝血升运
- E. 五脏六腑精气的滋养

【答案】E

34、《眼科纂要》中新制柴连汤的药物组成

- A. 柴胡. 黄连. 茯苓. 荆芥. 赤芍. 防风. 独活. 决明子
- B. 柴胡. 黄连. 黄芩. 白术. 木贼. 枳壳. 当归
- C. 柴胡. 黄连. 黄芩. 白术. 荆芥. 枳壳. 川芎. 防风. 羌活. 独活
- D. 柴胡. 黄连. 黄柏. 茯苓. 荆芥. 赤芍. 防风. 羌活. 独活. 前湖
- E. 柴胡. 黄连. 黄芩. 赤芍. 蔓荆子. 栀子. 龙胆草. 川木通. 荆芥. 防风. 甘草

【答案】E

35、瞳神紧小的主要临床特征是

- A. 白睛混赤, 瞳仁紧小, 目珠触痛, 黄液上冲, 血灌瞳神
- B. 抱轮红赤, 瞳仁缩小, 瞳仁边缘有白色渗出物黏附
- C. 抱轮红赤, 黑睛里层下方有沉着物, 黄仁肿胀, 瞳仁缩小, 阴看不大, 阳看不小
- D. 抱轮红赤, 神水混浊, 瞳仁边缘似锯齿或梅花样
- E. 白睛混赤肿胀, 神水混浊, 黄液上冲迅速增多, 黄仁灰黄, 瞳仁缩小, 瞳后隐约可见黄光反射

【答案】C

36、糖尿病可以引起眼部多种并发症, 其中最常见. 最严重的并发症是

- A. 眼肌麻痹
- B. 糖尿病性白内障
- C. 缺血性视神经病变
- D. 糖尿病性视网膜病变
- E. 新生血管性青光眼

【答案】D

37、患者视物昏蒙日久, 眩晕耳鸣, 健忘失眠, 眼干口燥, 烦热 , 腰膝酸软, 舌红少苔, 脉细数。下列哪一方剂适用

- A. 四物汤
- B. 四君子汤
- C. 泻脾除热饮
- D. 除湿汤

E. 四物五子丸

**【答案】** E

38、中医称角膜为

A. 白睛

B. 黑睛

C. 视衣

D. 瞳神

E. 神水

**【答案】** B

**【解析】**

39、首次明确地提出了生食五辛. 夜读细书等眼病十九种病因的是

A. 《外合秘要》

B. 《备急千金要方》

C. 伤寒杂病论》

D. 《诸病源候论》

E. 龙树眼论》

**【答案】** B

**【解析】**

40、患者发病急, 瞳神紧小, 目赤痛, 视物昏蒙, 神水混浊, 黄仁纹理不清, 头重胸闷, 肢节肿痛, 舌红苔黄腻, 脉濡数, 应选用的方剂是

- A. 龙胆泻肝汤加减
- B. 新制柴连汤加减
- C. 抑阳酒连散加减
- D. 三仁汤加减
- E. 甘露饮加减

【答案】C

41、动眼神经从眼眶的哪个孔裂通过

- A. 眶上裂
- B. 视神经孔
- C. 眶下裂
- D. 眶上切迹
- E. 视神经管

【答案】A

42、约束相当于西医学之

- A. 眼外肌
- B. 眼睑
- C. 虹膜
- D. 动眼神经
- E. 视神经



**【答案】** B

43、患漏睛疮属于风热上攻型, 症见大眦角处红肿疼痛, 头痛泪多, 恶寒发热者应用何方为宜

- A. 黄连解毒汤
- B. 千金托里散
- C. 驱风散热饮子
- D. 驱风一字散
- E. 竹叶泻经汤

**【答案】** C

44、主要用于外感风热眼病的内治法是

- A. 泻火解毒法
- B. 滋阴降火法
- C. 疏风清热法
- D. 退翳明目法
- E. 祛风散寒法

**【答案】** C

45、金疳与火疳的鉴别要点中, 不正确的是

- A. 金疳位于白睛表层
- B. 火疳位于白睛里层
- C. 金疳为紫红色结节隆起

D. 火疳容易复发

E. 以上均不对

**【答案】C**

46、患者,女,52岁。眼睑不能完全闭合,自觉眼内干涩,畏光流泪,白睛红赤,黑睛暴露处生翳,视力下降,可诊断为

A. 湿翳

B. 暴露赤眼生翳

C. 凝脂翳

D. 宿翳

E. 混睛障

**【答案】B**

47、患眼痒涩刺痛,胬肉高厚红赤,眦头尤甚;心烦多梦,或口舌生疮,小便短赤;舌尖红,脉数。证属

A. 阴虚火旺

B. 脾胃实热

C. 心火上炎

D. 心肺风热

E. 肝火上亢

**【答案】C**

48、胞睑红肿热痛,伴大便干结,多为

- A. 外感风热
- B. 阳明实火
- C. 脾胃湿热
- D. 心火上炎
- E. 肝胆火炽

【答案】B

49、眼前有黑影飘浮,视物昏蒙,视膏呈尘状絮状混浊,兼见头重胸闷,口苦心烦,舌红苔黄腻,脉濡数,宜用

- A. 知柏地黄丸
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 三仁汤
- D. 六君子汤
- E. 丹栀逍遥散

【答案】C

50、患者视力渐降,日久失明,视盘色苍白,面色无华,唇甲色淡,神疲乏力,心悸气短;舌淡苔薄白,脉细无力。下列哪一方剂适用

- A. 四物五子丸
- B. 逍遥散
- C. 归脾汤
- D. 八珍汤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/118032136061006035>