

口腔颌面外科学模拟题库含答案

1、下列诊断方法中不适用于舍格伦综合征的是

- A、询问病史、体检
- B、施墨试验
- C、唾液流量测定
- D、腮腺活检
- E、类风湿因子检查

答案：D

2、畸形中央尖折断导致牙髓和根尖感染，x线片上牙根显示

- A、牙根较短，根尖孔扩大呈喇叭口形
- B、根管变细、根尖孔闭锁
- C、牙根变长
- D、正常影像
- E、根管钙化

答案：A

3、腭的形成是在

- A、胚胎第5周
- B、胚胎第6周
- C、胚胎第8周
- D、胚胎第12周
- E、胚胎第4个月

答案：D

4、不属于新生儿骨髓炎的病因的是

- A、产道感染
- B、脐带感染
- C、母亲患化脓性乳腺炎
- D、泪囊感染
- E、医源性感染

答案：A

5、腭裂术后发生创口穿孔(腭痿)的最主要原因是

- A、饮食
- B、张力过大
- C、出血
- D、感染
- E、患儿哭闹

答案：B

6、常规成年人进行全口牙齿检查时，一般需用牙片

- A、6 张
- B、8 张
- C、10 张
- D、14 张
- E、16 张

答案：D

7、肾上腺素可引起的不适中，不包括

- A、心悸
- B、恐惧
- C、颤抖
- D、头痛
- E、麻木

答案：E

8、室性心律失常病员首选的局麻药是

- A、利多卡因
- B、普鲁卡因
- C、的卡因
- D、布比卡因
- E、卡波卡因

答案：A

9、下列关于神经纤维瘤的叙述，错误的是

- A、多发性神经纤维瘤又称为神经纤维瘤病
- B、因肿瘤质地柔软、瘤内血运丰富，故可被压缩
- C、神经纤维瘤病有遗传倾向
- D、头面部多发性神经纤维瘤病可伴有枕骨缺损
- E、神经纤维瘤是良性肿瘤

答案：B

10、患者男，30 岁。因右下颌智齿冠周炎，造成下颌下间隙、颞下间隙、翼下颊间隙脓肿。切开引流的最佳方法为

- A、于上颌结节外侧前庭沟切开
- B、于翼下颌韧带稍内侧切开
- C、于下颌角下方切开
- D、于下颌支后缘切开

E、于颞部及下颌角下方切开并

答案：C

11、带蒂皮瓣的断蒂手术一般在第一次手术后多久实施

A、7天

B、7~14天

C、14~21天

D、21~30天

E、30~40天

答案：C

12、根据正颌外科截骨手术后骨愈合以及生物力学特点，术后追踪观察至少应持续

A、2个月

B、3个月

C、6个月

D、8个月

E、10个月

答案：C

13、患者男,20岁。右下颌中位水平阻生第三磨牙拔除术后4小时,伤口仍出血,否认全身疾病史,分析出血原因,不包括

A、未完全缝合软组织切口

B、损伤下牙槽动脉

C、牙槽骨内小血管破裂

D、感染

E、术后反复漱口

答案：D

14、口腔颌面部损伤后,伤口愈合快,抗感染强是由于

A、神经分布细密

B、肌肉的功能活动

C、血液供应丰富

D、咀嚼运动的促进作用

E、伤口暴露容易清洁

答案：C

15、唇、舌、耳、鼻及眼睑断裂伤,离体组织尚完好,应尽量将离体组织缝回原处,但一般不宜超过

A、1小时

B、2 小时

C、4 小时

D、6 小时

E、8 小时

答案：D

16、与恶性淋巴瘤发生有关的因素是

A、细菌感染

B、创伤

C、病毒感染

D、口腔癌前病变

E、腌制与霉变食物

答案：C

17、牙科用高速手机灭菌应首选

A、高温蒸汽灭菌法

B、玻璃球灭菌法

C、浸泡消毒法

D、酚类消毒

E、盐灭菌法

答案：A

18、颞下颌关节紊乱病，错误的是

A、有自限性

B、关节间隙改变常见

C、有时需与鼻咽癌鉴别

D、严重者可致关节强直

E、关节弹响和杂音是主要症状

答案：D

19、比较理想的表面麻醉药是

A、普鲁卡因

B、利多卡因

C、丁卡因

D、可卡因

E、氯乙烷

答案：C

20、女，49 岁。因左下牙疼痛 2 个月，下唇麻木 3 周就诊。检查见，左下唇较对侧感觉迟钝，右下智齿松动 II 度，无龋坏。全景片示左下颌体区见一

2cm x 3cm 的边界不清的密度减低区，牙根有吸收。根据以上临床表现，最可能的诊断是

- A、下颌骨骨髓炎
- B、成釉细胞瘤
- C、角化囊肿
- D、含牙囊肿
- E、中央性颌骨癌

答案：E

21、与普鲁卡因比较，以下哪项不是利多卡因的特点

- A、麻醉作用强，用量应比普鲁卡因小
- B、有较强组织穿透性和扩散性
- C、维持时间较短
- D、毒性较大，但可用作表面麻醉
- E、有抗室性心律失常作用

答案：C

22、II度腭裂的最佳手术时机

- A、3~7个月
- B、1~2岁
- C、7-14个月
- D、9~12岁
- E、1-4个月

答案：B

23、颌面部硬组织损伤独具的特点是常伴有

- A、颅脑损伤
- B、水肿反应明显
- C、咬合关系错乱
- D、呼吸阻塞
- E、骨创感染

答案：C

24、在上颌前牙位根尖片上，不可能看到的颌骨解剖标志是

- A、切牙孔
- B、鼻中隔
- C、鼻腔
- D、上颌窦
- E、腭中缝

答案：E

25、筛窦在几岁以后进行 x 线检查方具有价值

- A、2 岁
- B、3 岁
- C、6 岁
- D、10 岁
- E、20 岁

答案：C

26、关于 Malassez 上皮剩余的叙述，错误的是

- A、存在于牙周膜内邻近牙根表面的纤维间隙中
- B、是牙根发育期上皮根鞘残留下来的上皮细胞
- C、上皮可增殖成为颌骨囊肿的来源
- D、放射线及损伤因素会刺激上皮增殖
- E、是牙源性肿瘤的来源之一

答案：D

27、某患者被硬物撞击，经 x 线片检查证实为上颌前部的牙槽突骨折伴牙龈撕裂伤。对处理方法下列描述错误的是

- A、缝合撕裂的牙龈
- B、局麻下将牙槽突及牙齿复位
- C、单颌结扎固定
- D、调 HE 减少咬合干扰
- E、颌间结扎固定

答案：E

28、金黄色葡萄球菌感染形成的脓液为

- A、黄色黏稠脓液
- B、淡黄色稀薄脓液
- C、翠绿色、稍黏稠、有酸臭味的脓液
- D、灰白或灰褐色、有明显腐败坏死臭味的脓液
- E、稀薄污浊、暗灰色米汤样、夹杂干酪样坏死物的脓液

答案：A

29、确定面瘫患者是否有膝状神经节受损。应做

- A、定分支检查
- B、听觉检查
- C、味觉检查
- D、泪液检查

E、唾液检查

答案：D

30、下列哪种患者拔牙后易引起感染

A、血友病

B、高血压

C、糖尿病

D、心绞痛

E、肝炎

答案：C

31、普鲁卡因的一次注射最大剂量是

A、800~1000mg

B、60~100mg

C、300~400mg

D、100~150mg

E、300mg

答案：A

32、患者女，30岁。右下智齿舌向远中倾斜，牙冠完全萌出，此牙的拔除方法宜采用

A、冲击法拔除

B、劈开，分根拔除

C、用涡轮钻拔除

D、用牙挺向远中挺出

E、翻瓣、去骨拔除

答案：A

33、普鲁卡因用作阻滞麻醉时的常用浓度

A、0.25%~0.5%

B、0.5%~1%

C、1%~2%

D、2%

E、2%~4%

答案：D

34、患者，女，28岁。48近中阻生，47远中深龋，患者主诉右下后牙冷热刺激性疼痛，无自发性疼痛。该患者正确治疗程序为

A、拔除48，治疗47

B、单纯治疗47

- C、拔除 48，观察 47
- D、先治疗 47，后拔除 48
- E、以上都不正确

答案：A

35、铜绿假单胞菌的典型脓液为

- A、黄色黏稠脓液
- B、淡黄色稀薄脓液
- C、翠绿色、稍黏稠、有酸臭味的脓液
- D、灰白或灰褐色、有明显腐败坏死臭味的脓液
- E、稀薄污浊、暗灰色米汤样、夹杂干酪样坏死物的脓液

答案：C

36、由小痣细胞组成，位于真皮内的是

- A、交界痣
- B、皮内痣
- C、复合痣
- D、毛痣
- E、雀斑样痣

答案：B

37、游离皮片移植皮片越厚，则

- A、越容易成活
- B、越能耐受摩擦
- C、色泽变化越大
- D、收缩越大
- E、质地越脆

答案：B

38、布比卡因的一次注射最大剂量是

- A、800~1000mg
- B、60~100mg
- C、300~400mg
- D、100~150mg
- E、300mg

答案：D

39、颏神经阻滞麻醉时，在下颌第二前磨牙根尖相应的口腔前庭沟进针，从哪个方向寻找颏孔

- A、向前、下、内方

- B、向前、下、外方
- C、向后、下、内方
- D、向后、下、外方
- E、向前、上、内方

答案：A

40、与口腔颌面部感染发生有关的主要因素是

- A、外伤和局部血液循环
- B、外来病原菌污染和营养状况
- C、口腔内正常菌群和局部血液循环
- D、机体抵抗力和有无异物存在
- E、机体抵抗力和细菌的种类及数量

答案：E

41、关于干槽症的治疗，不正确的是

- A、给予抗感染、止痛治疗
- B、彻底清创
- C、隔离外界刺激
- D、给予措施促进肉芽组织生长
- E、局部使用止血药物

答案：E

42、患者女，9岁。因上唇外伤性缺损行下唇组织瓣转移修复上唇缺损，其组织瓣成活后断蒂的时间为

- A、术后1周
- B、术后3周
- C、术后10天
- D、术后1个月
- E、术后2个月

答案：B

43、下唇麻木是哪种阻滞麻醉注射成功的主要标志

- A、下牙槽神经阻滞麻醉
- B、上牙槽后神经阻滞麻醉
- C、腭前神经阻滞麻醉
- D、鼻腭神经阻滞麻醉
- E、颊神经阻滞麻醉

答案：A

44、婴幼儿化脓性淋巴结炎常引发什么感染

- A、牙源性
- B、血源性
- C、损伤性
- D、腺源性
- E、医源性

答案：D

45、如拔牙时发生断根，位置较低，根挺应置于

- A、从根断面较低的一侧插入牙槽骨与牙根之间
- B、从根断面较高的一侧插入牙槽骨与牙根之间
- C、从牙槽骨较厚的一侧插入牙槽骨与牙根之间
- D、从牙槽骨较薄的一侧插入牙槽骨与牙根之间
- E、任意位置

答案：B

46、患者男性，34岁，左侧颊部、上颈部大型动静脉畸形，肿块表面皮肤不平，呈蚯蚓状，听诊有吹风样杂音，触有搏动感。该患者的最佳治疗方案为

- A、硬化剂注射治疗
- B、栓塞后手术治疗
- C、微波热凝治疗
- D、高能激光治疗
- E、冷冻治疗

答案：B

47、颌面部挫裂伤而出现活动性出血

- A、指压止血
- B、包扎止血
- C、填塞止血
- D、结扎止血
- E、药物止血

答案：D

48、男，30岁。双侧颞下颌关节外伤性强直致开口受限。全麻时应采取的方法是

- A、麻醉深度达Ⅲ期Ⅱ级后，给予盲探插管
- B、乙醚开放滴入麻醉
- C、经气管切开施全麻
- D、清醒状态下经鼻盲探插管
- E、选用

答案：D

49、下列物品中禁用高压蒸汽灭菌的是

- A、金属器械
- B、棉球敷料
- C、明胶海绵
- D、玻璃制品
- E、插入针头排气的瓶装液体

答案：C

50、慢性阻塞性腮腺炎最常见的病因是

- A、导管较长导致的唾液滞留
- B、导管口黏膜损伤导管口狭窄
- C、导管异物
- D、导管结石
- E、增龄性改变，导致唾液淤滞

答案：B

51、下列哪种口腔颌面部损伤需注射狂犬病疫苗

- A、擦伤
- B、挫伤
- C、刺割伤
- D、撕裂或撕脱伤
- E、咬伤

答案：E

52、根尖周囊肿的 x 线表现为

- A、根尖周骨质有破坏，牙槽突有吸收
- B、根尖周骨质不规则破坏，边界清楚，边缘不光滑，但范围局限
- C、根尖周骨质有破坏，但边界清楚，病变范围小，周围无致密骨白线
- D、根尖周骨质有破坏，周围有致密骨白线
- E、根尖周骨质未见明显破坏

答案：D

53、对颌下腺及舌下腺的扪诊常采用：

- A、双手双合诊法
- B、双指双合诊法
- C、三指平触诊
- D、单指扪诊
- E、双指提拉式扪诊

答案：A

54、颌面部创伤患者伴发休克时，处理原则中错误的是

- A、保持伤员安静，保暖
- B、禁止随意搬动
- C、使用吗啡类药物
- D、迅速采取有效的止血措施
- E、补液和维持血压在正常水平

答案：C

55、舌系带过短进行正确治疗的最佳时间是

- A、1岁以内
- B、1-2岁
- C、3-4岁
- D、5-6岁
- E、7-8岁

答案：B

56、局部药物止血法最常用于以下何种出血？

- A、组织渗血
- B、小静脉出血
- C、小动脉出血
- D、中等动脉出血
- E、大出血

答案：A

57、面部感染逆行常引起颅内哪种严重的并发症

- A、细菌性脑栓塞
- B、脑膜炎
- C、海绵窦血栓性静脉炎
- D、脑脓肿
- E、脑炎

答案：C

58、癌与肉瘤的根本区别在于

- A、生长方式
- B、发病年龄
- C、组织学来源
- D、临床症状
- E、对全身的影响

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/118122105107006043>