

急诊科急救知识考核试题

一、选择题

1、2013 心肺复苏指南中胸外按压的频率为 () [单选题]。

A、80-100 次/分

B、100 次/分 ✓

C、120 次/分

D、60-80 次/分

2、2013 心肺复苏指南中单或双人复苏时胸外按压与通气的比率为 () [单选题]。

A、30 : 2 ✓

B、15 : 2

C、30 : 1

D、15 : 1

3、2013 心肺复苏指南中胸外按压的部位为 () [单选题]。

A、双乳头之间胸骨正中部 ✓

B、心尖部

C、胸骨中段

D、胸骨左缘第五肋间

4、成人心肺复苏时胸外按压的深度为 () [单选题]。

A、胸廓前后径的一半

B、2-3cm

C、4-5cm✓

D、6-7cm

5、在成人心肺复苏中，潮气量大小为（ ）[单选题]。

A、500-600ml✓

B、600-700ml

C、400-500ml

D、800-1000ml

6、2013年指南在心脏停搏时推荐的每次吹气时间为（ ）[单选题]。

A、超过1秒✓

B、小于1秒

C、与呼气时间等同

D、快速用力吹气

7、在成人心肺复苏中，人工呼吸的频率为（ ）[单选题]。

A、6-8次/分

B、8-10次/分✓

C、10-12次/分

D、12-15次/分

8、成人心肺复苏时胸外按压实施者交换按压操作的时间间隔为（ ）[单选题]。

A、5分钟

B、3分钟

C、10分钟

D、2分钟✓

9、成人心肺复苏时打开气道的最常用方式为（ ）[单选题]。

- A、仰头举颏法✓
- B、双手推举下颌法
- C、托颏法
- D、环状软骨压迫法

10、心室颤动/无脉性室性心动过速治疗时，推荐电击次数为（ ）[单选题]。

- A、1次✓
- B、3次
- C、2次
- D、4次

11、被电击的非创伤心跳骤停患者中最常见的心律为（ ）[单选题]。

- A、心脏停搏
- B、无脉性室颤
- C、室颤✓
- D、电-机械分离

12、对被电击的短暂室颤患者的最佳处理措施为（ ）[单选题]。

- A、胸外按压
- B、静脉推注利多卡因
- C、静脉推注胺碘酮
- D、立即除颤✓

13、非专业急救者遇到呼吸停止的无意识患者时应（ ）[单选题]。

- A、先进行2次人工呼吸后立即开始胸外按压；✓

B、呼救急救医疗服务体系；

C、马上寻找自动除颤仪；

D、先开始生命体征评估，再进行心肺复苏

14、急救医疗服务体系的救援人员对无目击者的心脏停跳患者除颤前应（ ）[单选题]。

A、心前区叩击

B、先行约 5 组心肺复苏（约 2 分钟）再行除颤✓

C、不需要其他处理，立即进行电除颤

D、先给予静脉推注胺碘酮再除颤

15、无脉性心脏停跳患者两次心跳检查之间应（ ）[单选题]。

A、先给予约 5 组（或约 2 分钟）心肺复苏✓

B、行 12 导心电图检查

C、建立深静脉通道

D、准备电除颤

16、心肺复苏时急救者在电击后应（ ）[单选题]。

A、立即检查心跳或脉搏

B、先行胸外按压，在 5 组（或约 2 分钟）心肺复苏后再行心跳检查✓

C、立即进行心电图检查

D、调节好除颤仪，准备第二次除颤

17、成人心肺复苏时肾上腺素的用法为（ ）[单选题]。

A、1mg，稀释后静脉推注，每 5 分钟重复一次✓

B、1mg-3mg-5mg，稀释后静脉推注，每 5 分钟递增；

C、5mg，稀释后静脉推注，每 5 分钟重复一次

D、1mg-3mg-5mg---5mg，稀释后静脉推注，每5分钟重复一次

18、成人心肺复苏时血管加压素的用法为（）[单选题]。

A、一次性静脉推注 40U✓

B、40U，每5分钟重复一次

一次性静脉推注 20U

D、20U，每5分钟重复一次

19、女性，24岁，误服敌敌畏 10ml 半小时后昏迷来院，诊断急性有机磷中毒。下列哪项属烟碱样症状（）[单选题]。

状（）[单选题]。

A、多汗

B、肌纤维束颤动✓

C、瞳孔缩小

D、流涎

E、肺水肿

20、急性有机磷中毒洗胃时应采取的体位（）[单选题]。

A、右侧卧位

B、左侧卧位✓

C、仰卧位

D、俯卧位

21、成人胃管插入的深度一般为（）[单选题]。

A、40~45cm

B、55~60cm

C、45~55cm✓

D、60cm 以上

22、判断急性有机磷中毒患者洗胃是否彻底可参考（ ）[单选题]。

A、洗胃液量

B、洗出液是否澄清无味✓

C、临床症状是否好转

23、异烟肼中毒时可用下列哪个药物拮抗（ ）[单选题]。

A、VitB1

B、VitB2

C、VitB6✓

D、VitB12

24、有机磷中毒胆碱酯酶重活化剂使用时间（ ）[单选题]。

A、1~3d

B、3~5d

C、5~7d

D、根据中毒程度、症状好转及酶活力恢复情况使用✓

25、海络因中毒时，解毒药首选（ ）[单选题]。

A、洛贝林

B、阿托品

C、纳洛酮✓

D、氟马西尼

26、急性有机磷中毒发生肺水肿的治疗（ ）[单选题]。

A、西地兰

B、速尿

C、甲强龙

D、阿托品✓

27、安定类药物中毒特效解毒剂是（ ）[单选题]。

A、氟马西尼✓

B、纳酪酮

C、美解眠

D、碳酸氢钠

28、主要分泌神经毒素的毒蛇为（ ）[单选题]。

A、银环蛇✓

B、五步蛇

C、竹叶青蛇

D、蝰蛇

29、分泌混合毒素的毒蛇为（ ）[单选题]。

A、金环蛇

B、海蛇

C、眼镜蛇✓

D、五步蛇

30、关于河豚鱼中毒，哪项不是其治疗方法（ ）[单选题]。

A、催吐、洗胃、导泻

B、1%盐酸土的宁肌注或皮下注射

C、呼吸麻痹时可实施机械通气

D、碳酸氢钠静滴✓

31、女性，23岁，食用鱼片干及啤酒后出现恶心、呕吐，数小时后诉唇麻、四肢无力，不久呼吸困难，昏迷。最可能的诊断是（ ）[单选题]。

A、急性酒精中毒

B、河豚鱼中毒✓

C、肉毒杆菌中毒

D、过敏性休克

32、以下哪项不是重度一氧化碳中毒患者常见并发症（ ）[单选题]。

A、休克

B、呼吸衰竭

C、脑水肿

D、急性心肌梗死✓

33、以下哪项方法不适合治疗急性一氧化碳中毒（ ）[单选题]。

A、高压氧舱

B、脱水

C、改善脑代谢

D、输鲜血浆。✓

34、中度一氧化碳中毒，其血液碳氧血红蛋白浓度大约在（ ）[单选题]。

A、10%~30%

B、30%~50%✓

C、50%~70%

D、5%~10%

35、洗胃液的温度最好选择在 () [单选题]。

A、32 ~ 37°C ✓

B、4°C左右

C、37 ~ 40°C

D、21 ~ 24°C

36、慢性酒精中毒常见合并症不包括 () [单选题]。

A、慢性胃炎

B、酒精性肝硬化

C、周围神经炎

D、精神分裂症 ✓

37、百草枯中毒的主要致死原因为 () [单选题]。

A、进行性肺纤维化 ✓

B、急性肾功能衰竭

C、中毒性肝损害

D、中毒性心肌炎

38、院前急救处理病人时遵循从 () 的顺序最为可靠。 [单选题] *

A、躯干到四肢

B、头到脚 ✓

C、哪里出血先处理哪里

D、个人习惯

39、对创伤急救来讲，病人的生命取决于我们是否很好地处理了 () 步骤。 [单选题] *

A、关键的 ✓

B、所有的

C、一般的

D、全部的

40、由于固定韧带的牵拉，下列哪个器官的损伤很常见。() [单选题]。

A、肺脏

B、胆囊

C、脾脏✓

D、阑尾

41、挤压伤不常发生于() [单选题]。

A、肺

B、心

C、膈肌

D、空虚的膀胱✓

42、跌落伤的机制是()的剧烈减速。 [单选题] *

A、水平方面

B、垂直方面✓

C、旋转方面

D、抛物线性的

43、跌落伤伤势不取决于下列哪个因素() [单选题]。

A、跌落的高度

B、撞击地面的部位

C、地面的形态

D、跌落者的体重✓

44、刀伤中，第（ ）肋间以下的胸外伤也会累及腹腔脏器。[单选题] *

A、二

B、三

C、四✓

D、五

45、爆炸伤中由气体冲击造成的损伤哪项不常见（ ）[单选题]。

A、膈膜破裂

B、气胸

C、胃肠道的损伤

D、骨折✓

46、刀伤的处理，重要原则是（ ）[单选题]。

A、不要取出刺入体内的刀具✓

B、取出刺入体内的刀具

C、快速输液

D、包扎伤口

47、在抢救现场或伤员刚送到急诊室时应（ ）[单选题]。

A、病史采集

B、全面而详细的检查

C、迅速判断有无威胁生命的征象✓

48、现场复苏成功的判断依据为（ ）[单选题]。

A、大动脉搏动扪及

B、心电图表现为心室纤维颤动

C、自主循环恢复✓

49、以下哪个原因不会引起气道不畅通 () [单选题]。

A、喉或气管的软骨骨折✓

B、休克

C、颅脑损伤

50、急救人员到达创伤现场后，首要的任务是 () [单选题]。

A、安全地运送

B、除去正在威胁病人生命的因素✓

C、骨折固定

51、创伤病人再估计的重点有 () [单选题]。

A、腹膜后脏器的损伤

B、继发颅内、胸腹腔内出血

C、以上都是✓

52、导致多发伤病人死亡的首要因素是 () [单选题]。

A、颅脑损伤✓

B、胸部损伤

C、四肢骨盆、脊柱脊髓损伤

53、插入口咽管时开放气道的方法哪些是错误的 () [单选题]。

A、上台下巴

B、舌头牵拉器

C、喉镜✓

D、用 Scissor 方法

54、使用简易面罩通气开通氧气瓶，速度维持在（ ）L/min 左右。[单选题] *

A、2-3

B、3-5

C、7-10

D、11-12✓

55、用口-面罩方式进行通气，吸气时间保持在（ ）秒，呼气时间约（ ）秒。[单选题] *

A、1、5~2, 1、5~4✓

B、1~1、5, 1~3

C、1、5~2, 1、5~2

D、1~1、5, 2~3

56、囊瓣面罩通气时用双手挤压球囊，使通气量保持在（ ）ml。[单选题] *

A、600—800

B、800—1000✓

C、1000—1200

D、1200—1500

57、当怀疑插管位置有问题时，以下判断方法哪些是错误的：（ ）[单选题]。

A、上腹部听诊不应该听到呼吸音

B、胸骨切迹听诊不能听到呼吸音✓

C、胸骨切迹压迫触诊导管气囊能感觉到压力波动

D、可利用洗耳球和 CO₂ 监测器来帮助诊断

58、下列关于插管过程的描述错误的是：（ ）[单选题]。

- A、助手固定患者头部，多用 Sellick 方式
- B、张开下巴，使喉镜从口腔右侧进去，沿舌跟进入咽部
- C、看到会厌后导管从会厌左侧进入，声门一张开就顺势插入导管，直到声带下 5cm 左右✓
- D、导管前端气囊充气，固定导管，并检查导管位置是否正确。

59、大脑组织缺氧后发生不可逆时间一般为 () [单选题]。

- A、1 分钟
- B、2 分钟
- C、3 分钟
- D、4 分钟✓

60、气管插管可以引起除下列那种之外的各种反射 ; () [单选题]。

- A、咳嗽反射
- B、吞咽反射
- C、呕吐反射
- D、膝健反射✓

61、胸腔是由 () 对肋骨向后与胸椎相连，向前与胸骨相连围成的骨性空腔。 [单选题] *

- A、10
- B、11
- C、12✓
- D、13

62 . 成人的胸膜腔各侧均能容纳约 () L 的液体。 [单选题] *

- A、1
- B、2

C、3✓

D、4

63、最常见的胸部外伤是（ ）[单选题]。

A、气胸

B、血胸

C、单纯肋骨骨折✓

D、心肌挫伤

64、胸部外伤后最常见的两种症状为（ ）[单选题]。

A、胸痛和休克

B、胸痛和呼吸困难✓

C、呼吸困难和咯血

D、休克和咯血

65、张力性气胸的急救处理是应该立即（ ）[单选题]。

A、排气✓

B、气管插管

C、补液

D、胸廓固定

66、对于考虑心包填塞的患者，以下处理那个是错误的（ ）[单选题]。

A、保持气道通畅和供养

B、快速转运

C、适当补充血容量

D、现场心包减压✓

67、下列外伤那个不是致命的 () [单选题]。

- A、张力性气胸
- B、单纯肋骨骨折✓
- C、心包填塞
- D、主动脉破裂

68、心包填塞的三联症不包括下列选项中那一点 () [单选题]。

- A、低血压
- B、颈静脉怒张
- C、胸痛✓
- D、心音遥远

69、大量血胸的症状和体征主要表现为 () [单选题]。

- A、胸痛和昏迷✓
- B、低血容量和胸痛
- C、呼吸损害和昏迷
- D、低血容量和呼吸损害

70 . 张力性气胸在危急状况下可用一粗针头在患侧第 () 肋间锁骨中线处刺入胸膜腔。 [单选题] *

- A、2✓
- B、3
- C、4
- D、5

71、下列哪项不是张力性气胸紧急减压的适应症? () [单选题]。

- A、呼吸窘迫和肺萎陷

B、桡动脉搏动消失（晚期休克）

C、胸痛✓

D、意识水平逐渐下降

72、张力性气胸紧急减压的并发症不包括？（ ）[单选题]。

A、肋间血管损伤

B、肋骨骨折✓

C、肺破裂

D、感染

73、张力性气胸紧急减压时穿刺导管最小长度是？（ ）[单选题]。

A、3cm

B、5cm✓

C、7cm

D、9cm

74、颈外静脉置管的适应症是（ ）[单选题]。

A、骨髓炎

B、脓毒血症

C、急性菌痢

D、没有合适的周围静脉然需静脉通路的病人✓

75、颅前窝骨折时，淤血区域多发生于（ ）[单选题]。

A、眼睑✓

B、结膜下

C、颞、颞下区

D、枕下、乳突区。

76、颅后窝骨折时，常发生（ ）[单选题]。

A、鼻漏

B、耳漏✓

C、鼻漏或耳漏

D、均能发生

77、脑脊液在哪两个脑膜之间（ ）[单选题]。

A、硬脑膜和软脑膜之间

B、硬脑膜和蛛网膜之间

C、软脑膜和蛛网膜之间✓

D、蛛网膜和脑组织之间

78、损伤颅脑的早期反应（ ）[单选题]。

A、肿胀✓

B、缺血

C、淤血

D、充血

79、脑损伤的患者的通气频率最好为（ ）[单选题]。

A、10-15 次/min

B、10-12 次/min✓

C、12-15 次/min

D、15-18 次/min

80、脑疝可能出现在颅内压大于（ ）[单选题]。

A、 15mmHg

B、 20mmHg

C、 25mmHg✓

D、 30mmHg

81、 大脑灌注压 (CPP) 依赖于 () [单选题]。

A、 平均动脉压

B、 颅内压

C、 平均动脉压和颅内压✓

D、 不确定

82、 必须保持脑灌注压至少在多少以上 () [单选题]。

A、 40mmHg

B、 50mmHg

C、 60mmHg✓

D、 70mmHg

83、 为保持颅脑创伤病人的大脑灌注压，应保持收缩压为 () [单选题]。

A、 80-90mmHg

B、 90-100mmHg

C、 100-110mmHg

D、 110-120mmHg✓

84、 弛缓性瘫痪经常提示 () [单选题]。

A、 脊髓损伤✓

B、 脑干损伤

C、脑皮质损伤

D、脑灰质损伤

85、颅脑穿刺性损伤的颅骨穿刺物应该 () [单选题]。

A、立刻取出穿刺物并立刻转运患者

B、立刻去处穿刺物外露部分并立刻转运患者

C、立刻表明穿刺物入口后取出穿刺物并立刻转运患者

D、穿刺物应被固定在原地并患者立即转运✓

86、中度烧伤指 () [单选题]。

A、Ⅱ°烧伤面积 9%以下

B、Ⅱ°烧伤面积 10%~19%

C、Ⅱ°烧伤面积，10%~29%，Ⅲ°面积不足 10%✓

D、总面积 30%~39%

E、总面积 50%以上

87、大面积严重烧伤病人转运前应首先 () [单选题]。

A、持续中心静脉压测定

B、彻底清创

C、建立输液途径✓

D、消毒敷料包扎创面以免再感染

88、下列对颅脑外伤患者处理不当的是 () [单选题]。

A、避免用力咳嗽

B、颅底骨折，取头高位卧床休息

C、缺血性脑血管病取平卧位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/145022242030011101>