

内科系统知识

一、单项选择

1、支气管哮喘主要临床表现为

- A. 反复发作带哮鸣音的吸气性呼吸困难
- B. 反复发作带哮鸣音的呼气性呼吸困难
- C. 反复发作带哮鸣音的混合性呼吸困难
- D. 逐渐加重的咳嗽、咳痰与呼吸困难
- E. 突然发作的持续性呼吸困难

正确答案： B

2、引起呼吸系统疾病最常见的病因是

- A. 吸烟
- B. 肿瘤
- C. 感染
- D. 变态反应
- E. 理化因素

正确答案： C

3、少量咯血，尤其是持续痰中带血，常见于

- A. 支气管哮喘
- B. 慢性支气管炎
- C. 肺气肿
- D. 肺癌
- E. 心脏病

正确答案： D

4、患者，男性，28岁，检查发现气管向左侧移位，右侧胸廓饱满，触觉语颤减弱，叩诊浊音，应考虑最可能的原因是

- A. 肺气肿
- B. 气胸
- C. 胸腔积液
- D. 肺炎
- E. 肺脓肿

正确答案： C

5、肺结核咯血患者应取何种体位

- A. 平卧位头偏向一侧
- B. 患侧卧位
- C. 健侧卧位
- D. 半卧位或端坐位
- E. 俯卧位

正确答案： A

6、呼吸衰竭缺氧伴CO₂潴留患者不可能出现

- A. 呼吸深快
- B. 发绀
- C. 心率、血压变化
- D. 皮肤干燥

E. 球结膜充血水肿

正确答案：D

7、慢支并发阻塞性肺气肿患者，主要表现为在原有症状基础上又出现

- A. 反复感染发热
- B. 反复发绀
- C. 咳多量脓痰
- D. 逐渐加重的呼吸困难
- E. 剧烈咳嗽

正确答案：D

8、轻度缺氧时神经系统的症状主要是

- A. 注意力不集中，智力减退，定向障碍
- B. 烦躁不安，神志恍惚
- C. 谵妄
- D. 昏睡
- E. 昏迷

正确答案：A

9、一个慢性支气管炎肺气肿病人，近日痰多不易咳出，常有喘鸣、头痛、烦躁，白天嗜睡，夜间失眠，晨间护理时发现病人神志淡漠，应考虑

- A. 先兆
- B. 呼吸性酸中毒
- C. II型呼衰
- D. 休克早期
- E. 脑疝先兆

正确答案：C

10、自发性气胸最重要的处理

- A. 吸氧
- B. 镇痛药
- C. 马上手术治疗
- D. 使用抗生素
- E. 采取排气措施，使肺复张

正确答案：E

11、红细胞及血红蛋白均增高可见于

- A. 冠心病
- B. 慢性肺心病
- C. 风心病
- D. 贫血性心脏病
- E. 高血压心脏病

正确答案：B

12、肺原性心脏的心电图表现哪项是错误的

- A. 肺型P波
- B. 额面平均电轴 ≥ 90 度
- C. V1导联R/S ≥ 1
- D. V5导联R/S ≤ 1
- E. 肢体导联高电压

正确答案：E

13、支气管哮喘病人 PaCO_2 增高，表示

- A. 没有临床意义
- B. 病情好转
- C. 病情严重
- D. 发作早期
- E. 呼吸性碱中毒

正确答案：C

14、支气管哮喘发作时以下护理措施不妥当的是

- A. 限制水摄入
- B. 半坐位
- C. 防止病人坠床
- D. 禁用吗啡
- E. 吸氧

正确答案：A

15、呼吸衰竭时，血液气体分析的诊断标准是

正确答案：B

16、观察呼吸困难患者时见到下列哪种情况提示病情垂危

- A. 呼吸频率加快
- B. 呼吸频率减慢
- C. 间停呼吸
- D. 库氏呼吸
- E. 浅快呼吸

正确答案：C

17、支气管哮喘发作时，控制症状首选

- A. β_2 受体激动剂
- B. 糖皮质激素
- C. 抗胆碱能药物
- D. 茶碱类
- E. 肥大细胞膜稳定剂

正确答案：A

18、II型呼吸衰竭早期可出现

- A. 昼眠夜醒
- B. 头痛头胀
- C. 昏迷
- D. 抽搐
- E. 水肿

正确答案：A

19、某病人，已有数年怕热、多汗，心率 110 次/分，食量大，但逐渐消瘦，检

查发现 FT4 及 FT3 增高，昨天突然体温达 40℃，心率 150 次/分，恶心、呕吐、腹泻，大汗持续而昏睡。急诊为甲状腺功能亢进症伴甲状腺危象，其原因是

- A. 甲状腺素大量破坏
- B. 机体消耗大量甲状腺素
- C. 腺垂体功能亢进
- D. 大量甲状腺素释放入血
- E. 下丘脑功能亢进

正确答案：D

20、下列哪种药物禁用于支气管哮喘发作

- A. 普萘洛尔(心得安)
- B. 氢化可的松
- C. 肾上腺素
- D. 异丙肾上腺素
- E. 氨茶碱

正确答案：A

21、对剧咳而痰中带血者，应忌用下列哪种镇咳药

- A. 棕色合剂
- B. 可待因
- C. 氯化铵
- D. 必嗽平
- E. 鲜竹沥

正确答案：B

22、呼吸衰竭患者的病情观察。下列哪项对发现肺性脑病先兆极为重要

- A. 皮肤变化
- B. 心率及血压变化
- C. 神志与精神变化
- D. 变化
- E. 瞳孔变化

正确答案：C

23、某肺炎病人除困难、咳嗽、咳痰外，还可在患侧听到胸膜摩擦音，这是因为

- A. 肺泡炎症
- B. 动作太快
- C. 胸膜受累发炎
- D. 支气管发炎
- E. 胸腔积液

正确答案：C

24、男性，46 岁。咳嗽、咳痰多年，近来困难加重并伴双下肢浮肿，心电图显示右室肥大。应考虑为

- A. 风湿性心脏病
- B. 冠心病
- C. 慢性肺源性心脏病
- D. 慢性支气管炎
- E. 阻塞性肺气肿

正确答案：C

25、支气管扩张咳痰特点

- A. 体力劳动时咳痰
- B. 晚间咳痰
- C. 长期咳痰
- D. 体位改变时痰多
- E. 坐时咳痰

正确答案：D

26、张力性气胸的重要表现是

- A. 突发胸痛
- B. 进行性呼吸困难
- C. 干咳无痰
- D. 出现发绀
- E. 有休克征象

正确答案：E

27、特发性气胸与继发性气胸最主要的区别是

- A. 有无肺的基础病变
- B. 发病的年龄
- C. 发病的诱因
- D. 有无张力性气胸
- E. 复发率的高低

正确答案：A

28、患者男性，18岁，患有哮喘。昨天因感冒受凉再次发作，气急明显，口唇发绀，鼻翼扇动，不能平卧，经抗感染、口服氨茶碱仍不能控制。下午来医院急诊，应拟诊为

- A. 外源性哮喘
- B. 内源性哮喘
- C. 混合性哮喘
- D. 心源性哮喘
- E. 哮喘持续状态

正确答案：E

29、呼吸衰竭的治疗主要在于

- A. 治疗原发病
- B. 祛除诱因
- C. 支持疗法
- D. 纠正缺氧和CO₂潴留
- E. 纠正酸碱平衡失调

正确答案：D

30、急性呼吸窘迫综合征目前主张及早采用的措施是

- A. 正压通气
- B. 控制感染
- C. 消除肺水肿
- D. 肾上腺糖皮质激素
- E. 以上均不是

正确答案：A

31、有机磷农药中毒的死因主要是

- A. 休克
- B. 脑水肿
- C. 心脏聚停
- D. 呼吸衰竭
- E. 电解质紊乱

正确答案：D

32、呼吸衰竭低氧血症伴高碳酸血症患者应用

- A. 高压吸氧
- B. 乙醇湿化吸氧
- C. 间歇吸氧
- D. 高浓度吸氧
- E. 低流量、低浓度持续吸氧

正确答案：E

33、肺癌引起上腔静脉阻塞综合征是

- A. 侵犯心脏所致
- B. 侵犯纵隔，压迫上腔静脉所致
- C. 压迫到主动脉所致
- D. 压迫双侧锁骨下静脉所致
- E. 压迫纵隔淋巴结所致

正确答案：B

34、咳脓臭痰提示患者为

- A. 肺炎球菌感染
- B. 绿脓杆菌感染
- C. 其他化脓菌感染
- D. 厌氧菌感染
- E. 真菌感染

正确答案：D

35、27 岁挤压伤女患者，尿呈酱油色，1d 后开始无尿，血钾进行性升高，第 4 天血尿素氮 30.1mmol/L，血肌酐 480 μmol/L，CPKMB13U，其心电图不出现下列哪项

- A. P 波消失
- B. T 波高尖
- C. P-R 间期延长
- D. U 波出现
- E. QRS 波群增宽

正确答案：D

36、患者女性，16 岁，支气管哮喘发作 1 小时，烦躁，紫绀，呼吸 26 次/分，心率 120 次/分，律齐，以下哪项措施不当

- A. 协助病人采取舒适的坐位
- B. 给予吸氧 3L/分
- C. 守候病人床旁，安慰病人
- D. 忌用心得安

E. 禁用氨茶碱

正确答案： E

37、肺心病烦躁不安病人，需使用镇静剂时，禁忌

- A. 哌替啶
- B. 水合氯醛
- C. 异丙嗪
- D. 利眠宁
- E. 安定

正确答案： A

38、青年女性患者于受凉淋雨后突发寒战、高热、胸痛、咳嗽、气急、咯铁锈色痰，体检左下肺有实变体征及湿啰音，治疗用药应首选

- A. 安乃近
- B. 地塞米松
- C. 青霉素
- D. 棕色合剂
- E. 氨茶碱

正确答案： C

39、静脉推注氨茶碱速度要缓慢，否则可出现

- A. 口干、皮疹
- B. 心律失常、血压下降等
- C. 红斑和视力模糊
- D. 腹绞痛和腹泻
- E. 耳鸣和高血压

正确答案： B

40、急性呼吸窘迫综合症多发生于原发病后

- A. 24 小时内
- B. 48 小时内
- C. 48~72 小时
- D. 72 小时后
- E. 4~5 天后

正确答案： C

41、某人于夜间突然发生呼吸困难而惊醒，坐起后约半小时呼吸困难缓解，如此发作约半月就医，经检查肺无异常，但心尖区有舒张期杂音。应考虑

- A. 支气管炎
- B. 肺气肿
- C. 支气管哮喘
- D. 自发性气胸
- E. 左心衰竭早期

正确答案： E

42、损伤性血胸的处理错误是

- A. 进行性血胸应及时剖胸止血
- B. 非进行性血胸伴有休克，应首先行胸腔闭式引流
- C. 凝固性血胸待病情稳定后行剖胸手术清除血块
- D. 机化性血胸可行纤维组织剥除术

E. 血胸并发感染应按脓胸治疗原则处理

正确答案：B

43、患者，男，40岁。一天来发烧、咳嗽、胸痛、头晕。面色苍白，神志清，血压4.3/6.7kPa，脉搏140次/分，血白细胞数 $21 \times 10^9/L$ ，腹部(-)，胸片右上肺大片密度均匀阴影，诊断为

- A. 中毒性肺炎
- B. 支气管扩张合并感染
- C. 支原体肺炎
- D. 结核性胸膜炎
- E. 肺脓肿

正确答案：A

44、肺源性心脏病的首要死亡原因是

- A. 休克
- B. 肺性脑病
- C. 上消化道出血
- D. 水、电解质平衡失调
- E. 心律失常

正确答案：B

45、呼吸衰竭患者应用呼吸兴奋剂后出现下列哪种情况时，表示药物过量，应减慢滴速或停用

- A. 面部肌肉颤动
- B. 颜面苍白
- C. 心率加快
- D. 呼吸深快
- E. 发绀加重

正确答案：A

46、陈女士，28岁，发作性呼吸困难16年，多在春秋季节，发作前多鼻痒、打喷嚏。最可能的诊断是

- A. 感染性哮喘
- B. 运动性哮喘
- C. 外源性哮喘
- D. 内源性哮喘
- E. 混合性哮喘

正确答案：C

47、下列关于气胸病人的护理，错误的是

- A. 绝对卧床休息
- B. 给予吸氧，2~5L/min
- C. 胸腔穿刺抽气应尽可能1次抽完
- D. 行胸腔闭式引流时，水封瓶应低于患者胸部
- E. 行胸腔闭式引流时，鼓励病人定时进行深呼吸

正确答案：C

48、休克型肺炎，患者宜采取何种体位

- A. 平卧位
- B. 半卧位

- C. 侧卧位
- D. 头低足高位
- E. 去枕平卧位或头略高、足高的特殊位

正确答案：E

49、具备以下何项可确诊慢性肺心病

- A. 双肺满布湿啰音+咳白色泡沫痰
- B. 双肺哮鸣音+呼气性呼吸困难
- C. 肺动脉瓣第二心音亢进+心尖搏动在剑突下
- D. 心尖区舒张期杂音+两肺下部湿啰音
- E. 左侧胸骨旁第3肋~第4肋舒张期杂音

正确答案：C

50、支气管哮喘患者应禁忌使用以下哪类药物

- A. β 1-肾上腺素能受体兴奋剂
- B. β 2-肾上腺素能受体兴奋剂
- C. β -肾上腺素能受体阻滞剂
- D. α -肾上腺素能受体兴奋剂
- E. α -肾上腺素能受体阻滞剂

正确答案：C

51、患者男性，50岁，慢性支气管炎、肺气肿病史多年，于阵咳后突然出现呼吸困难，右胸刺痛，逐渐加重，最可能是

- A. 急性心肌梗死
- B. 慢支急性发作
- C. 气胸
- D. 支气管哮喘
- E. 胸腔积液

正确答案：C

52、蒋先生，75岁，慢性支气管炎并发肺气肿10年，近日来病情加重，咳嗽频繁，痰黏不易咯出，伴呼吸困难、发绀。与病情相符的血气分析结果是

- A. PaO₂降低，PaCO₂升高，pH降低
- B. PaO₂正常，PaCO₂升高，pH正常
- C. PaO₂降低，PaCO₂正常，pH升高
- D. PaO₂升高，PaCO₂升高，pH降低
- E. PaO₂正常，PaCO₂降低，pH升高

正确答案：A

53、自发性气胸积气占该侧胸腔容量百分比的多少时需要治疗

- A. 15%以上
- B. 20%以上
- C. 30%以上
- D. 40%以上
- E. 50%以上

正确答案：B

54、肺炎球菌肺炎最突出的护理诊断是

- A. 疼痛
- B. 体温过高

- C. 体液不足
- D. 营养不良
- E. 知识缺乏

正确答案：B

55、以下护理胸痛患者的措施中哪项不妥

- A. 适当安慰，消除其紧张情绪
- B. 指导患者取患侧卧位
- C. 用宽胶布于患者吸气末紧贴在患侧胸部
- D. 按医嘱给小剂量的镇静剂和止痛剂
- E. 根据不同病因采取相应护理措施

正确答案：C

56、支气管哮喘与心源性哮喘不能鉴别时，宜选用的药物是

- A. 舒喘灵
- B. 氨茶碱
- C. 哌替啶
- D. 地塞米松
- E. 毒毛旋花子苷 K

正确答案：B

57、20 岁支气管哮喘患者，突然出现一侧胸痛，呼吸时加重，伴发绀、大汗，为明确诊断首先进行的检查是

- A. 心肺体检
- B. 白细胞及分类，了解是否有感染
- C. 心电图，除外心肌梗死
- D. X 线胸片，了解是否有肺炎
- E. 血气分析，了解呼吸衰竭的类型及程度

正确答案：A

58、某人误服有机磷农药约 100ml，不久出现昏迷，双瞳缩小，呼吸困难，满肺可闻及湿啰音，原因是

- A. 动眼神经兴奋
- B. 迷走神经持久兴奋
- C. 急性气管炎
- D. 急性胃炎
- E. 急性肺炎

正确答案：B

59、心肌梗死后心肌再灌注治疗的最佳时间为起病后

- A. 2 小时内
- B. 4 小时内
- C. 6 小时内
- D. 10 小时
- E. 24 小时内

正确答案：C

60、急性心肌梗死病人最早出现变化的心肌酶是

- A. 磷酸肌酸激酶
- B. 丙氨酸氨基转移酶

- C. 乳酸脱氢酶
- D. 转肽酶
- E. 胆碱酯酶

正确答案：A

61、女性患者，41岁，患高血压20余年，今日突发头痛、视力模糊、失语，测血压210/130mmHg。急诊入院，对该患者应首选的降压药物是

- A. 硝普钠
- B. 呋塞米
- C. 硝酸甘油
- D. 维拉帕米(异搏定)
- E. 卡托普利

正确答案：A

62、最能提示心肌梗死的心电图表现是

- A. P-R间期延长
- B. Q波 $>0.04s$
- C. S-T段弓背向上抬高
- D. T波倒置
- E. Q-T间期延长

正确答案：B

63、III度房室传导阻滞伴阿-斯综合征的治疗方法是

- A. 麻黄素
- B. 异丙肾上腺素
- C. 安装人工心脏起搏器
- D. 阿托品
- E. 利多卡因

正确答案：C

64、以下何种强心剂既可强心又可扩血管

- A. 毛花甙丙
- B. 氨力农
- C. 地高辛
- D. 洋地黄毒苷
- E. 毒毛花甙K

正确答案：B

65、患者，女，69岁，因4小时来持续心前区痛，确诊为急性心肌梗死收入监护室，监测中发现患者出现心室颤动，此时责任护士应即刻采取的首要措施是

- A. 心内注射利多卡因
- B. 气管插管
- C. 高压吸氧
- D. 非同步电除颤(电复律)
- E. 同步电除颤

正确答案：D

66、风心病长期卧床的心力衰竭患者，当下肢静脉血栓形成时，如血栓脱落可导致的栓塞部位是

- A. 肾栓塞

- B. 脑栓塞
- C. 肺栓塞
- D. 脾动脉栓塞
- E. 上肢动脉栓塞

正确答案：C

67、下列哪项是洋地黄中毒最常见的临床表现

- A. 恶心、呕吐
- B. 室早二联律
- C. Q-T 间期缩短
- D. 出现奔马律
- E. 黄视、绿视

正确答案：B

68、下列哪种风心病易发生心绞痛、晕厥

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉狭窄
- D. 主动脉关闭不全
- E. 肺动脉狭窄

正确答案：C

69、二尖瓣狭窄患者并发哪种心律失常最易有血栓形成

- A. 阵发性心动过速
- B. 频发房性早搏
- C. 频发室性早搏
- D. 心房颤动
- E. 房室传导阻滞

正确答案：D

70、应用洋地黄类药物时应避免与何种药物合用

- A. 氢氯噻嗪
- B. 硝酸甘油
- C. 螺内酯
- D. 哌唑嗪
- E. 维拉帕米

正确答案：E

71、治疗室性心律失常首选的药物是

- A. 利多卡因
- B. 洛尔
- C. 奎尼丁
- D. 维拉帕米
- E. 苯妥英钠

正确答案：A

72、频发期前收缩是指期前收缩的次数每分钟至少出现

- A. 3 次以上
- B. 5 次以上
- C. 8 次以上

D. 10 次以上

E. 15 次以上

正确答案：B

73、心脏同步电复律的适应证为

A. 持续性室性心动过速

B. 伴第二度Ⅱ型房室传导阻滞的房扑

C. 室性阵发性心动过速

D. 伴第三度房室传导阻滞的房颤

E. 持续性房颤

正确答案：E

74、肝癌引起的肝区疼痛特点是

A. 针刺样痛

B. 空腹烧灼痛

C. 间歇性隐痛

D. 持续性胀痛和钝痛

E. 剧烈绞痛

正确答案：D

75、上消化道出血是指

A. 贲门以上出血

B. 幽门以上出血

C. Treitz 韧带以上出血

D. 空回肠交界处以上出血

E. 回盲部以上出血

正确答案：C

℃，血压 11/8kPa，脉搏 110 次/min，腹上区压痛及反跳痛、腹肌紧张 Grey-Tumer 征(+)。血清淀粉酶 800Somogyi 单位，血钙降低。诊断应考虑为

A. 急性水肿型胰腺炎

B. 出血坏死型胰腺炎

C. 急性胃穿孔

D. 胃溃疡

E. 胆石症

正确答案：B

77、患者，男性，76 岁，有胃溃疡病史 8 年，突然呕血 2000ml，血压 50/20mmHg，心率 200 次/分，此时首先应采取的措施是

A. 准备给予止血药物

B. 立即开放静脉补充血容量

C. 嘱病人禁食

D. 准备急查 B 超

E. 嘱病人严格卧床休息，采取平卧位，头偏向一侧

正确答案：B

78、急性上消化道出血伴休克时，去枕平卧的主要意义是

A. 有利于止血

B. 防止窒息

C. 减少出血

- D. 改善脑血供
- E. 降低脑耗氧

正确答案：D

79、急性胰腺炎主要临床症状应除外

- A. 恶心、呕吐
- B. 腹痛
- C. 发热
- D. 头痛
- E. 血淀粉酶升高

正确答案：D

80、喷射性呕吐伴头痛应考虑

- A. 神经官能症
- B. 感冒高热
- C. 高血压脑病
- D. 肺炎
- E. 肺结核

正确答案：C

81、急性胃肠炎呕吐物特点

- A. 有大便臭味
- B. 呕吐为酸性食物
- C. 隔夜饮食
- D. 大量鲜红液
- E. 大量咖啡液

正确答案：B

82、上消化道出血一次性出血量小于多少时一般不出现全身症状

- A. 400ml
- B. 600ml
- C. 800ml
- D. 1000ml
- E. 2000ml

正确答案：A

83、急性胰腺炎患者应禁用的药物为

- A. 西米替丁
- B. 曲马朵
- C. 吗啡
- D. 阿托品
- E. 哌替啶

正确答案：C.

84、患者，男，45岁。肝硬化病史7年，午饭后突然呕吐褐色胃内容物，量约500ml，来院急诊。出血部位最可能在

- A. 食管中上段
- B. 食管下段及胃底
- C. 直肠
- D. 胃体

E. 十二指肠

正确答案：B

85、先生，80岁。10日来，未曾排便，感腹胀，轻度腹痛，自用开塞露无效，来院就诊。以往有便秘史20余年。体格检查：腹部膨隆，见肠型和蠕动波，全腹无明显压痛，左下腹可扪及条块状物，质硬，可推动，无移动性浊音，肠鸣音稍亢进。最可能的诊断是

- A. 小肠扭转
- B. 乙状结肠扭转
- C. 肠粪块阻塞
- D. 乙状结肠癌
- E. 肠套叠

正确答案：C

86、急性出血坏死型胰腺炎所发生的休克属于

- A. 中毒性休克
- B. 低血容量性休克
- C. 过敏性休克
- D. 心源性休克
- E. 神经源性休克

正确答案：B

87、急诊胃镜示“食管静脉曲张破裂出血”，护士应估计患者最有可能先出现

- A. 心力衰竭
- B. 急性肾衰竭
- C. 肝性脑病
- D. 感染
- E. 失血性休克

正确答案：E

88、对于一个既有发热和出血征象，又伴有肝、脾肿大的患者，为明确诊断，最有鉴别价值的实验室检查方法是

- A. 肝功能
- B. B超
- C. CT
- D. 骨髓检查
- E. 血象

正确答案：D

89、急性白血病患者发热 38°C 是由于

- A. 感染
- B. 吸收热
- C. 红细胞被破坏
- D. 白细胞被破坏
- E. 血小板过少

正确答案：A

90、特发性血小板减少性紫癜治疗首选

- A. 甲状腺素
- B. 雌激素

- C. 糖皮质激素
- D. 胰岛素
- E. 醛固酮

正确答案：C

91、DIC 最常见的病因是

- A. 肿瘤性疾病
- B. 羊水栓塞、产科疾病
- C. 感染性疾病
- D. 结缔组织疾病
- E. 外科创伤

正确答案：B

92、有一急性再生障碍性贫血患者，突然出现头痛、头晕、视物模糊、呼吸急促，你考虑该病人发生了什么情况？

- A. 高血压危象
- B. 脑动脉痉挛
- C. 脑梗死
- D. 颅内出血
- E. 高血压脑病

正确答案：D

93、急性特发性血小板减少性紫癜常有

- A. 转为慢性
- B. 反复发作
- C. 自限性
- D. 急慢交替
- E. 急性易死亡

正确答案：C

××10⁹/L，血小板 20×10⁹/L。骨髓检查：增生不良，应考虑

- A. 急性再障
- B. 慢性再障
- C. 急性白血病
- D. 特发性血小板减少性紫癜
- E. 脾功能亢进

正确答案：A

95、糖尿病酮症酸中毒患者停用静脉滴注胰岛素的指标是

- A. 血糖正常
- B. 血酮正常
- C. 尿酮体消失
- D. 尿糖阴性
- E. 糖化血红蛋白指标正常

正确答案：C

96、洗胃时间一般在服毒后

- A. 6 小时内
- B. 7 小时内
- C. 8 小时内

- D. 9 小时内
- E. 10 小时内

正确答案：A

97、对硫磷中毒患者洗胃忌用

- A. 清水
- B. 2%碳酸氢钠
- C. 1：5000 高锰酸钾
- D. 生理盐水
- E. 蒸馏水

正确答案：C

98、抢救有机磷农药中毒治疗患者出现短暂眩晕、视物模糊、血压骤升，说明了什么

- A. 胆碱酯复能活副作用
- B. 应增药
- C. 应减药
- D. 应给药减速
- E. 应给药加快

正确答案：A

99、糖尿病患者注射速效胰岛素 10U 后 2 小时，出现极度饥饿、软弱、手抖、出汗、头晕等，此时患者应当立即

- A. 卧床休息
- B. 尽力活动四肢
- C. 喝糖水
- D. 口服硝酸甘油
- E. 到医院就诊

正确答案：C

100、重症中暑患者进行物理降温过程中体温降至多少应停止降温措施

- A. 肛温 39℃
- C. 肛温 38℃
- E. 肛温 37℃

正确答案：C

101、确诊糖尿病首选的检查是

- A. 空腹血糖
- B. 饭后 2 小时尿糖
- C. 24 小时尿糖定量
- D. 口服葡萄糖耐量试验
- E. 糖化血红蛋白测定

正确答案：D

102、一氧化碳中毒后最先发生痉挛的血管是

- A. 肾脏血管
- B. 冠状动脉
- C. 外周小血管
- D. 脑部血管
- E. 肺动脉

正确答案：D

103、一氧化碳中毒时最先受损的器官是

- A. 心、肾
- B. 心、脑
- C. 肾、脑
- D. 肾、肝
- E. 肝、肺

正确答案：B

104、糖尿病性神经病变，最多见的是

- A. 小脑上脚炎
- B. 三叉神经运动核炎
- C. 小脑齿状核炎
- D. 周围神经炎
- E. 第四脑室脉络丛炎

正确答案：D

105、无论何种毒物中毒均应重视的是

- A. 发绀
- B. 抽搐
- C. 瘫痪
- D. 观察生命体征、血压、神志
- E. 惊厥

正确答案：D

106、某患者，因失恋而服毒自杀，入院时患者口鼻有大量分泌物，呼出气中有浓烈蒜味，伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻、呼吸困难，体格检查发现瞳孔缩小、肺部大量湿啰音。最可能的诊断是

- A. 氰化物中毒
- B. 有机磷中毒
- C. 吗啡中毒
- D. 安眠药中毒
- E. CO 中毒

正确答案：B

℃，心率 120 次/分，肺(-)。此时责任护士首先考虑的护理问题是

- A. 体温过高
- B. 体液不足
- C. 清理呼吸道无效
- D. 有感染的危险
- E. 意识障碍

正确答案：B

108、男性，42 岁，疑为“甲状腺功能亢进症”清晨起床前测得血压 146/88mmHg，脉搏 106 次/min。判断该病人属于

- A. 正常
- B. 轻度甲状腺功能亢进症
- C. 中度甲状腺功能亢进症
- D. 重度甲状腺功能亢进症

E. 甲状腺功能低下

正确答案：C

109、日射病是指

A. 大脑温度正常，体温达 40~42℃

B. 大脑温度达 40~42℃，体温不一定升高

C. 大脑温度达 40~42℃，但体温不升

D. 大脑温度及体温均达 40~42℃

E. 大脑温度与体温均正常，但患者在烈日下出现精神神经症状

正确答案：B

110、急性有机磷中毒主要的死因为

A. 呼吸衰竭

B. 周围循环衰竭

C. 脑水肿

D. 肝功能衰竭

E. 肾功能衰竭

正确答案：A

111、糖尿病酮症酸中毒的特征表现为

A. 极度口渴

B. 厌食、恶心

C. 呼气有烂苹果味

D. 呼吸加速

E. 心率加快

正确答案：C

112、糖化血红蛋白测定可用于糖尿病远期效果的监测，其监测时间为

A. 1~2 个月

B. 2~3 个月

C. 3~4 个月

D. 4~5 个月

E. 5~6 个月

正确答案：B

113、某人冬季用煤球炉取暖，但因烟道阻塞而致煤气中毒。病人处于昏迷状态，大小便失禁。抢救时首要措施是

A. 急救车送医院

B. 立即吸氧

C. 移离现场

D. 就地人工呼吸

E. 输液

正确答案：C

114、热痉挛主要应补充什么

A. 糖

B. 盐

C. 蛋

D. 水

E. 脂肪

正确答案：B

115、自杀病人抢救清醒后应

- A. 病情稳定无需陪护
- B. 可单独请假外出
- C. 可单独外出检查
- D. 做好安全防范措施
- E. 为不打扰病人休息，护士不必经常观察

正确答案：D

116、某下肢瘫痪患者，经查肢体不能自行抬起，此肌力应判为

- A. 0级
- B. 1级
- C. 2级
- D. 3级
- E. 4级

正确答案：C

117、女，60岁，脑出血昏迷，检查时发现两眼向右凝视，双侧巴宾斯基征(+)，该病人最可能出血部位在

- A. 左颞枕叶
- B. 左额中回后部
- C. 右额中回后部
- D. 右基底节区
- E. 左基底节区

正确答案：D

118、周女士，28岁。拟诊“流行性出血热”入院，入院第3日出现尿量减少、心率增快、脉压增大。最重要的护理措施是

- A. 定时测量血压和脉搏
- B. 记录24h出入液量
- C. 配合医师按“量出为入，宁少勿多”的原则严格控制液体摄入量
- D. 保持口腔黏膜的清洁和湿润
- E. 注意观察腔道和内脏出血征象

正确答案：C

119、患者，63岁，睡醒后发现一侧偏瘫，神志清楚，血压20.0/13.1kPa，脑脊液正常。应考虑为

- A. 脑出血
- B. 脑血栓形成
- C. 脑栓塞
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 高血压脑病

正确答案：B

120、男，60岁，大便后突起右手无力，讲话不清，约1h后昏迷。体检：浅昏迷，瞳孔等大，血压29.3/14.6kPa，右侧肢体瘫痪，肌张力低，腱反射未引出，右侧巴氏征阳性。最可能的诊断是

- A. 高血压脑出血
- B. 脑血栓形成

- C. 脑栓塞
- D. TIA
- E. 蛛网膜下腔出血

正确答案：A

121、男，20岁，突然发病，意识丧失，全身肌肉抽搐，口吐白沫并伴尿失禁。应首先考虑

- A. 癇病
- B. 脑出血
- C. 脑血栓形成
- D. 癲痫大发作
- E. 药物中毒

正确答案：D

℃，血压90/60mmHg，颈抵抗 Kernig 征阳性，颈部及胸部皮肤见数枚瘀点及瘀斑，瘀点涂片检查见革兰阴性双球菌。应诊断为

- A. 化脓性脑膜炎
- B. 流脑普通型
- C. 暴发型流脑休克型
- D. 暴发型流脑脑膜炎型
- E. 暴发型流脑混合型

正确答案：B

123、某病人诉复视，体检：右眼内斜，不能向外侧转动，病变部位可能位于

- A. 右展神经
- B. 左侧中脑
- C. 右侧中脑
- D. 左侧脑桥
- E. 右侧脑桥

正确答案：A

124、确诊流行性出血热的依据是

- A. 鼠类接触史
- B. 异型淋巴细胞
- C. 特异性 IgM1:20 以上
- D. “三痛征”和“酒醉貌”
- E. 尿中膜状物

正确答案：C

125、患者，女性，意识丧失，大声叫喊无应答，压迫眼眶出现痛苦病情。但不能唤醒。生命体征无明显变化。其意识状态属于

- A. 嗜睡
- B. 昏睡
- C. 浅昏迷
- D. 深昏迷
- E. 意识恍惚

正确答案：C

126、男性，32岁，突然高热、头痛、腰痛、恶心5d，2d前体温正常，但出现尿少，化验结果：白细胞 $16 \times 10^9/L$ ，有异型淋巴细胞，血小板 $60 \times 10^9/L$ ，尿中

有膜状物，首先考虑的疾病是

- A. 败血症
- B. 肾盂肾炎
- C. 钩端螺旋体病
- D. 肾综合征出血热
- E. 流行性脑脊髓膜炎

正确答案： D

127、急性脑血管病脑疝形成，最急需要的措施是

- A. 脑
- B. 脑 MRI
- C. 腰椎穿刺
- D. 脑血管造影
- E. 静脉注射甘露醇

正确答案： E

128、男，70岁，原有高血压病，血压为 23.9/12.6kPa，某日因故与人争吵，突然跌倒，立即昏迷，伴四肢抽搐，待医务人员赶到检查发现口眼歪斜、左侧上下肢不能活动，尚未送 CT 室时，仅上述表现可考虑

- A. 脑梗死
- B. 脑血栓形成
- C. 高血压脑出血
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 短暂脑缺血发作

正确答案： C

129、脑血管疾病最重要的危险因素是

- A. 吸烟
- B. 高血压
- C. 肥胖
- D. 高脂血症
- E. 酗酒

正确答案： B

130、重型肝炎病人，烦躁，24h 尿量少于 300ml，尿常规正常，血生化：尿素氮、肌酐升高，病人可能为

- A. 慢性活动性肝炎
- B. 急性重型肝炎
- C. 肝性脑病
- D. 肝肾综合征
- E. 亚急性重型肝炎

正确答案： D

131、某患者双下肢位置觉、压痛、震动觉等消失，走路时呈跨步态，闭目时及在黑暗中站立不稳。此称为

- A. 脊髓性共济失调
- B. 小脑性共济失调
- C. 大脑性共济失调
- D. 舞蹈样运动

E. 僵硬

正确答案：A

132、流脑病人出现昏迷、潮式呼吸、一侧瞳孔扩大，紧急处理应为

- A. 静脉注射速尿
- B. 静脉注射 20%甘露醇
- C. 静脉滴注地塞米松
- D. 立即气管切开
- E. 使用人工呼吸机

正确答案：B

133、病人自发动作完全消失，对任何刺激均无反应，各种反射均消失，巴宾斯基征持续阳性，则此时病人意识障碍的程度是

- A. 浅昏迷 B 嗜睡
- B. 昏睡
- C. 深昏迷
- D. 无动性缄默症

正确答案：C

134、急性出血性脑血管病的处理中哪项是错误的

- A. 勤翻身拍背
- B. 控制血压
- C. 降低颅内压力
- D. 治疗并发症
- E. 适当使用止血药

正确答案：A

135、引起脑出血的最常见原因是

- A. 高血压
- B. 脑动脉硬化
- C. 颈动脉硬化
- D. 脑动脉瘤
- E. 脑血管畸形

正确答案：A

136、短暂的意识丧失是

- A. 浅昏迷
- B. 意识模糊
- C. 昏厥
- D. 昏睡
- E. 虚脱

正确答案：C

137、有高血压的老年人突然昏迷时考虑

- A. 脑血管意外
- B. 肝昏迷
- C. 日射病
- D. 尿毒症
- E. 糖尿病酮症酸中毒

正确答案：A

138、对于颅内高压病人，腰穿的主要危险是

- A. 引起脑出血
- B. 诱发脑疝
- C. 引起癫痫发作
- D. 引起感染
- E. 促使肿瘤扩散

正确答案：B

139、突然口斜眼歪、肢体瘫痪者于 24 小时内未经治疗自愈者，应考虑

- A. 脑膜炎
- B. 蛛网膜下腔出血
- C. 脑动脉血栓形成
- D. 短暂性脑缺血发作
- E. 脑出血

正确答案：D

140、典型急性菌痢病人的粪便呈

- A. 米泔水样便
- B. 柏油样黑便
- C. 少量黏液脓血便
- D. 果酱样腥臭便
- E. 灰陶土样便

正确答案：C

141、一伤寒病人突发右下腹剧痛，查体：腹部压痛，反跳痛明显，应考虑最大可能是

- A. 肠炎
- B. 阑尾炎
- C. 肠穿孔
- D. 肠出血
- E. 肠痉挛

正确答案：C

142、女，25 岁，腹泻 9h，共 20 次，水样便，量多，无腹痛，无里急后重，无发热，伴反复腓肠肌痉挛性疼痛，体检：神志清，中度脱水，血压 11/8kPa，腹软无压痛，诊断为霍乱，首要处理是

- A. 毛花甙丙
- B. 脱水剂应用
- C. 镇静止痉药
- D. 呼吸兴奋剂
- E. 补充液体和电解质

正确答案：E

143、某女，59 岁，在看电视时突起左侧肢体无力，继而呼之不应，检查：深昏迷，压眶无反应，右侧瞳孔大于左侧瞳孔，血压 22.6/11.9kPa，目前最首要的处理措施为

- A. 降血压
- B. 降颅压
- C. 抗感染

- D. 镇静
- E. 给氧

正确答案：B

144、脑出血和蛛网膜下腔出血的重要区别点为

- A. 昏迷程度
- B. 有无高血压
- C. 有无定位性体征
- D. 起病速度
- E. 有无脑疝形成

正确答案：C

145、腱反射消失见于

- A. 嗜睡
- B. 昏睡
- C. 浅昏迷
- D. 深昏迷
- E. 意识模糊

正确答案：D

146、关于偏头痛的典型的临床表现。下列描述不正确的是

- A. 可反复发作，伴有恶心、呕吐
- B. 发作前有无先兆，如视觉模糊等
- C. 疼痛常为一侧或双侧额部搏动性头痛
- D. 适量运动后可缓解
- E. 有家族史

正确答案：D

147、某高血压患者频繁呕吐伴有突然头痛，意识不清，脉搏、呼吸减慢，左右瞳孔明显不等大，你考虑

- A. 蛛网膜下隙出血
- B. 脑疝形成
- C. 高血压危象
- D. 癔病发作
- E. 脑血栓形成

正确答案：B

148、感觉性共济失调是因为：

- A. 视觉障碍
- B. 浅感觉发生障碍
- C. 前庭耳蜗刺激
- D. 深感觉发生障碍
- E. 听觉发生障碍

正确答案：D

149、脑出血急性期抢救的重要环节是

- A. 使用降压药，降低血压
- B. 应用止血药止血
- C. 控制脑水肿，降低颅内压
- D. 立即进行手术治疗

E. 搬动患者至安静的环境

正确答案： C

150、内囊出血的特征性表现是

A. 同侧偏瘫

B. 对侧偏瘫

C. 交叉性偏瘫

D. 出现三偏症状

E. 同侧偏瘫伴偏盲

正确答案： D

151、高血压脑出血最易发生在

A. 内囊

B. 中脑

C. 桥脑

D. 延脑

E. 小脑

正确答案： A

152、流行性乙型脑炎最主要的死亡原因是

A. 过高热

B. 昏迷合并肺炎

C. 反复惊厥

D. 严重后遗症

E. 中枢性呼吸衰竭

正确答案： E

153、绦虫病最有意义的诊断依据是

A. 乏力、消瘦

B. 腹痛、食欲差

C. 肛周瘙痒

D. 大便中发现白带状节片

E. 夜间磨牙

正确答案： D

154、霍乱引起肌肉痉挛治疗原则是

A. 及时使用镇静止痉剂

B. 及时补充钠盐及钙剂

C. 纠正酸中毒

D. 纠正脱水及休克

E. 抗生素控制感染

正确答案： B

155、女性，36岁，来门诊进行体检时，用大头针轻戳病人的皮肤，病人即大声喊疼。此感觉障碍的类型为

A. 感觉减退

B. 感觉过敏

C. 感觉缺失

D. 感觉倒错

E. 感觉异常

正确答案： B

156、男，35岁，上海郊区农民，乏力2年，不能从事体力劳动，明显消瘦，腹围渐增大，腹壁静脉曲张，双下肢浮肿。粪便中检出血吸虫虫卵。病人可能为

- A. 急性血吸虫病
- B. 无症状血吸虫病
- C. 慢性血吸虫病
- D. 晚期血吸虫巨脾型
- E. 晚期血吸虫腹水型

正确答案： E

157、下列哪项对提示早期脑疝形成最有意义

- A. 头痛、呕吐、呼吸困难
- B. 意识丧失、瞳孔散大
- C. 剧烈头痛，频繁呕吐，意识障碍
- D. 脉搏、呼吸、血压出现“两慢一快”
- E. 呼之不醒，双侧瞳孔散大

正确答案： C

158、由于内毒素的作用伤寒病人常可出现

- A. 相对缓脉、心肌炎、大叶肺炎
- B. 循环衰竭、心肌炎、相对缓脉
- C. 循环衰竭、心肌炎、肝脾肿大
- D. 循环衰竭、荨麻疹、相对缓脉
- E. 以上都不是

正确答案： B

159、男性70岁，就诊前3天睡时突然失语，伴偏瘫，神志欠清，症状持续未缓解。两年来曾有3次相似发作，分别持续半小时、1小时和2小时后症状完全消失，你考虑现在诊断哪项可能性较大

- A. 短暂脑缺血发作
- B. 癫痫
- C. 脑血栓形成
- D. 脑出血
- E. 蛛网膜下隙出血

正确答案： C

160、以下哪种疾病不会继发癫痫

- A. 新生儿窒息
- B. 胃溃疡
- C. 肝性脑病
- D. 尿毒症
- E. 阿-斯综合征

正确答案： B

161、截瘫的病损部位在

- A. 脊髓前角
- B. 大脑皮层
- C. 内囊
- D. 脑桥

E. 胸腰段脊髓

正确答案：E

162、男，60岁，于昨天起床时突然跌倒，扶起时发现左侧上下肢瘫痪，但神志清醒，经CT检查，诊断脑栓塞，其发病机理是

- A. 高血压致脑血管破裂
- B. 颅外血块阻塞颅内血管
- C. 颅内血管有小瘤破裂
- D. 颅外血管微栓子暂时阻塞脑血管
- E. 血液流变学异常血栓阻塞血管

正确答案：E

163、脑梗死的危险因素不包括

- A. 高血压
- B. 高血脂
- C. 动脉粥样硬化
- D. 糖尿病
- E. 胃溃疡

正确答案：E

164、缺血性脑血管疾病的治疗措施不包括

- A. 降低血黏度、改善微循环
- B. 抗凝治疗
- C. 发病6小时内应用溶栓治疗
- D. 早期应用吗啡等镇静药
- E. 降低颅内压

正确答案：D

165、短暂性脑缺血发作的最主要的临床特点是

- A. 可出现偏身感觉障碍
- B. 可出现偏瘫
- C. 可有恶心呕吐
- D. 起病突然
- E. 症状持续时间短，一般在24小时之内恢复正常

正确答案：E

166、脑出血病人的诱发因素不包括

- A. 情绪激动
- B. 重体力劳动
- C. 酗酒
- D. 血液黏稠度增高
- E. 用力排便

正确答案：D

167、颅内压增高的病人出现哪一症状提示已发生脑疝

- A. 剧烈头痛
- B. 频繁性呕吐
- C. 一侧瞳孔进行性扩大
- D. 脉搏缓慢
- E. 潮式呼吸

正确答案：C

168、脑出血不常发生在以下哪种情况

- A. 睡眠中
- B. 情绪激动
- C. 工作劳累
- D. 用力排便
- E. 过分兴奋

正确答案：A

169、癫痫大发作时护理措施错误的是

- A. 扶持患者卧倒
- B. 解开患者的衣领、衣扣和腰带
- C. 在患者上下臼齿间放以纱布包裹的压舌板
- D. 按压抽搐肢体
- E. 将患者的头部侧向一边

正确答案：D

170、以下哪种不是脑血管疾病的病因

- A. 低血压
- B. 严重贫血
- C. 颅脑外伤
- D. 颈椎病
- E. 感冒

正确答案：E

171、出血性脑血管疾病的常见原因不包括

- A. 高血压
- B. 动脉硬化
- C. 糖尿病
- D. 脑血管畸形
- E. 血液病

正确答案：C

172、急性感染性多发性神经炎首发症状多为

- A. 大小便失禁
- B. 双侧下肢无力
- C. 一侧肢体感觉障碍
- D. 一侧肢体抽搐
- E. 复视

正确答案：B

173、癫痫大发作时最主要的护理是

- A. 避免外伤
- B. 不可强力按压肢体
- C. 保持呼吸道通畅
- D. 严密观察意识和瞳孔的变化
- E. 禁用口表测试体温

正确答案：C

174、霍乱与副霍乱典型病例发病后最先出现的常见症状是

- A. 畏寒
- B. 呕吐
- C. 腹泻
- D. 腹痛
- E. 发热

正确答案：C

175、伤寒患者肥达试验阳性反应常开始于病程的

- A. 第1周
- B. 第2周
- C. 第3周
- D. 第4周
- E. 第5周

正确答案：B

176、流行性出血热的主要传染源是

- A. 猫
- B. 家畜
- C. 蝙蝠
- D. 鼠
- E. 虱

正确答案：D

177、下列不太可能直接由糖尿病引起的不良后果是

- A. 神经病变
- B. 动脉粥样硬化
- C. 视网膜病
- D. 淋巴腺病
- E. 肾病

正确答案：D

178、肥胖2型糖尿病病人，控制饮食、体重是基本治疗。请问糖尿病饮食原则，不包括

- A. 碳水化合物占60%
- B. 餐热量分配为1/5、2/5、2/5
- C. 食粗纤维食物
- D. 脂肪宜限量
- E. 蛋白总量不超过25%

正确答案：C

179、男性，39岁，患1型糖尿病已10年。中断胰岛素治疗1周后发生酮症酸中毒，经治疗后意识恢复。短时间内又突感心悸、饥饿、出汗，随即又意识不清。应立即

- A. 加大胰岛素剂量
- B. 加用格列本脲
- C. 静脉滴注碳酸氢钠
- D. 静脉注射50%葡萄糖
- E. 应用呼吸兴奋剂

正确答案：D

180、有机磷杀虫药对人体的毒性主要是

- A. 急性肾衰竭
- B. 血液凝固障碍
- C. 抑制中枢神经系统
- D. 增加乙酰胆碱的产生
- E. 抑制乙酰胆碱活力

正确答案： E

181、男性农民，中午在烈日下进行田间劳动，1h后感到恶心、头晕、头痛、面色苍白、大汗淋漓；脉速、呼吸浅快，意识不清，血压 10.5/6.5kPa，应考虑

- A. 食物中毒
- B. 中毒性肝炎
- C. 热痉挛
- D. 中暑
- E. 低血糖

正确答案： D

182、催吐适用于

- A. 昏迷
- B. 精神病患者
- C. 神志清醒，能合作者
- D. 惊厥
- E. 服腐蚀性剂

正确答案： C

183、中毒患者最常使用的导泻药物是

- A. 50mg 酚酞
- B. 500g/L 硫酸镁
- C. 10~30ml 蓖麻油
- D. 500g/L 甘油
- E. 15~30ml 液体石蜡

正确答案： B

184、对于急性中毒病人，护士为赢得抢救时机，其首要的措施为

- A. 短时间内判断病情
- B. 准备鼻导管给氧
- C. 作三大常规检查
- D. 作好静脉输液准备
- E. 安抚病人与家属

正确答案： A

185、配制混合胰岛素时，必须先抽吸正规胰岛素是为了防止

- A. 发生中和反应
- B. 加速胰岛素降解
- C. 丧失正规胰岛素的速效特性
- D. 降低鱼精蛋白锌胰岛素药效
- E. 增加胰岛素的不良反应

正确答案： C

℃℃℃℃℃

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/145143242143011104>