

2022 护士职业资格考试《专业实务》综合练习试题 附答案

考试须知：

- 1、考试时间：120 分钟，本卷满分为 380 分。
- 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号等信息。
- 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在密封线内答题，否则不予评分。

姓名：\_\_\_\_\_

考号：\_\_\_\_\_

得分	评卷人
	A1 型题（本题共 50 题，每小题 3 分，共 150 分）

1、影响舒适的人际关系环境因素是（ ）。

- A、体位不当
- B、活动受限
- C、护患关系
- D、角色改变
- E、身体不洁

2、胃切除术后开始进食的指征，恰当的是（ ）。

- A. 切口疼痛消失
- B. 病人想进食
- C. 一般情况好转，体温正常
- D. 肠蠕动已恢复正常
- E. 无术后并发症出现

3、护患沟通的首要原则是（ ）。

- A. 治疗性

B. 保密性

C. 规范性

D. 艺术性

E. 尊重性

4、急性呼吸窘迫综合征早期的病理变化不包括( )。

A. 肺间质水肿

B. 肺泡萎陷

C. 肺泡内透明膜形成

D. 肺充血肺充血

E. 肺泡纤维化

5、手术室的室内温度应控制在( )。

A. 16℃~18℃

B. 18℃~22℃

C. 22℃~24℃

D. 24℃~26℃

E. 26℃~28℃

6、多尿是指24小时尿量超过( )。

A. 1500ml

B. 2000ml

C. 2500ml

D. 3000ml

E. 3500ml

7、亚急性感染性心内膜炎最常见的致病菌是( )。

A. 肠球菌

B. 支原体

- C. 大肠杆菌
- D. 草绿色链球菌
- E. 乙型溶血性链球菌

8、护士甲在呼吸内科工作，早上巡视病房时，发现其中一个病室的相对湿度为30%，请推断此病室患者可能出现的表现为（ ）。

- A. 呼吸道黏膜干燥，咽喉痛、口渴
- B. 血压增高、头晕、面色苍白
- C. 多汗、发热、面色潮红
- D. 食欲不振、疲倦、头晕
- E. 憋气、闷热、难受

9、正常情况下，产妇顺产后需继续留在产房观察的时间是（ ）。

- A. 1小时
- B. 2小时
- C. 3小时
- D. 4小时
- E. 5小时

10、我国成人急性白血病最常见的细胞类型是（ ）。

- A. 急性粒细胞白血病
- B. 急性单核细胞白血病
- C. 急性淋巴细胞白血病
- D. 急性粒-单核细胞白血病
- E. 急性红白血病

11、皮质醇增多症的特征性表现为（ ）。

- A. 脊柱变形
- B. 脱毛与痤疮

- C. 皮肤紫纹
- D. 向心性肥胖
- E. 皮肤黏膜色素沉着

12、治疗肺炎球菌肺炎的首选抗生素是（ ）。

- A. 红霉素
- B. 青霉素
- C. 丁胺卡那霉素(阿米卡星)
- D. 氟哌酸(诺氟沙星)
- E. 羧苄青霉素

13、高血压病的治疗药物卡托普利最常见的副作用是（ ）。

- A. 头痛
- B. 乏力
- C. 心率增快
- D. 心率减慢
- E. 刺激性干咳

14、护理质量控制的依据是（ ）。

- A. 统计数据
- B. 质量标准
- C. 个人观察
- D. 问卷调查
- E. 书面报告

15、有助于异位妊娠诊断的检查不包括（ ）。

- A. 盆腔检查
- B. 妊娠试验
- C. B型超声

D. 阴道后穹隆穿刺

E. 大便隐血试验

16、护士甲在为一卧床患者翻身时，其家属询问患者更换卧位间隔时间的根据，请你指出最合适的解释（ ）。

A. 患者的要求，最长不超过1小时

B. 患者的病情及局部受压程度

C. 护士工作时间的安排来决定

D. 家属的意见，随时进行

E. 皮肤疾患的程度

17、患者：“我每天都要喝一点酒。”护士：“请问您每天具体喝多少？”护士使用的沟通技巧是（ ）。

A、叙述

B、重复

C、澄清

D、反映

E、反馈

18、合成清蛋白的场所是（ ）。

A. 肝脏

B. 胆道

C. 脾脏

D. 胰腺

E. 肾脏

19、发生溶血反应，初期的典型症状是（ ）。

A、四肢麻木，腰背剧痛

B、黄疸

C、血红蛋白尿

D、高热

E、呼吸急促

20、新生儿寒冷损伤综合征皮肤硬肿的特点是（ ）。

A. 以非凹陷性水肿为主

B. 以凹陷性水肿为主

C. 以暗红色硬肿为主

D. 以鲜红色硬肿为主

E. 中间软，四周硬

21、即使药物过敏试验阳性，但还必须注射的药物是（ ）。

A. 青霉素

B. 链霉素

C. 头孢菌素

D. 普鲁卡因

E. 破伤风抗毒素

22、细菌性痢疾患者查体时，腹部压痛部位最有可能是（ ）。

A. 右下腹

B. 右上腹

C. 左上腹

D. 左下腹

E. 脐周

23、病人的餐具如何消毒（ ）。

A. 喷雾

B. 熏蒸

C. 擦拭

D. 高压蒸汽

E. 煮沸

24、某膀胱癌患者行保留膀胱术，术后应用膀胱灌注法治疗预防肿瘤复发。常用的灌注药物为( )。

A、新洁尔灭

B、硼酸水

C、卡介苗

D、干扰素

E、抗菌药

25、下列哪项不是促进病人休息的护理措施( )。

A、做好心理护理，解除病人焦虑

B、尊重病人休息习惯

C、各种诊疗护理活动相对集中

D、满足病人一切要求

E、协助病人自我放松

26、猩红热儿特有的体征是( )。

A. 口周苍白圈

B. 躯干糠皮样脱屑

C. 皮疹多在发热2天后出现

D. 疹间无正常皮肤

E. 多为持续性高热

27、胃大部份切除术(毕氏Ⅱ式)，术后1周，当患者进食后上腹饱胀和呕吐，呕吐物有食物和胆汁，最后可能发生的并发症是( )。

A. 十二指肠残端破裂

B. 吻合口梗阻

C. 远侧空肠段梗阻

D. 近侧空肠段梗阻

E. 倾倒综合征

28、使用电动吸引器吸痰时，正确的是（ ）。

A. 成人吸痰调节负压为30~40kPa

B. 将患者头转向护士，固定好活动的义齿

C. 先吸净气管内分泌物，再吸净口咽部分泌物

D. 吸痰时左右旋转吸痰管，向上抽吸

E. 每次吸痰时间不超过25秒

29、麻疹的传染源是（ ）。

A. 带菌者

B. 患者

C. 家禽

D. 家畜

E. 水源

30、某术后化疗患者，一般状况较差。目前患者存在肺部感染和尿潴留。护士对其进行以下哪项操作前须充分告知并签订知情同意书（ ）。

A. 晨间护理

B. 静脉输液

C. 皮试

D. 留置导尿

E. 锁骨下静脉穿刺置管

31、腹股沟疝修补术后护理，错误的是（ ）。

A. 腹股沟手术区可用砂袋压迫

B. 用阴囊托或丁字带托起阴囊

C. 保持大、小便通畅

D. 及早下床活动



E. 三个月内避免重体力劳动

32、甲状腺功能检查前14日不能吃( )。

A. 海参

B. 小龙虾

C. 牛蛙

D. 鲫鱼

E. 小黄鱼

33、选择抗生素最理想的依据是( )。

A. 脓液的性质

B. 细菌的种类

C. 细菌药敏试验

D. 感染的严重程度

E. 药物的抗菌谱

34、PDCA循环中的“D”代表( )。

A、管理

B、计划

C、实施

D、检查

E、处理

35、吞服强酸、强碱类腐蚀性药物的患者，切忌进行的护理操作是( )。

A. 口腔护理

B. 洗胃

C. 输液

D. 导泻

E. 灌肠

36、属于健康性护理诊断的是（ ）。

- A、语言沟通障碍
- B、清理呼吸道无效
- C、有窒息的危险
- D、母乳喂养有效
- E、活动无耐力

37、妊娠期高血压疾病的基本病理变化是（ ）。

- A. 脑血管痉挛
- B. 胎盘血管痉挛
- C. 肾小血管痉挛
- D. 冠状动脉痉挛
- E. 全身小动脉痉挛

38、特殊患者口腔护理，如有活动义齿，应（ ）。

- A. 暂时不用的义齿，可浸于清水中，每周更换1次清水
- B. 口腔护理结束后，取下活动义齿，用温水冲洗干净
- C. 暂时不用的义齿，可浸于热水或乙醇中
- D. 活动义齿应先取下，用冷水冲洗干净
- E. 先取下活动义齿，用热水冲洗干净

39、某护士之外伤患者做头孢菌素皮试，其结果为阳性，但医生仍坚持用药。此时护士最应坚持的是（ ）。

- A、重做一次
- B、做对照实验
- C、拒绝使用
- D、与其他护士进行商量
- E、继续执行医嘱

40、女性进入青春期的显著标志是（ ）。

- A. 身高增高迅速
- B. 体型呈成人体型
- C. 月经初潮
- D. 第二性征开始出现
- E. 生殖系统的功能完善

41、患者经抗炎、利尿、强心治疗后，体温降至正常，可平卧，现改用地高辛口服，护士给药时特别注意（ ）。

- A. 应饭后服药
- B. 应空腹服药
- C. 应准时服药
- D. 用药前测脉率
- E. 服药后少饮水

42、一位护士正在为一位刚入院的患者做入院介绍，此时护患关系处于（ ）。

- A. 初始期
- B. 结束期
- C. 工作期
- D. 准备期
- E. 熟悉期

43、心动过缓是指安静状态下成人脉率每分钟少于（ ）。

- A. 40次
- B. 50次
- C. 60次
- D. 70次
- E. 80次

44、锐器盒应放多少就不可再用。( )

A. 2/3

B. 1/3

C. 1/4

D. 3/4

E. 1/2

45、急性白血病患者出血的主要原因是( )。

A. 反复感染

B. 弥漫性血管内凝血

C. 血小板质和量的异常

D. 白血病细胞浸润

E. 感染毒素对血管的损伤

46、某ICU护士，毕业三年以来，基本上是一个人护理某个病人，病人需要的全部护理由他负责，实施个体化护理。对ICU的重症病人进行护理记录时不宜采取的做法是( )。

A. 字迹端正清晰

B. 动态反映病情的变化

C. 使用蓝黑色水笔写

D. 写错可涂刮后重写

E. 体现以病人为中心

47、属于临时医嘱的是( )。

A. 病危

B. 转科

C. 一级护理

D. 流质饮食

E. 氧气吸入

48、急救物品完好率需达到（ ）。

- A. 90%
- B. 92%
- C. 96%
- D. 98%
- E. 100%

49、患者排尿开始时有血尿，以后逐渐变清表示病变部位在（ ）。

- A. 输尿管上段
- B. 尿道
- C. 膀胱三角区
- D. 输尿管下段
- E. 肾实质

50、以“病人为中心”的优质护理工作模式是（ ）。

- A、分组制护理
- B、分级制护理
- C、分层制护理
- D、功能制护理
- E、责任制整体护理

得分	评卷人

A2 型题（本题共 50 题，每小题 3 份，共 150 分）

1、患者男，73岁。慢性肾功能不全尿毒症期患者，需进行维持性血液透析治疗。常抱怨家属照顾欠周到。今天早上对护士说“你们治来治去，怎么也治不好，我不治了！”下列护士的答复中，最恰当的是（ ）。

- A. “您的心情我理解，我们也在努力，需要您的配合。”
- B. “要是不治疗，您的病情比现在严重多了！”
- C. “尿毒症是终末期疾病，治愈是不可能的。”

D. “您觉得治疗效果不理想，可以找找别的治疗途径。”

E. “您这样扰乱了病房的秩序，影响了我们工作。”

2、患者男性，38岁，因呼吸道感染伴咳嗽，发热到医院就诊，医嘱给与青霉素80万U肌内注射，每日两次。护士首先为患者做青霉素皮试，护士进行操作错误的是（ ）。

A. 皮试前询问有无用药史和过敏史

B. 用注射用水稀释皮试液

C. 皮试液现用现配

D. 被好肾上腺素

E. 在前臂掌侧下段做皮试

3、患者男，20岁。因“饮酒后昏迷，抽搐3小时”急诊入院。患者于3小时前饮白酒800ml后逐渐胡言乱语，昏睡，继之昏迷，伴有剧烈抽搐，口吐白沫，无双眼上翻，未咬破舌头。最可能的诊断是（ ）。

A. 癫痫

B. 中风

C. 脑水肿

D. 酒精中毒

E. 食物中毒

4、患者女，25岁。产后一周出现会阴侧切伤口感染，细菌培养结果为金黄色葡萄球菌感染。该细菌最有可能对哪种抗生素存在耐药性（ ）。

A. 头孢菌素

B. 红霉素

C. 甲硝唑

D. 青霉素

E. 两性霉素B

5、男，70岁。突然出现双下肢无力，跌倒在地，又自行站起，1天发生了3次。该患者可能为（ ）。

A. 脑血栓形成

B. 短暂性脑缺血发作

C. 脑栓塞

D. 脑出血

E. 蛛网膜下隙出血

6、患者男，25岁。在硬膜外麻醉下行左腹股沟斜疝修补术。恰当的术后饮食护理是（ ）。

A、术后应禁食48小时

B、术后即进普通饮食

C、术后应胃肠减压

D、术后应静脉供给营养3天

E、若术后6小时无恶心即可进流质饮食

7、患者，男性，55岁，肛裂感染，遵医嘱热水坐浴，水温应控制在（ ）。

A. 30- 35℃

B. 35~40℃

C. 40~45℃

D. 45~50℃

E. 55~60℃

8、患者，男性，28岁。3个月前因发热、寒战诊为亚急性感染性心内膜炎，此病的常见致病菌是（ ）。

A. 大肠杆菌

B. 溶血型链球菌

C. 草绿色链球菌

D. 葡萄球菌

E. 肠球菌

9、患者女性，31岁，测体温39摄氏度，医嘱即可肌内注射复方氨基比林2ml。护士此刻执行的医嘱是（ ）。

A. 非独立性护理措施

B. 独立性护理措施

C. 协作性护理措施

D. 依赖性护理措施

E. 预防性护理措施

10、患儿男，6岁。因腮腺炎入院，给予对症治疗。该患儿特别害怕打针，为其输液时，下列措施不正确的是（ ）。

A. 待其睡眠后输液

B. 与患儿建立相互依赖的友好关系

C. 给患儿讲故事

D. 指导患儿深呼吸

E. 以鼓励的态度支持患儿

11、患者男，62岁。以霍乱收治入院，护士在向患者及家属坐入院宣导时，错误的内容是（ ）。

A、患者不能走入病室

B、双休日家属可探视

C、剩饭需煮沸后倾倒

D、排泄物需严格消毒

E、通向走廊的门窗需关闭

12、患儿女，10个月，多汗，睡眠不安。查体：可见枕秃、方颅、肋缘外翻，被诊断为维生素D缺乏性佝偻病，护士要采取的措施不正确的是（ ）。

A. 护理动作轻柔

B. 勤洗澡勤换内衣

C. 多带患儿到户外晒太阳

D. 添加含维生素D的食物

E. 积极进行站立行走、锻炼

13、患者，女，43岁。因重型再生障碍性贫血收入院，拟对其进行输血治疗。护士在进行输



血前的准备时，不正确的操作是（ ）。

- A. 进行血型鉴定和交叉配备试验
- B. 提血时，和血库人员共同做好“三查八对”
- C. 库存血取出后，如紧急需要，可低温加热
- D. 输血前，需与另一护士再次核对
- E. 输血前应先征得患者同意并签署知情同意书

14、患者女性，39岁。患支气管扩张10年，咳嗽，咳脓性痰，痰量50ML/d，下列处理不当的是（ ）。

- A. 体位引流
- B. 加强营养
- C. 长期应用抗生素
- D. 给予祛痰剂
- E. 给予雾化吸入

15、患者，女性，45岁。护士在腹部手术前为患者行导尿术时，发现手套破裂，正确的处理方法是（ ）。

- A. 用无菌纱布将破裂处包裹好
- B. 用无菌治疗巾包裹手指操作
- C. 用酒精棉球擦拭破裂处
- D. 立即更换无菌手套
- E. 立即修补后再使用

16、患者女，30岁。妊娠35周，因阴道流血就诊，诊断为前置胎盘，拟急行剖宫产收入院。护士首先应为患者做的是（ ）。

- A. 办理入院手续
- B. 进行沐浴更衣
- C. 检查阴道出血情况
- D. 进行会阴清洗

E. 用平车送入病区

17、患者男性，59岁，工人。1年前无明显诱因出现双腕、双手关节和双膝、踝、足、跖趾关节肿痛，伴晨僵，时间约12分钟，疼痛以夜间明显，影响行动。实验室检查：血沉55mm/L，RF(+)。关节X线检查：双手骨质疏松，腕部关节间隙变窄。使用青霉胺治疗，护士应观察哪些不良反应（ ）。

A. 有无黑便

B. 白细胞减少

C. 有无皮疹、蛋白尿、血尿

D. 肾功能异常

E. 头晕

18、患者男，62岁。吞咽困难一个月余，经检查后确诊食管癌并肝转移。患者哭泣、烦躁。目前该患者的心理反应是（ ）。

A. 否认期

B. 愤怒期

C. 协议期

D. 抑郁期

E. 接受期

19、患者男、75岁，患慢性阻塞性肺疾病30余年，现处于疾病稳定期。在为其制定肺功能康复计划时，应是（ ）。

A、护士单独制定，强制患者执行

B、护士单独制定，指导患者执行

C、患者自行制定并执行

D、患者自行制定，有护士指导执行

E、护士与患者共同制定，护士指导患者执行

20、患者女，40岁。近1个月来自觉疲乏，无力，头晕，医嘱硫酸亚铁溶液口服，为减少不良反应正确的给药知道是（ ）。

A、饭前服用

B、直接喝取

C、茶水送服

D、牛奶送服

E、服药后及时漱口

21、患儿，男，8个月。母乳喂养，6个月起添加辅食，为了保证其生理需要，其每日摄入热量为（ ）。

A. 60kcal/kg

B. 70kcal/kg

C. 80kcal/kg

D. 90kcal/kg

E. 110kcal/kg

22、男性，25岁，突发剧烈头痛，伴频繁呕吐，继之神志不清。检查：体温36.8℃，颈抵抗，心、肺无异常，肢体无偏瘫，应考虑为（ ）。

A. 脑挫伤

B. 脑血栓形成

C. 脑肿瘤

D. 蛛网膜下腔出血

E. 脑栓塞

23、患者女性，23岁。诊断为“甲型肝炎”收住入院。护士护理患者穿过的隔离衣，被视为清洁部位的是（ ）。

A. 衣领

B. 袖口

C. 腰部以上

D. 腰部以下

E. 胸部以上

24、患者，男性，35岁。近2个月来右腰部有隐痛、钝痛。今晨7时突然发作阵发性刀割样疼

痛, 向下腹及会阴部放射。患者辗转不安, 呻吟呼痛, 面色苍白, 伴镜下血尿。此疼痛为( )。

- A. 心绞痛
- B. 肠绞痛
- C. 胆绞痛
- D. 肾绞痛
- E. 坐骨神经痛

25、患者, 男性, 71岁。卧床多日, 臀部红肿、硬化, 起小水疱及上皮剥落, 有时有渗液, 患者诉疼痛, 你判断患者局部皮肤属于压疮的 ( )。

- A. 淤血红润期
- B. 炎性浸润期
- C. 浅度溃疡期
- D. 深度溃疡期
- E. 局部皮肤感染

26、某男28岁, 突然上腹疼痛4小时, 恶心、呕吐、吐出蛔虫一条。既往无溃疡病史。全腹压痛, 反跳痛, 肌紧张, 肝浊音缩小, 肝上界下移, 肠鸣音消失, 血清淀粉酶(4167.5nmol/s)应考虑( )。

- A. 胆道蛔虫伴感染
- B. 阑尾穿孔, 全腹膜炎
- C. 绞窄性肠梗阻
- D. 溃疡病急性穿孔
- E. 急性出血性胰腺炎

27、患者女性, 65岁, 患高血压15年, 近日病情加重入院, 查体: 血压190/110mmHg, 全身水肿, 患者的饮食应采用 ( )。

- A. 要素饮食
- B. 少渣饮食
- C. 低蛋白饮食

D. 无盐低钠饮食

E. 低胆固醇饮食

28、患者男性，21岁。从单杠上跌下来致左股部肿痛，卧地不起。局部成角畸形，有假关节活动。首先应做的是（ ）。

A. 反复安慰

B. 立即去电话亭呼叫急救中心

C. 肢临时固定

D. 即背起病人去找医院

E. 即用木板抬走病人

29、患者男，60岁。车祸致颅脑损伤，下肢粉碎性骨折，深昏迷，营养状况差，轻度水肿。评估见骶尾部皮肤紫红色，有皮下硬结，并有小水疱。患者目前皮肤状况处于（ ）。

A、正常

B、压疮淤血红润期

C、压疮炎性浸润期

D、压疮浅度溃疡期

E、压疮坏死溃疡期

30、某病室患者入、出院情况、危重症患者病情变化、手术人数等内容都书写在日间病室交班报告中，书写人员一般是（ ）。

A. 护士长

B. 药疗护士

C. 主班护士

D. 小组护士

E. 高年资护士

31、患者男性，68岁，脑出血，现患者处于持续睡眠状态，但能被语言或轻度刺激唤醒，刺激去除后又很快入睡，此时患者处于（ ）。

A. 嗜睡

B. 昏睡

C. 浅昏迷

D. 深昏迷

E. 意识模糊

32、患者，女，65岁。因脑出血致右侧肢体瘫痪。护士为其梳发，错误的操作是（ ）。

A. 协助患者抬头，将治疗巾铺于枕头上

B. 将头发从中间分为两股，分股梳理

C. 梳发时由发根梳向发梢

D. 脱落的头发置于纸袋中

E. 打结的头发用甘油湿润后慢慢梳理

33、女，34岁。发热、咳嗽，左侧胸痛，喜左侧卧位，启诉此卧位可使胸部疼痛减轻，喘气够用。此卧位性质属（ ）。

A. 主动卧位

B. 被动卧位

C. 被迫卧位

D. 习惯卧位

E. 特异卧位

34、某患者患风湿性心脏病8年余，近日上呼吸道感染，查体肝颈静脉回流征阳性，提示（ ）。

A. 心源性休克

B. 主动脉瓣关闭不全

C. 心房颤动

D. 右心功能不全

E. 左心功能不全

35、患者女，45岁，清洁工，患尿毒症入院入院后一直陪伴身边，当得知需要长期透析治疗后，患者经常独自垂泪，默默发呆，不愿与人交流最可能的原因是（ ）。

- A、担心疾病影响工作
- B、家属感情支持不足
- C、无力承受高额费用
- D、害怕透析带来后遗症
- E、尿毒症引起的精神症状

36、患者，女性，23岁。诊断为“甲型肝炎”收住入院。护士护理患者穿过的隔离衣，被视为清洁部位的是（ ）。

- A. 衣领
- B. 袖口
- C. 腰部以上
- D. 腰部以下
- E. 胸部以上

37、患者，男，34岁，因车祸致右下肢开放性骨折，大量出血，被送来急诊。在医生未到之前，接诊护士应立即（ ）。

- A. 详细询问车祸发生的原因
- B. 向医院有关部门报告
- C. 给患者注射镇静剂
- D. 给患者使用止血药
- E. 给患者止血，测量血压，建立静脉通道

38、患者女，26岁。系统性红斑狼疮患者，用药治疗过程中出现胃溃疡发作，考虑与哪种药物的不良反应有关（ ）。

- A. 环磷酰胺
- B. 羟氯喹
- C. 泼尼松
- D. 雷公藤总苷
- E. 免疫球蛋白

39、患者，女性，51岁。发热、头痛1天。患者因医师要为其做腰穿检查，有恐惧感。从伦理要求考虑，临床上应对患者做的主要工作是（ ）。

- A. 要得到患者知情同意
- B. 告知做腰穿的必要性
- C. 告知做腰穿时的注意事项
- D. 因诊断需要，先动员，后检查
- E. 动员家属做患者的思想工作

40、男，35岁，肾结核行右肾部分切除术，现患者伤口痊愈，出院时应告知患者继续应用抗结核治疗的时间为（ ）。

- A. 1~2周
- B. 3~4周
- C. 5~6周
- D. 7~8周
- E. 6个月以上

41、牛先生，患冠心病10年，半个月来频繁发作心前区不适，含服硝酸甘油无效，疑为急性心肌梗死，最具诊断意义的检查是（ ）。

- A. 血常规
- B. 尿常规
- C. 血沉
- D. 超声波
- E. 心电图

42、患者男性，56岁。突然心悸，气促，咳粉红色泡沫痰，血压195 / 90mmHg，心率136次 / 分，应首先备好的药物是（ ）。

- A. 毛花苷丙，硝酸甘油，异丙肾上腺素
- B. 硝普钠，毛花苷丙，呋塞米
- C. 毒毛花苷K，硝普钠，普萘洛尔



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/158056006116006027>