

临床护士应知应会及三基理论练习题及答案

1、开封后使用的胰岛素的保存期限不超过:B

- A、2周
- B、4周
- C、6周
- D、8周
- E、10周

答案：B

2、对诊断原发性肝癌具有较高特异性的检查是

- A、CT
- B、B超
- C、放射性核素肝扫描
- D、血清甲胎蛋白测定
- E、选择性肝动脉造影

答案：D

3、留置胃管前应根据什么选择胃管的大小和质地()

- A、病人年龄
- B、病人病情
- C、食物的形状和量
- D、评估的结果
- E、置管的目的

答案：D

4、不属于晚间护理的内容是[]

- A、整理床单位
- B、口腔护理
- C、为患者梳头
- D、会阴护理
- E、足部清洁

答案：C

5、张力性气胸急救时首先应

- A、伤侧锁骨中线第二肋间行胸膜腔穿刺,尽快排气减压
- B、迅速封闭胸壁伤口
- C、清创
- D、气管切开
- E、加压吸氧

答案：A

6、下列()不是一级护理患者

- A、病情趋向稳定的重症患者
- B、生活部分自理,病情随时可能发生变化的患者
- C、手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者
- D、病情稳定,仍需卧床,且生活部分自理的患者
- E、生活完全不能自理且病情不稳定的患者

答案：D

7、确诊慢性胃炎的主要依据是()

- A、胃液分析
- B、胃镜检查
- C、活组织检查
- D、胃肠钡餐检查
- E、血清学检查

答案：B

8、按舒张压水平分级,高血压急症是指舒张压超过()

- A、100mmHg
- B、105mmHg
- C、110mmHg
- D、115mmHg
- E、120mmHg

答案：E

9、溃疡病患者腹痛剧烈,疑有穿孔合并症,禁止使用()

- A、阿托品
- B、西咪替丁
- C、灭吐灵
- D、胃肠减压
- E、吗啡

答案：E

10、刘某,女,45岁。诊断为“消化性溃疡”,近来病人感上腹饱胀,疼痛于餐后加重,且反复大量呕吐,病人可能出现的并发症是()

- A、出血
- B、穿孔
- C、癌变
- D、幽门梗阻

E、营养不良

答案：D

11、腕带原则上佩戴在病人的()。

A、左手

B、右手

C、左脚

D、右脚

E、床栏

答案：A

12、预防性用药最好是在发生艾滋病病毒职业暴露后()

A、72 小时

B、36 小时

C、24 小时

D、4 小时

E、48 小时

答案：D

13、 男性, 40 岁, 既往有心脏病史 5 年, 近来感体力不支, 不能从事任何体力活动, 休息时亦感乏力、心悸、气急, 判断其心功能属于()

A、心功能 I 级

B、心功能 II 级

C、心功能 I 级

D、心功能 IV 级

E、以上都不对

答案：D

14、谢先生, 65 岁。诊断为原发性支气管癌, 拟手术治疗入院。该病人术后呼吸道的措施错误的是()

A、给氧

B、定时给病人叩背

C、鼓励病人浅快呼吸

D、鼓励病人咳嗽

E、气管插管者应密切观察气管导管的位置

答案：C

15、使用 500mg/L 消毒剂进行消毒时 , 作用时间至少应大于。()

A、15 分钟

B、20 分钟

- C、30 分钟
- D、40 分钟
- E、45 分钟

答案：C

16、药品管理制度下列哪项正确()

- A、各病区普通药品无需定基数
- B、外用、口服、注射、静脉用药无需分类放置和保管, 药物标签规范、完整、清晰
- C、每月定期全面清理药柜
- D、所有针剂及口服药必须存放在原装盒内

答案：D

17、腹膜刺激征是指

- A、压痛、肌紧张、反跳痛
- B、反射性呕吐、恶心、腹泻
- C、肠鸣音亢进、压痛、反跳痛
- D、肠鸣音消失、腹痛、腹泻
- E、板状腹、压痛、腹泻

答案：A

18、为气管插管患者做口腔护理以下哪项是错误的()

- A、不合作患者需一人协助固定气管导管
- B、口腔护理前放出气囊内的气体
- C、教会患者用手势表达不适
- D、根据病情选择合适的口腔护理液
- E、禁止漱口

答案：B

19、 男性, 42 岁, 患重型急性胰腺炎, 并发休克 36 小时, 经抗休克治疗后行胰腺和其周围坏死组织清除、腹腔引流术。术后心率 106 次/分, 血压 96/60mmHg , 中心静脉压 10cmH₂O, 呼吸 22 次/分, 动脉血氧分压 66mmHg, 尿量每小时少于 20ml, 尿比重 1.002。考虑病人已发生()

- A、心功能不全
- B、肺功能衰竭
- C、肾衰竭
- D、血容量不足
- E、 体内抗利尿激素 分泌过多

答案：C

20、以下关于食管的叙述错误的是()

- A、食管有 3 个狭窄
- B、食管壁由黏膜、黏膜下、肌层和浆膜层组成
- C、食管连接咽和胃
- D、食管的功能是把食物和唾液等运到胃内
- E、食管下括约肌防止胃内容物逆流入食管

答案：B

21、甲亢患者应给予的饮食是：

- A、高热量、高蛋白、高维生素饮食
- B、高热量、低蛋白、高维生素饮食
- C、低热量、高蛋白、低维生素饮食
- D、低热量、低蛋白、高维生素饮食
- E、高热量、高蛋白、低盐饮食

答案：A

22、输血前后冲管时只能用()

- A、5%葡萄糖
- B、10%葡萄糖
- C、生理盐水
- D、林格液
- E、5%葡萄糖氯化钠

答案：C

23、患者完全不能自主排尿清洁间歇导尿频率

- A、6~7 次/日
- B、4~6 次/日
- C、3~4 次/日
- D、2~3 次/日
- E、1~2 次/日

答案：B

24、李先生, 50 岁, 重症颅脑外伤术后患者, 术后第五天, 痰培养的结果显示多重耐药鲍曼不动杆菌感染, 此时患者实施隔离措施中错误的是()

- A、首选单间隔离。
- B、用物专人专用。
- C、可以与同类多重耐药菌感染患者或定值患者安置在同一房间。
- D、医务人员相对固定, 实施诊疗护理操作中, 在标准预防的基础上, 采取预防接触传播的隔离措施, 穿隔离衣。

E、护理患者时不需要做到一床一抹,可以跟其他耐药菌患者共用抹布。

答案: E

25、十不交接制度中以下哪项不正确()

- A、危重患者抢救不交接
- B、患者入院、出院未处理好不交接
- C、皮试结果未观察可以交下一班继续观察
- D、医嘱未处理不交接
- E、物品数目不清不交接

答案: C

26、董某,男,53岁。因右下肢无力2天平车送入院。检查发现右下肢能在床上做平移运动,但不能抬离床面。该病人右下肢肌力为

- A、0级
- B、1级
- C、2级
- D、3级
- E、4级

答案: C

27、骨牵引术后护理,错误的是

- A、床尾抬高15~30cm
- B、避免牵引针移动
- C、指导功能锻炼
- D、保持牵引重量
- E、及时去除牵引针孔处血痂

答案: E

28、以下关于预检分诊点的设置,描述错误的是

- A、是患者通道进入诊疗区域的必经之路
- B、选址应相对独立
- C、通风良好
- D、至发热诊室应当固定线路
- E、无需进行特殊标识

答案: E

29、某慢性充血性心力衰竭患者在治疗期间出现恶心、头晕,黄视,心率为36次/min,应考虑

- A、多巴酚丁胺中毒
- B、酚妥拉明中毒

- C、洋地黄中毒
- D、硝普钠中毒
- E、氨茶碱中毒

答案：C

30、患者林某,男,68岁,因脑血管意外,昏迷已1月余,长期鼻饲,在护理操作中,下列护理措施不妥的是:

- A、每日进行口腔护理2~3次
- B、鼻饲间隔时间不少于2h
- C、每次喂食前要检查胃管是否在胃内
- D、所有鼻饲物品每日应消毒一次
- E、胃管应每日更换,晚上拔出,次晨再由另一鼻孔插入

答案：E

31、胃溃疡最常发生于()

- A、胃体部
- B、贲门处
- C、幽门处
- D、胃大弯处
- E、胃小弯处

答案：E

32、一级护理的患者巡视频次。()

- A、1h
- B、2h
- C、3h
- D、4h
- E、30分钟

答案：A

33、王某,男,3岁。在进餐中突然出现严重呼吸困难,伴发绀。急诊初步判断为异物吸入,则最有可能吸入的部位是

- A、气管
- B、右主支气管
- C、左主支气管
- D、细支气管
- E、终末细支气管

答案：B

34、顾先生, 39 岁, 外伤后下腹部剧烈疼痛, 并有少量血尿排出。体格检查: 全腹有压痛、腹肌紧张, 移动性浊音阳性。试插导尿管可顺利进入膀胱, 注入生理盐水 200ml 后抽出不足 150ml。首先应考虑为 ()

- A、肾损伤
- B、膀胱损伤
- C、前尿道损伤
- D、后尿道损伤
- E、肠破裂

答案: B

35、申请护士执业注册的, 应当向拟执业地省、自治区、直辖市人民政府卫生主管部门提出申请。收到申请的卫生主管部门应当自收到申请之日起 () 工作日内做出决定, 对具备本条例规定条件的, 准予注册, 并发给护士执业证书。

- A、7 个
- B、14 个
- C、20 个
- D、28 个
- E、30 个

答案: C

36、65 岁患者陈阿姨不慎跌倒, 为头颈部落地, 出现无意识、呼吸急促, 当班护士小熙进行了初步评估伤情和紧急处理, 以下不正确的是 ()

- A、对患者情况做初步判断
- B、测血压、脉搏、心率、呼吸, 判断意识
- C、为赶到现场的医师提供信息
- D、将患者移至病床或平车上
- E、协助医师检查, 给予急救和处理, 对伤情做出初步评估

答案: D

37、患者男、68 岁。48 小时前急性心梗发作入院。现其病情稳定, 家属强烈要求探视, 但未到探视时间。此时护士首先应该

- A、请护士长出面调解
- B、请主管大夫出面调解
- C、向家属耐心解释以取得家属理解
- D、悄悄让家属进入病房
- E、不予理睬

答案: E

38、空气栓塞致死的原因是气栓阻塞

- A、肺静脉入口
- B、肺动脉入口
- C、上腔静脉入口
- D、下腔静脉入口
- E、主动脉入口

答案：B

39、患者男, 50 岁。既往身体健康, 因休克型肺炎入院 2 周多, 应用抗生素和补液等治疗后、患者病情好转已经准备出院, 此患者不应有的表现是

- A、口唇红润
- B、肢端温暖
- C、尿量>30ml/h
- D、休息时收缩压>90mmHg
- E、休息时心率 122 次/分

答案：E

40、护士执业注册有效期为()。

- A、1 年
- B、2 年
- C、3 年
- D、4 年
- E、5 年

答案：E

41、老王, 女, 67 岁, 患慢性充血性心力衰竭, 在治疗期间出现恶心、头痛、头晕、黄视, 检查心率 46 次/min, 二联律。应考虑为()

- A、硝普钠中毒
- B、洋地黄中毒
- C、氨茶碱中毒
- D、酚妥拉明中毒
- E、多巴酚酊胺中毒

答案：B

42、输血后处置不对的是[]

- A、完成输血操作后, 再次核对医嘱 .
- B、再次核对患者床号、姓名
- C、确认无误后签名
- D、将交叉配血报告单粘贴在病历中
- E、将血袋置于医用垃圾桶内

答案：E

43、枕骨大孔疝临床表现中最危急的是：

- A、剧烈头痛
- B、频繁呕吐
- C、早期突发呼吸骤停
- D、颈项强直
- E、意识障碍

答案：C

44、患者女性, 20 岁。因癫痫收治入院, 今日早晨洗漱回病房途中突然全身倒地, 意识丧失、四肢抽搐, 此时首要的处理措施是()

- A、立即与家属将患者抬到床上, 以防受伤
- B、回治疗室拿电筒观察瞳孔变化
- C、向医生汇报, 尽快用药
- D、脑电图检查
- E、保持呼吸道通畅, 防止窒息

答案：E

45、静脉输液发生空气栓塞应立即让病人采取()体位

- A、直立位
- B、垂头仰卧位
- C、左侧卧位
- D、右侧卧位
- E、半坐卧位

答案：C

46、消化性溃疡患者服用制酸剂宜在：

- A、饭前半小时
- B、饭前一小时
- C、两餐之间
- D、每日清晨一次
- E、饭后一小时

答案：E

47、下列哪项检查结果不支持 Graves 病的诊断()

- A、总 T3、T4 水平增高
- B、游离 T3、T4 水平增高
- C、TSH 水平增高
- D、TRAB 阳性

E、TSAB 阳性

答案：C

48、下列属于长期备用医嘱的是

A、一级护理

B、可待因 30mg q8h prn

C、普食

D、氧气吸入

E、青霉素 80 万 U im q6h

答案：B

49、由主细胞分泌的物质是（ ）

A、盐酸

B、内因子

C、碱性黏液

D、促胃液素

E、胃蛋白酶

答案：E

50、董某,男,53岁。因右下肢无力2天平车送入院。检查发现右下肢能在床上做平移运动,但不能抬离床面。该病人右下肢肌力为()

A、0级

B、1级

C、2级

D、3级

E、4级

答案：C

51、患者女,30岁。停经7周,阴道流血3天伴高热2天来院就诊,诊断为“流产合并感染”目前最佳的治疗原则是

A、立即清宫

B、保胎治疗

C、密切监测病情变化

D、缩宫素治疗

E、无需特殊处理

答案：A

52、口腔护理时开口器应从()放入。

A、门齿处

B、舌下

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/165301141122011104>