

药理学测试二

您的姓名： [填空题]*

学号： [填空题]

1、H1受体阻断药最佳适应证是（） [单选题]*

- A、支气管哮喘
- B、过敏性休克
- C、晕动病
- D、失眠
- E、荨麻疹、过敏性鼻炎等皮肤黏膜变态反应(正确答案)

2、H1受体阻断药最常见的不良反应是（） [单选题]*

- A、烦躁、失眠
- B、镇静、嗜睡(正确答案)
- C、消化道反应
- D、致畸
- E、变态反应

3、缓解轻、中度急性哮喘症状应首选（） [单选题]*

- A、沙丁胺醇(正确答案)
- B、沙美特罗

C、异丙托溴铵

D、孟鲁司特

E、普萘洛尔

4、氨茶碱的主要平喘机制为（） [单选题]*

A、直接舒张支气管

B、抑制磷酸二酯酶(正确答案)

C、激活鸟苷酸环化酶

D、抑制腺苷酸环化酶

E、促进肾上腺素的释放

5、下述药物中，不属于促动力药的是（） [单选题]*

A、甲氧氯普胺

B、多潘立酮

C、氢氧化铝(正确答案)

D、莫沙必利

E、西沙必利

6、关于氢氧化铝的描述哪一项是正确的（） [单选题]*

A、抗酸作用较弱

B、不产生收敛作用

C、不引起便秘

D、不可与其他抗酸药合用

E、多与三硅酸镁合用(正确答案)

7、下列药物中，能促进食物消化的药物是（） [单选题]*

- A、胶体果胶铋
- B、乳酶生 (正确答案)
- C、兰索拉唑
- D、雷尼替丁
- E、乳果糖

8、下列关于抗酸剂的描述，正确的是（） [单选题]*

- A、碳酸氢钠是非吸收性抗酸剂
- B、常用抗酸剂缓解非甾体抗炎药相关症状及预防溃疡发生
- C、抗酸剂可直接中和胃酸，升高胃内容物pH (正确答案)
- D、氢氧化铝能直接中和胃酸，并被胃肠道吸收
- E、氢氧化铝抗酸作用强，起效快，作用时间短

9、肝素抗凝作用的主要机制是（） [单选题]*

- A、与钙离子形成络合物
- B、促进抗凝血酶III的活性 (正确答案)
- C、激活纤溶系统
- D、对抗维生素K的作用
- E、收缩血管

10、拮抗华法林作用的药物是（） [单选题]*

- A、阿司匹林
- B、叶酸
- C、新抗凝

D、利血生

E、维生素 K (正确答案)

11、铁剂与下列哪种物质同服促进吸收 () [单选题] *

A、维生素 C (正确答案)

B、四环素

C、浓茶

D、氢氧化铝凝胶

E、牛奶或豆浆

12、体内、体外都有抗凝作用的抗凝药是 () [单选题] *

A、枸橼酸钠

B、华法林

C、双香豆素

D、尿激酶

E、肝素 (正确答案)

13、可对抗肝素过量所致出血的药物是 () [单选题] *

A、氨甲苯酸

B、垂体后叶素

C、鱼精蛋白 (正确答案)

D、维生素 K

E、维生素 C

14、维生素 B12 主要用于治疗 () [单选题] *

- A、慢性失血性贫血
- B、缺铁性贫血
- C、肿瘤放化疗后的贫血
- D、恶性贫血(正确答案)
- E、地中海贫血

15、对于华法林下列叙述不正确的是（） [单选题]*

- A、口服有效
- B、体内外都有抗凝作用(正确答案)
- C、抗凝作用起效慢
- D、抗凝作用维持时间长
- E、与血浆蛋白结合率高

16、影响维生素 B12 吸收的主要因素是（） [单选题]*

- A、浓茶
- B、内因子(正确答案)
- C、碳酸氢盐
- D、四环素合用
- E、胰酶

17、口服铁剂最常见不良反应是（） [单选题]*

- A、高血压
- B、出血反应
- C、胃肠道刺激(正确答案)
- D、过敏反应

E、嗜睡

18、可用于治疗早产的药物是（） [单选题]*

A、益母草(正确答案)

B、缩宫素

C、异丙肾上腺素

D、利托君

E、前列腺素 E2

19、能使子宫产生节律性收缩，用于催产引产的药物是（） [单选题]*

A、催产素(正确答案)

B、垂体后叶素

C、麦角新碱

D、麦角毒

E、麦角胺

20、产后出血宜选用（） [单选题]*

A、小剂量缩宫素

B、麦角新碱(正确答案)

C、维生素 K

D、米索前列醇

E、地诺前列素

21、在下列何种情况下可使用缩宫素催产（） [单选题]*

A、头盆不称

- B、前置胎盘
- C、多胎妊娠
- D、低张性宫缩无力 (正确答案)
- E、产道异常

22、糖皮质激素的抗毒作用机制主要是 () [单选题]*

- A、对抗细菌外毒素
- B、中和细菌内毒素
- C、加速细菌内毒素排泄
- D、提高机体对细菌内毒素的耐受性 (正确答案)
- E、减少毒素的生成

23、糖皮质激素诱发加重感染的主要原因是 () [单选题]*

- A、激素用量不足，无法控制症状
- B、病人对激素不敏感，疗效差
- C、激素促使病原体繁殖
- D、因抗炎、抗免疫作用使机体防御功能降低 (正确答案)
- E、增加病原体入侵机体的能力

24、糖皮质激素隔日疗法的给药时间最好在隔日 () [单选题]*

- A、早上 3~5 点
- B、上午 6~8 点 (正确答案)
- C、中午 12 点
- D、下午 4~5 点
- E、凌晨 1~2 点

25、糖皮质激素类药物全身应用时不良反应多，但是不引起（） [单选题]*

- A、低血钙
- B、高血压
- C、高血钾 (正确答案)
- D、高血糖
- E、高血脂

26、硫脲类药物抗甲状腺激素的作用是（） [单选题]*

- A、抑制促甲状腺激素的分泌
- B、抑制甲状腺激素释放
- C、抑制甲状腺对碘的摄取
- D、抑制甲状腺素的合成 (正确答案)
- E、促进甲状腺素的代谢

27、治疗甲状腺危象宜选用（） [单选题]*

- A、大剂量碘剂+硫脲类 (正确答案)
- B、大剂量碘剂单用
- C、硫脲类单用
- D、小剂量碘剂单用
- E、 β 受体阻断药单用

28、甲苯磺丁脲的临床适应征是（） [单选题]*

- A、重型糖尿病
- B、糖尿病昏迷
- C、胰岛功能完全丧失的糖尿病

- D、胰岛素功能尚未完全丧失的轻、中度 2 型糖尿病 (正确答案)
- E、单用饮食控制有效的轻度糖尿病

29、治疗呆小病的主要药物是 () [单选题] *

- A、他巴唑
- B、卡比马唑
- C、丙硫氧嘧啶
- D、甲状腺素 (正确答案)
- E、小剂量碘剂

30、糖皮质激素的作用错误的是 () [单选题] *

- A、抗炎
- B、抗毒
- C、抗菌 (正确答案)
- D、抗免疫
- E、抗休克

31、降血糖药共同的主要不良反应 () [单选题] *

- A、过敏反应
- B、损害肝脏
- C、耐受性
- D、低血糖症 (正确答案)
- E、致畸作用

32、治疗成人肥胖型糖尿病宜选用 () [单选题] *

- B、甲苯磺丁脲
- C、格列苯脲
- D、苯乙双胍 (正确答案)
- E、阿卡波糖

33、易引起乳酸血症的药是 () [单选题]*

- A、正规胰岛
- B、甲苯磺丁脲
- C、格列苯脲 (正确答案)
- D、苯乙双胍
- E、阿卡波糖

34、易引起粒细胞减少的是 () [单选题]*

- A、正规胰岛
- B、甲苯磺丁脲
- C、格列苯脲
- D、苯乙双胍 (正确答案)
- E、阿卡波糖

35、青霉素治疗下列哪种疾病可引起赫氏反应? () [单选题]*

- A、流行性脑脊髓膜炎
- B、草绿色链球菌心内膜炎
- C、大叶性肺炎
- D、气性坏疽

(正确答案)

36、对金黄色葡萄球菌引起的急慢性骨髓炎最佳选用 () [单选题]*

- A、阿莫西林
- B、红霉素
- C、头孢孟多
- D、克林霉素(正确答案)
- E、乙酰螺旋霉素

37、复方新诺明是指 () [单选题]*

- A、SD+TMP
- B、SIZ+SD
- C、SMZ+TMP(正确答案)
- D、SIZ+SMZ
- E、SD+SMZ

38、耐药金葡菌感染选用 () [单选题]*

- A、米诺环素
- B、氨苄西林
- C、磺胺嘧啶
- D、苯唑西林(正确答案)
- E、羧苄西林

39、青霉素 G 与四环素合用的效果是 () [单选题]*

- A、增强

- C、无关
- D、拮抗(正确答案)
- E、毒性增加

40、可获协同作用的药物组合是（） [单选题]*

- A、青霉素+红霉素
- B、青霉素+氯霉素
- C、青霉素+四环素
- D、青霉素+庆大霉素(正确答案)
- E、青霉素+磺胺嘧啶

41、对肾脏基本无毒性的头孢菌素类药物是（） [单选题]*

- A、头孢噻吩
- B、头孢噻肟(正确答案)
- C、头孢氨苄
- D、头孢唑林
- E、头孢拉定

42、鼠疫首选的抗生素是（） [单选题]*

- A、青霉素 G
- B、链霉素(正确答案)
- C、SD
- D、红霉素
- E、A+B

43

50S 亚基结合，抑制蛋白质合成而抑菌的是 () [单选题]*

- A、青霉素
- B、万古霉素
- C、大环内酯类
- D、氯霉素 (正确答案)
- E、磺胺类

44、克拉维酸因具有下列哪种特点而与阿莫西林配伍应用 () [单选题]*

- A、抗菌谱广
- B、是 β -内酰胺酶抑制药，可增强阿莫西林抗菌活性 (正确答案)
- C、可与阿莫西林竞争肾小管分泌
- D、可使阿莫西林口服吸收更好
- E、可使阿莫西林用量减少、毒性降低

45、各类型的结核病首选药是 () [单选题]*

- A、异烟肼 (正确答案)
- B、利福平
- C、链霉素
- D、乙胺丁醇
- E、吡嗪酰胺

46、不宜与氨基糖苷类抗生素合用的利尿药是 () [单选题]*

- A、阿米洛利
- B、呋塞米 (正确答案)
- C、螺内酯

E、氢氯噻嗪

47、兼有抗震颤麻痹作用的抗病毒药是（） [单选题]*

A、碘苷

B、阿昔洛韦

C、阿糖腺苷

D、利巴韦林

E、金刚烷胺(正确答案)

48、耳、肾毒性最大的氨基甙类抗生素是（） [单选题]*

A、卡那霉素

B、庆大霉素

C、西索米星

D、奈替米星

E、新霉素(正确答案)

49、对深部真菌感染首选的是（） [单选题]*

A、制霉菌素(正确答案)

B、氟康唑

C、灰黄霉素

D、酮康唑

E、两性霉素 B

50、治疗肠内、外阿米巴病的首选药物是（） [单选题]*

- B、巴龙霉素
- C、氯喹
- D、甲硝唑 (正确答案)
- E、依米丁

51、患者，女性，63岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、氨茶碱静脉滴注治疗。氨茶碱静脉滴注速度不宜过快，否则易出现（） [单选题]*

- A、心律失常
- B、支气管痉挛
- C、惊厥 (正确答案)
- D、血压下降
- E、血糖升高

52、患者男性，25岁，上腹灼痛，反酸，疼痛多出现在早上10点及下午4点左右，有时夜间痛醒，进食后缓解。X线钡餐检查：十二指肠溃疡。该患者首选的治疗药物是（） [单选题]*

- A、哌仑西平
- B、雷尼替丁 (正确答案)
- C、氢氧化铝
- D、甲氧氯普胺
- E、果胶铋

53、患儿，女，刚出生4周，单纯母乳喂养。可见皮肤紫癜、粘膜出血，吐咖啡色奶块、有黑便。入院经检查凝血时间及凝血酶原时间延长，血中维生素K含量减低。诊断为新生儿出血，应选用下列哪种药物治疗（） [单选题]*

- A、垂体后叶素
- B、维生素K (正确答案)
- C、氨甲苯酸
- D、氨甲环酸
- E、酚磺乙胺

54、患儿，男，1岁3个月，长期单纯母乳喂养。近来皮肤粘膜逐渐苍白，以口唇粘膜及甲床较明显，易疲乏、不爱活动、精神萎靡，突然发烧入院，经检查小儿患有营养性缺铁性贫血合并肺部感染。该患儿应选用下列何药治疗（） [单选题]*

- A、枸橼酸铁胺糖浆 (正确答案)
- B、叶酸
- C、维生素B12
- D、维生素K
- E、甲酰四氢叶酸

55、一足月临产妇，临产前由于宫缩乏力，经医生检查后决定应用缩宫素催产，并由一护士具体执行医嘱。应用缩宫素催产的最主要依据是（） [单选题]*

- A、兴奋子宫作用强而大
- B、大剂量也不会引起强直性收缩
- C、临产时对其敏感性最强
- D、临产时对其敏感性弱
- E、适当剂量使宫体产生节律性收缩，子宫颈部松弛 (正确答案)

56、女性，30岁。因偏头痛急性发作，来院急诊，应给何药治疗（） [单选题]*

- A、麦角新碱
- B、甲基麦角新碱
- C、麦角胺 (正确答案)
- D、氢麦角毒
- E、吗啡

57、患者，男，60岁，因患类风湿性关节炎服用泼尼松和多种解热镇痛药5个月余。近日突发自发性胫骨骨折，入院治疗。其骨折可能与下列哪种药物有关（） [单选题]*

- A、阿司匹林
- B、吲哚美辛
- C、布洛芬
- D、泼尼松 (正确答案)
- E、保泰松

58、患者，女，28岁，甲状腺肿大伴多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁，根据同位素扫描及血T₃、T₄检查，诊断为甲亢。该患者应该选用下列何药治疗？（） [单选题]*

- A、甲状腺素
- B、丙硫氧嘧啶 (正确答案)
- C、碘剂
- D、放射性碘
- E、肾上腺皮质激素

59、患者，男，40岁。有糖尿病史10年，近日并发肺炎。查：呼吸35次/分，心率105次/分，血压90/60mmHg。呼吸气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖500mol/L。应选下列哪种药物抢救（） [单选题]*

- A、甲状腺素
- B、珠蛋白锌胰岛素
- C、格列齐特
- D、正规胰岛素 (正确答案)
- E、低精蛋白锌胰岛素

60、患者男性，29岁，阴茎头部出现下疳两个月就诊。有不洁性接触史。临床诊断为梅毒。立即给予青霉素注射治疗，十分钟后患者出现心慌气短，全身皮疹、呼吸急促，查体：血压85/60mmHg，脉率110次/分。该患者目前发生了（） [单选题]*

- A、特异质反应
- B、过敏反应 (正确答案)
- C、反跳现象
- D、吉海反应
- E、心血管不良反应

61、患者男性，25岁。咽炎，注射青霉素后1分钟，呼吸急促，面部发绀，心率130次/分，血压60/40mmHg。抢救药物是（） [单选题]*

- A、地塞米松+去甲肾上腺素
- B、地塞米松+多巴胺
- C、曲安西龙+异丙肾上腺素
- D、地塞米松+肾上腺素 (正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/16714314014006043>