

急救理论知识测试题含参考答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、治疗室颤唯一有效的方法是（ ）

- A、胸外心脏按压
- B、电击除颤
- C、人工呼吸
- D、咳嗽复苏
- E、胸部捶击

正确答案：B

2、男，39 岁，4 小时前突然剧烈头痛，伴呕吐多次。体检：颈部轻度抵抗，克氏征（+），布氏征（+），体温 37.2° C，血压 140/80mmHg。其他神经系统检查阴性。诊断首先考虑（ ）

- A、蛛网膜下腔出血
- B、脑炎
- C、脑出血
- D、偏头痛
- E、脑膜炎

正确答案：A

3、心肺复苏成功与否的关键是（ ）

- A、是否除颤
- B、是否给药
- C、时间的早晚
- D、有气管插管
- E、在医院

正确答案：C

4、尿毒症最常见的病因是（ ）

- A、慢性肾小球肾炎
- B、肾动脉硬化
- C、慢性肾盂肾炎
- D、高血压病
- E、红斑狼疮性肾炎

正确答案：A

5、患者男性，68 岁，摔倒后出现右髋部疼痛，不能站起行走。体检：右髋部压痛、肿胀、有髋关节活动障碍、右大粗隆上移、右下肢呈外旋位。

()请问该患者可能的诊断为

- A、尾骨骨折
- B、髌臼骨折
- C、股骨颈骨折
- D、骨盆骨折
- E、股骨上端骨折

正确答案：C

6、维持胸内负压的必要条件是：()

- A、胸廓扩张
- B、呼气肌收缩
- C、吸气肌收缩
- D、胸膜腔密闭

正确答案：D

7、骨盆骨折最危险的并发症是()

- A、骶丛神经损伤
- B、神经母细胞瘤
- C、尿道断裂
- D、盆腔内出血
- E、直肠损伤

正确答案：D

8、患者男性，34岁，塌方事故中发生骨盆、左股骨及胫腓骨多处骨折，可能引起的并发症是()

- A、骨折部位感染
- B、脂肪栓塞
- C、缺血性肌痉挛
- D、骨筋膜室综合征
- E、休克

正确答案：E

9、为昏迷患者每次吸痰时间为()

- A、<1分钟
- B、<15秒
- C、1~2分钟
- D、<5秒
- E、<30秒

正确答案：B

10、成人心肺复苏时打开气道的最常用方式为_____。（ ）

- A、托颏法；
- B、仰头举颏法；
- C、双手推举下颌法；
- D、环状软骨压迫法

正确答案：B

11、肺心病患者出现心室颤动、心脏骤停以致突然死亡最常见的原因是（ ）

- A、急性广泛心肌梗死
- B、右心功能不全
- C、左心功能不全
- D、急性严重心肌缺氧
- E、合并脑血管意外

正确答案：D

12、脑出血的院前急救中，下列哪项措施是错误的（ ）

- A、注意保持呼吸道通畅，及时吸出呼吸道分泌物
- B、平稳搬运患者，以免加重出血
- C、头位抬高 15~30°
- D、快速充分补液，以加强脑灌注压，保证脑细胞氧供应
- E、呕吐时将头偏向一侧，防止呕吐物吸入气道

正确答案：C

13、肾上腺素可运用于（ ）

- A、心源性哮喘
- B、器质性心脏病
- C、洋地黄中毒
- D、各种原因引起的心脏骤停
- E、甲状腺功能亢进

正确答案：D

14、一患者阴道不规则少量流血 3 月，来院就诊。尿妊娠试验阳性，给予刮宫，但刮出物未见绒毛，病理检查结果为蜕膜组织，则其可能的诊断为（ ）

- A、异位妊娠
- B、功血

- C、葡萄胎
- D、子宫内膜
- E、早期妊娠反应

正确答案：A

15、插入式腹部加压心肺复苏，给予加压的救护者双手应作用于（）

- A、下腹部
- B、上腹部
- C、中腹部
- D、剑突下

正确答案：C

16、脑震荡的诊断依据包括：（）

- A、明显的近事遗忘
- B、以上均是
- C、短暂的昏迷
- D、明确的外伤史

正确答案：B

17、王某，男，25岁，患化脓性扁桃体炎，在注射青霉素数秒钟后出现胸闷、气促、面色苍白、出冷汗及濒死感、血压75/45mmHg，护士首先采取的急救措施是（）

- A、停止注射青霉素，皮下注射盐酸肾上腺素1mg
- B、给予静脉输液并报告医师
- C、给予氧气吸入
- D、针刺人中、内关等穴位

正确答案：A

18、下列不是呼气末正压通气的主要作用的是（）

- A、改善通气与氧合
- B、使功能残气量减少
- C、避免肺泡早期闭合
- D、在改善肺的通气、弥散、VA/Q失调的同时，还可减少呼吸做功
- E、使肺泡扩张

正确答案：B

19、关于尿糖，下列哪项是正确的（）

- A、斑氏试剂只检查尿中是否有葡萄糖
- B、尿糖阳性是由于肾小管不能将糖全部重吸收

- C、尿糖阳性肯定有糖代谢紊乱
- D、尿糖阳性肯定血糖升高
- E、根据尿糖阳性即可诊断糖尿病

正确答案：B

20、禽流感病毒对高温比较敏感，在多少温度下 2 分钟到 10 分钟就可以将其灭活（ ）

- A、60—70℃
- B、40—50℃；
- C、50—60℃；

正确答案：A

21、皮试液 1ml 含量错误的是（ ）

- A、破抗毒素 150IU
- B、链霉素 2500U
- C、细胞色素 C 7.5mg
- D、普鲁卡因 2.5mg
- E、青霉素 500U

正确答案：C

22、医院污物的处理原理错误的是（ ）

- A、分类收集
- B、分别处理
- C、尽可能采用焚烧处理
- D、医疗垃圾与生活垃圾一同处理
- E、防止污染扩散

正确答案：D

23、下列哪项不是甲亢的临床表现（ ）

- A、骨疼
- B、周围血管征
- C、大便次数增加或腹泻
- D、肌肉萎缩
- E、月经量增多

正确答案：E

24、适于采用包扎疗法的烧伤创面是（ ）

- A、四肢浅 II 度及深 II 度烧伤
- B、四肢高压电接触伤

- C、Ⅲ度烧伤
- D、会阴部烧伤
- E、面颈部浅度烧伤

正确答案：A

25、急性左心衰竭转送注意事项哪个不正确：（ ）

- A、保持呼吸道通畅
- B、持续吸氧
- C、使患者呈半坐位，小腿下垂，尽可能舒适
- D、强迫病人平躺在担架上
- E、保持静脉通道畅

正确答案：D

26、患者，女，63岁。胸痛1小时后，突然昏倒，神志不清，血压测不出，心音消失，瞳孔散大，面色苍白，大动脉搏动消失，ECG示：室性自主节律，拟诊为心脏骤停。成人胸外心脏按压有效的标志是（ ）

- A、舒张压 $>60\text{mmHg}$
- B、可闻及心音
- C、收缩压 $>80\text{mmHg}$
- D、收缩压 $>60\text{mmHg}$
- E、平均动脉压 $>80\text{mmHg}$

正确答案：C

27、关于慢性肺心病急性加重期使用强心剂的指征，以下各项中不正确的是（ ）

- A、合并高血压性心脏病出现急性左心衰竭者
- B、心率 >120 次/min，有房性早搏者
- C、以右心衰竭为主要表现，而无明显急性感染的病人
- D、感染控制，呼吸功能改善，但仍有反复水肿的心力衰竭患者
- E、合并冠心病出现急性左心衰竭者

正确答案：B

28、患者右手掌被一薄而窄的铁器插入至第三掌骨，造成中指屈指肌腱及桡侧固有神经损伤，该伤应为（ ）

- A、切割伤
- B、刺伤
- C、压伤
- D、撕脱伤

E、复合伤

正确答案：B

29、可说明血管痉挛程度的确切指标是()

A、尿量

B、末梢循环

C、脉搏

D、体温

E、脉压差

正确答案：E

30、脊髓休克时，双下肢瘫痪或四肢瘫痪，并出现()

A、肌张力低下，反射消失，尿潴留

B、全身冷汗

C、腱反射亢进

D、神志模糊

E、血压下降

正确答案：A

31、心室纤颤的临床表现不包括()

A、心音消失

B、血压测不清

C、面色苍白

D、意识丧失

E、脉搏触不到

正确答案：C

32、急性左心衰竭的临床表现()

A、咳嗽频繁，咳粉红色泡沫痰，肺部布满湿罗音

B、心率加快，可闻及奔马律

C、突然发生的重度呼吸困难，端坐呼吸

D、以上都是

E、皮肤苍白或发绀，严重者出现血压降低或休克

正确答案：D

33、多发伤的并发症中发病率最高的是()

A、感染

B、颅脑损伤

C、休克

D、胸腹脏器损伤

正确答案：C

34、癫痫发作时错误的护理是（ ）

A、防止舌咬伤

B、立即喂抗癫痫药

C、让患者就地平卧

D、及时给氧

正确答案：B

35、直肠手术最容易损伤的泌尿系器官是（ ）（ ）

A、前列腺

B、输尿管

C、精索

D、膀胱

E、尿道

正确答案：B

36、传染病肝炎患者排泄物的处理最好选用（ ）

A、漂白粉

B、新洁尔灭

C、来苏

D、金星消毒液

正确答案：A

37、药物过敏试验正确的注射部位及方法是（ ）

A、前臂掌侧下 1/3 处皮下注射

B、前臂掌侧下 1/3 处皮内注射

C、前臂背侧下 1/3 处皮内注射

D、前臂背侧下 1/3 处皮下注射

正确答案：B

38、一个神志不清的患者送入急诊室，呼气带有大蒜味，急查全血胆碱酯酶活力为 58%，最有可能的原因有（ ）

A、有机磷农药中毒

B、尿毒症

C、糖尿病酮症酸中毒

D、大量饮酒

E、肝性脑病

正确答案：A

39、慢性阻塞性肺疾病合并慢性肺心病，最常见的死亡原因是()

- A、消化道出血
- B、电解质紊乱
- C、呼吸衰竭
- D、休克
- E、心律失常

正确答案：C

40、患者有规律呼吸几次后，突然停止呼吸，间隔一个短时间后又开始呼吸，周而复始。此种呼吸和呼吸暂停交替出现的现象称为()

- A、深度呼吸（库斯莫呼吸）
- B、叹息呼吸
- C、蝉鸣式呼吸
- D、间断呼吸（毕奥呼吸）
- E、潮式呼吸（陈施呼吸）

正确答案：D

41、患者男性，28岁。参加同事聚会饮酒后，被送入医院，表现为呼吸慢而有鼾音，伴有呕吐、心率快，132次/分，血压80/50mmHg，血乙醇超过87mmol/L（400mg/dl）。目前患者处于()

- A、深昏迷
- B、嗜睡
- C、兴奋期
- D、浅昏迷
- E、共济失调期

正确答案：A

42、下列哪一种临床类型不是毒覃中毒的类型()

- A、神经异常型
- B、溶血型
- C、胃肠炎型
- D、神经型
- E、肾坏死型

正确答案：E

43、下列关于止血带止血法，正确的是：()

- A、连续阻断血流时间不超过12h

- B、前臂用橡胶带缚扎
- C、可用绳索、电线缚扎
- D、上臂扎在中 1 / 3 处

正确答案：A

44、院前急救处理病人时遵循从_____的顺序最为可靠。()

- A、躯干到四肢
- B、哪里出血先处理哪里
- C、个人习惯
- D、头到脚

正确答案：D

45、常用的止血方式不包括()

- A、指压止血法
- B、止血带止血法
- C、加压包扎止血法
- D、截肢法
- E、加垫屈肢止血法

正确答案：D

46、气管插管时，预防感染的措施中错误的是()

- A、有条件者尽量住单间或监护病房
- B、医护人员接触患者前后要洗手
- C、非一次性使用吸痰管使用后灭菌处理
- D、一次性吸痰管每 4h 更换
- E、呼吸机管道定时更换

正确答案：D

47、一氧化碳中毒最有效的解救方法是()

- A、补充维生素
- B、脱水
- C、冬眠
- D、氧疗

正确答案：D

48、下列哪项为少尿期 ()

- A、24 小时尿量少于 500ml
- B、24 小时尿量少于 100ml
- C、24 小时尿量少于 200ml

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/16813113010006035>