

口腔执业医师（第三单元）模拟试卷 13 (题后含答案及解析)

题型有：1. A1 型题 2. A2 型题 3. A3/A4 型题 4. B1 型题

1. 额颞部软组织出血的止血方法是
- A. 压迫面动脉
 - B. 压迫颞浅动脉
 - C. 压迫耳后动脉
 - D. 压迫上颌动脉 E. 压迫颞深动脉

正确答案：B

2. 关于牙本质龋透明层，错误的说法是
- A. 管腔中矿物盐沉积
 - B. 牙本质小管变窄
 - C. 硬度较正常牙本质高
 - D. 存在轻度的脱矿 E. 可出现脂肪变层

正确答案：C

3. 衡量一颗牙是否为固定桥良好基牙的最重要的指标是
- A. 牙槽骨的密度
 - B. 牙槽骨的量
 - C. 牙周膜面积
 - D. 牙根长度 E. 牙根数目

正确答案：C

4. 牙周炎主要 X 线片表现为
- A. 牙槽骨吸收边缘呈弥散状
 - B. 牙槽骨吸收，牙槽嵴顶及骨硬板模糊、消失
 - C. 牙槽骨吸收，牙周膜间隙变窄
 - D. 牙槽骨吸收，骨硬板增厚 E. 牙槽骨吸收，牙周膜间隙消失

正确答案：B

5. 关于牙周炎预后的影响因素，下列哪项不正确
- A. 牙松动情况
 - B. 牙槽骨吸收程度
 - C. 牙周炎类型
 - D. 牙龈退缩程度 E. 患者依从性

正确答案：D

6. 中腭突未能在一侧或两侧与侧腭突融合，形成的畸形是
- A. 腭裂
 - B. 牙槽突裂
 - C. 面斜裂
 - D. 面横裂 E. 上唇正中裂

正确答案：A

7. 以下说法正确的是
- A. 人老了自然要掉牙
 - B. 牙好坏与刷牙无关
 - C. 牙好是天生的
 - D. 人老掉牙不是自然规律 E. 定期检查不得牙病

正确答案：D

8. 牙发育异常不包括
- A. 牙数目异常
 - B. 牙排列异常
 - C. 牙结构异常
 - D. 牙形态异常 E. 牙萌出异常

正确答案：B

9. 固定义齿与牙体缺损修复对基牙要求的主要差别在于
- A. 牙冠有足够的固位形
 - B. 牙根粗长稳固
 - C. 要求活髓
 - D. 牙周组织健康 E. 基牙的轴向位置基本正常，有共同就位道

正确答案：E

10. 上颌侧切牙牙冠唇舌面外形高点应在
- A. 牙冠唇舌面 1/2 处
 - B. 牙冠唇舌面中 1/3 处
 - C. 牙冠唇舌面切 1/3 处
 - D. 牙冠唇舌面颈缘处 E. 牙冠唇舌面颈 1/3 处

正确答案：E

11. 乳牙环状龋多位于
- A. 牙冠切 1/3 处

- B. 牙冠切 1 / 3 ~ 中 1 / 3 处
- C. 牙冠中 1 / 3 ~ 颈 1 / 3 处
- D. 牙冠颈 1 / 3 处 E. 牙冠胎 1 / 3 ~ 中 1 / 3 处

正确答案： C

12. 下列哪种情况不宜做桩冠修复
- A. 牙槽骨内残根，经冠延长术后可暴露出断面
 - B. 牙冠缺损致颈缘
 - C. 前牙斜折至牙槽嵴下，牙根尚有足够长度
 - D. 畸形牙直接预备，固位形不良 E. 牙槽骨以下的斜形根折，伴牙根松动

正确答案： E

13. 保证下颌运动协调的关系是
- A. 双侧颞下颌关节的协调
 - B. 颌关系的协调
 - C. 神经协调控制
 - D. 肌肉运动协调 E. 颞下颌关节、颌和神经肌肉结构三者协调一致

正确答案： E

14. 上颌第一磨牙各面易患龋病的顺序为
- A. 颌面，近中面，腭面，颊面，远中面
 - B. 颌面，腭面，近中面，颊面，远中面
 - C. 颌面，近中面，颊面，腭面，远中面
 - D. 颌面，颊面，腭面，近中面，远中面 E. 颌面，远中面，近中面，颊面，腭面

正确答案： A

15. 以下哪一部位的菌斑与牙周组织的破坏关系最为密切
- A. 光滑面菌斑
 - B. 颌面点隙裂沟菌斑
 - C. 邻面菌斑
 - D. 颈缘菌斑 E. 龈下菌斑

正确答案： E

16. 不适合用作牙周病影像学检查的方法是
- A. 根尖片
 - B. 颌翼片
 - C. 下颌骨侧位片
 - D. 曲面体层片 E. 根尖片数字减影技术

正确答案：C

17. 主要显示上下牙的牙冠部，常用于检查邻面龋的检查方法是

- A. 下颌横断咬合片
- B. 颌翼片
- C. 曲面体层片
- D. 根尖片 E. 华特位片

正确答案：B

18. 牙列缺损最常见的病因为

- A. 龋病、牙周病
- B. 牙及牙槽骨外伤
- C. 颌骨骨髓炎
- D. 颌面部肿瘤和发育障碍 E. 心脏病

正确答案：A

19. 釉梭多见于

- A. 乳牙和第一恒磨牙
- B. 牙尖部
- C. 新生线周围
- D. 乳牙牙尖部 E. 釉牙本质界

正确答案：B

20. 以下用具中没有清洁牙邻面菌斑作用的是

- A. 牙签
- B. 牙间刷
- C. 牙间冲洗器
- D. 牙线 E. 橡胶按摩器

正确答案：C

21. 下列哪一项不是金属成品冠修复乳牙窝洞的适应证

- A. 牙体缺损范围广
- B. 牙颈部龋蚀，可制备龈壁者
- C. 一颗牙有多个牙面龋者
- D. 釉质发育不全牙 E. 间隙保持器中作固位体

正确答案：B

22. 下列哪一项不是牙根敏感的原因

- A. 牙龈退缩
- B. 牙颈部牙骨质薄
- C. 牙骨质中有神经分布
- D. 牙颈部缺乏牙骨质 E. 牙周刮治破坏牙骨质

正确答案：C

23. 下列哪项不是影响语音治疗效果的因素

- A. 腭咽闭合功能不全
- B. 牙裂缺损，错颌
- C. 患儿接受能力
- D. 合作配合程度 E. 腭裂类型

正确答案：E

24. 牙周间隙变窄或消失的 x 线影像是

- A. 牙颌向脱位
- B. 牙嵌人性脱位
- C. 牙根折裂
- D. 牙折 E. 致密性骨炎

正确答案：B

25. 1981 年 WHO 制定的口腔健康标准是

- A. 牙健康是牙、牙周组织、口腔邻近部位及颌面部均无组织结构与功能性异常
- B. 牙清洁、无龋洞、无疼痛感，牙龈颜色正常、无出血现象
- C. 无牙体、牙周、黏膜疾病
- D. 无龋齿、牙周疾病 E. 牙清洁、无结构与功能异常

正确答案：B

26. 牙本质、牙髓、牙骨质和牙周膜均来源于

- A. 牙囊
- B. 牙乳头
- C. 外间充质
- D. 间质 E. 都不是

正确答案：C

27. 关于先天性梅毒牙，不正确的描述是

- A. 牙冠形成期梅毒螺旋体侵入牙囊所致
- B. 牙乳头增生突入成釉器
- C. 牙囊慢性炎症及纤维化

D. 釉质表面成不规则小结节和坑窝 E. 61 | 16、621 | 126 易受累

正确答案：B

28. 造成牙邻面磨耗的主要原因是

- A. 牙生理性远中移动
- B. 牙生理性近中移动
- C. 牙颊向移动
- D. 牙颌向移动 E. 牙舌向移动

正确答案：B

29. 牙周病发生的始动因素是

- A. 牙菌斑
- B. 牙石
- C. 白垢
- D. 食物嵌塞 E. 内分泌紊乱

正确答案：A

30. 妊娠期龈炎的直接病因是

- A. 妊娠
- B. 牙石
- C. 不良卫生习惯
- D. 牙菌斑 E. 不良修复体

正确答案：D

31. 截根术前必须进行

- A. 根管治疗
- B. 牙髓活力测定
- C. 口服抗生素
- D. 牙龈切除 E. 局部用药

正确答案：A

32. 下列哪一项不是根尖诱导成形术的适应证

- A. 牙髓病波及根髓的年轻恒牙
- B. 牙髓全部坏死的年轻恒牙
- C. 根尖周炎症的年轻恒牙
- D. 根近冠 1 / 3 折断的年轻恒牙 E. 深龋意外露髓的年轻恒牙

正确答案：E

33. 牙槽嵴纤维分布于
- A. 牙体的四周
 - B. 牙体的近远中侧
 - C. 牙体的唇侧
 - D. 牙体的唇舌侧 E. 牙体舌侧

正确答案：D

34. 下列何种情况不适宜制作金属烤瓷冠
- A. 四环素牙
 - B. 牙体缺损大，无法充填治疗
 - C. 青少年恒牙
 - D. 前牙错位 E. 釉质发育不全

正确答案：C

35. 在全冠修复时，不可能对牙龈造成危害的因素是
- A. 取印模
 - B. 牙体预备
 - C. 轴面外形
 - D. 邻面接触 E. 调改对颌牙

正确答案：E

36. 嵌体修复乳牙窝洞的优点，不正确的是
- A. 很好地恢复牙的解剖形态
 - B. 牙体制备时去除的牙体硬组织较充填法少
 - C. 修复体保持率高
 - D. 恢复理想的牙间接触点 E. 修复后继发龋少

正确答案：B

37. 目前控制菌斑最常用的方法是
- A. 刷牙
 - B. 牙线
 - C. 洁治
 - D. 药物含漱 E. 牙签

正确答案：A

38. 长期吸雪茄烟和用烟斗的人易发生
- A. 舌癌
 - B. 牙龈癌

- C. 颊黏膜癌
- D. 腭癌 E. 唇癌

正确答案：E

39. 最常见的口腔癌是

- A. 舌癌
- B. 牙龈癌
- C. 唇癌
- D. 颊癌 E. 口底癌

正确答案：A

40. “社区牙周指数”不包括

- A. 牙结石
- B. 牙龈出血
- C. 牙槽骨吸收
- D. 浅牙周袋 E. 深牙周袋

正确答案：C

41. 肝硬化患者肝功能减退的临床表现不包括

- A. 脾大
- B. 牙龈出血
- C. 黄疸
- D. 水肿 E. 肝掌

正确答案：D

42. 下列不是慢性龈缘炎自觉症状的是

- A. 刷牙或咬硬物时牙龈出血
- B. 牙龈局部发痒
- C. 牙龈经常出现自发性出血
- D. 牙龈肿胀感 E. 口腔异味

正确答案：C

43. 体位试验阳性的肿瘤是

- A. 血管瘤
- B. 牙龈瘤
- C. 成釉细胞瘤
- D. 角化囊肿 E. 神经鞘瘤

正确答案：A

44. 慢性坏死性龈炎的主要表现是

- A. 牙间乳头消失
- B. 牙龈增生
- C. 牙龈水肿
- D. 附着龈增生 E. 游离龈消失

正确答案：A

45. 下列哪一项不是药物性牙龈增生的发病特点

- A. 前牙区较重
- B. 牙龈增生常发生于全口牙龈
- C. 无牙区的牙龈增生更加严重
- D. 拔牙后增生的牙龈组织可以自行消退 E. 增生的牙龈表面可呈分叶状或桑葚状

正确答案：C

46. 对牙周预后影响较小的因素是

- A. 骨吸收程度
- B. 牙周袋深度
- C. 附着丧失程度
- D. 根分叉是否受累 E. 治疗过程中使用的药物类型

正确答案：E

47. 固定桥戴用后出现基牙松动，其正确处理方法是

- A. 先采取保守治疗，调颌以减轻基牙负担
- B. 牙周洁治
- C. 在固位体上钻孔，对松动基牙行根管治疗
- D. 拆除固定桥 E. 调磨天然牙以减轻咬合接触

正确答案：A

48. 选择固定桥基牙时不必考虑的因素是

- A. 牙槽骨
- B. 牙周膜
- C. 对侧牙的情况
- D. 根形态 E. 根长

正确答案：C

49. 根尖片上的骨硬板是

- A. 牙槽间隔的影像

- B. 牙周膜的影像
- C. 牙骨质的影像
- D. 牙槽嵴顶的影像 E. 牙槽窝内壁的影像

正确答案：E

50. 牙周病治疗的正确程序始于
- A. 基础治疗
 - B. 牙周手术治疗
 - C. 修复治疗
 - D. 松牙固定术 E. 牙周支持治疗

正确答案：A

51. 艾滋病患者的口腔可表现不包括
- A. 念珠菌病
 - B. 牙周炎
 - C. Kaposi 肉瘤
 - D. 韦格内肉芽肿 E. 非霍奇金淋巴瘤

正确答案：D

52. 以往牙周疾病流行病学资料少的重要原因是
- A. 缺乏明确的标准和指数
 - B. 牙周资料的可比性差
 - C. 牙周疾病流行病学研究少
 - D. 牙周资料的可靠性差 E. 缺乏牙周资料的收集和整理

正确答案：A

53. 恒切牙助萌术应在什么情况下施行
- A. 牙根弯曲
 - B. 牙轴方向异常
 - C. 额外牙阻碍
 - D. 囊肿阻碍 E. 增厚的龈片组织阻碍

正确答案：E

54. 与颌面部及颈部的发育关系密切的是
- A. 鳃弓、鳃沟
 - B. 咽囊、鳃弓、鳃沟
 - C. 鳃沟
 - D. 鳃沟、咽囊 E. 鳃弓、咽囊

正确答案：E

55. 红细胞增多常见于
- A. 糖尿病
 - B. 严重慢性心肺疾病
 - C. 支气管哮喘
 - D. 严重的组织损伤 E. 急性中毒

正确答案：B

56. 外渗性黏液囊肿常由下列哪项原因所致
- A. 外伤
 - B. 炎症
 - C. 过敏
 - D. 感染 E. 化学刺激

正确答案：A

57. 合理化机制是为摆脱痛苦而给自己找理由，是最常见的一种防御机制，表现为

- A. 酸葡萄机制
- B. 眼不见为净
- C. 此地无银三百两
- D. 鸵鸟策略 E. 做“白日梦”

正确答案：A

58. 可扪到静脉石的血管病变是
- A. 葡萄酒斑状毛细血管瘤
 - B. 杨梅样毛细血管瘤
 - C. 血管痣
 - D. 静脉畸形 E. 蔓状血管瘤

正确答案：D

59. 乙酰 CoA 的代谢去路不包括
- A. 合成脂肪酸
 - B. 氧化供能
 - C. 合成酮体
 - D. 合成胆固醇 E. 异生为糖

正确答案：E

60. 参加下颌侧方运动的咀嚼肌不包括

- A. 颞肌
- B. 咬肌
- C. 二腹肌
- D. 下颌舌骨肌 E. 颏舌骨肌

正确答案：C

61. 不能判断患牙是位于上颌还是下颌时，采用哪种辅助诊断手段

- A. 染色法
- B. 咬诊
- C. 透照法
- D. 选择性麻醉 E. 视诊

正确答案：D

62. 医疗机构药品的管理应遵守以下规定

- A. 购进药品，必须建立执行进货检查验收制度
- B. 药剂人员调配处方，必须经过核对，对方所列药品可代用
- C. 药剂人员对有配伍禁忌的处方，须经科室负责人签字后使用
- D. 药剂人员对超剂量处方应拒绝调配，必要时须经主治医师更正后调配
- E. 医疗机构的药品都应冷藏保管

正确答案：A

63. 以下哪点不属于三角瓣法 (Tennison)手术矫治单侧唇裂的缺点

- A. 三角瓣嵌入上唇下1/3，有损正常解剖形态
- B. 要切除部分正常的唇组织
- C. 定点明确，初学者易掌握
- D. 在不完全唇裂常可发生患侧过长的现象 E. 完全唇裂患侧唇高常显不足

正确答案：E

64. 下列关于恶性黑色素瘤的特点不正确的是

- A. 为扁平状凸起的肿块，表面常破溃，生长迅速
- B. 一般在皮内痣或黏膜黑斑的基础上发生
- C. 血行转移率高
- D. 常发生早期而广泛的淋巴结转移 E. 一般不宜行活组织检查

正确答案：B

65. 去除龈下结石属于社区人群牙周健康的哪一级水平

- A. 基本急诊保健
- B. 一级水平

- C. 二级水平
- D. 三级水平 E. 四级水平

正确答案：D

66. 残根缺损达龈下时，正确的处理方法是
- A. 抗感染后，直接在根上修复
 - B. 一律拔除
 - C. 残根根管治疗后，直接在根上修复
 - D. 不处理 E. 可考虑残根根管治疗后，使用正畸牵引至合适的位置后修复

正确答案：E

67. 疑似输血引起不良后果，需要对血液进行封存保留的，医疗机构应通知到场的是

- A. 提供该血液的采供血机构的人员
- B. 医疗机构输血科(库)负责人
- C. 患者或其家属的委托人
- D. 所在地卫生行政部门工作人员 E. 医患双方共同指定的公证人

正确答案：A

68. 能抑制脂肪动员的激素是
- A. 肾上腺素
 - B. 胰岛素
 - C. ACTH
 - D. 生长素 E. 胰高血糖素

正确答案：B

69. 根据《母婴保健法》，医疗保健机构可以开展以下活动，除了
- A. 婚前医学检查
 - B. 遗传病诊断
 - C. 非医学需要的胎儿性别鉴定
 - D. 施行结扎手术 E. 产前诊断

正确答案：C

70. 用下列哪种消毒剂浸泡的器械使用前需用灭菌蒸馏水冲洗
- A. 戊二醛
 - B. 乙醇
 - C. 碘伏
 - D. 甲醛溶液 E. 含氯消毒剂

正确答案：D

71. 全口义齿初戴时，常常需要选磨，以下哪个原因不正确
- A. 颌架不可能完全模拟人的下颌关节的各种运动
 - B. 义齿制作过程中的每一步均可能有误差
 - C. 人工牙颌面形态不一定符合要求
 - D. 初戴义齿可能下沉不均匀 E. 垂直距离一般过高

正确答案：E

72. 关于外科修整，以下说法中错误的是
- A. 会给患者带来精神和经济负担
 - B. 易造成承托面积减小
 - C. 对骨吸收速度没有明显影响
 - D. 与义齿能否成功恢复外形和功能有关 E. 有利于义齿的固位和稳定

正确答案：C

73. 下列哪项不是危重哮喘的表现
- A. 气急不能讲话
 - B. 意识模糊
 - C. 胸腹部矛盾呼吸
 - D. 两肺满布响亮哮鸣音 E. 奇脉

正确答案：E

74. 布莱克分类窝洞考虑的充填材料是
- A. 复合体
 - B. 银汞合金
 - C. 复合树脂
 - D. 磷酸锌粘固剂 E. 玻璃离子粘固剂

正确答案：B

75. 患牙有较大的穿髓孔并且根尖孔粗大，炎性牙髓组织呈息肉状经穿髓孔突出，探之不易出血。镜下见息肉由大量成纤维细胞和胶原纤维构成，伴散在的慢性炎细胞浸润，其表面被覆复层扁平上皮。该疾病是

- A. 慢性溃疡性牙髓炎
- B. 牙髓钙化
- C. 溃疡型慢性增生性牙髓炎
- D. 上皮型慢性增生性牙髓炎 E. 牙髓纤维性变

正确答案：D

76. 患牙遇冷热刺激痛，刺激去除后疼痛仍然持续一段时间，食物碎片嵌入龋洞时出现剧烈疼痛。镜下见患牙有较大穿髓孔，表面覆盖食物残渣和炎性渗出物，其下方为炎性肉芽组织和新生的胶原纤维，深部有活力牙髓组织表现为血管扩张及慢性炎细胞浸润，可见不规则钙化物沉积。该疾病是

- A. 急性化脓性牙髓炎
- B. 牙髓钙化
- C. 慢性增生型牙髓炎
- D. 慢性溃疡性牙髓炎 E. 牙髓坏死

正确答案：D

77. 患者，男，50岁。颊黏膜反复出现电击、针刺样疼痛，每次持续数十秒。其诊断首先考虑是

- A. 偏头痛
- B. 牙痛
- C. 三叉神经痛
- D. 颞下颌关节疾患 E. 舌咽神经痛

正确答案：C

78. 患者，女，37岁。主诉：左上后牙颊侧牙龈长一肿物6个月，并慢慢增大，影响进食。否认妊娠。临床检查见8654 | 4568颊侧牙龈一肿物，1cm×2cm大小，有蒂。x线片显示313牙周膜间隙增宽。最有可能的诊断是

- A. 慢性牙周炎
- B. 牙龈瘤
- C. 遗传性牙龈纤维瘤病
- D. 增生性龈炎 E. 药物性牙龈增生

正确答案：B

79. 患者，男，25岁。717牙折裂达龈下，断端与牙槽嵴顶平齐。如需全冠修复，应考虑

- A. 根向复位瓣术
- B. 牙龈切除术
- C. 改良Widman翻瓣术
- D. 骨成形术 E. 牙冠延长术

正确答案：E

80. 患者，女，41岁。右下颌磨牙区膨大1年。X线片见不规则透射区并含大小不等的不透光区。肉眼观察肿物呈实性，镜下肿瘤由片状或岛状多边形上

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/185110223010011111>