

# 心血管专科护士理论知识考核

## 一、选择题

(1).室性早搏的心电图表现下列哪项错误： ( ) [单选题] \*

- A . 异位起搏点在房室交界区✓
- B . QRS 波前无 P 波
- C . QRS 波形态异常
- D . T 波与主波方向相反
- E . 有完全性代偿间歇

(2).下列哪项不是严重心律失常先兆： ( ) [单选题] \*

- A . 室性早搏出现在前一搏动的 T 波上
- B . 频发性室性早搏 > 5 次 min
- C . 多源性室性早搏
- D . 室性早搏呈二联律
- E . 窦性心动过速✓

(3).电极复律前正确的准备措施是：( ) [单选题] \*

- A . 停药洋地黄 2 - 3 天✓
- B . 禁食 4h , 排空大小便
- C . 褥垫保证松软无硬物
- D . 暂时拔除吸氧导管
- E . 忌用镇静剂

(4).慢性风心病最常见的瓣膜病变范围：( ) [单选题] \*

- A . 单纯二尖瓣✓
- B . 二尖瓣合并主动脉瓣
- C . 单纯主动脉瓣
- D . 主动脉瓣合并肺动脉瓣
- E . 肺动脉瓣合并三尖瓣

(5).下列哪种疾病引起右心室后负荷增加： ( ) [单选题] \*

- A . 主动脉瓣关闭不全
- B . 阻塞性肺气肿✓
- C . 三尖瓣关闭不全
- D . 房间隔缺损
- E . 贫血性心脏病

(6).急性肺水肿特征性表现是： ( ) [单选题] \*

- A . 端坐呼吸
- B . 闻哮鸣音
- C . 严重气急
- D . 咳粉红色泡沫痰✓
- E . 口唇青紫伴大汗

(7).治疗心功能不全时，洋地黄化的临床意义在于：( ) [单选题] \*

- A . 加强心肌收缩力✓
- B . 减慢心率和传导
- C . 维持心脏最有效的排血量

D . 加强利尿

E . 改善内脏瘀血情况

(8).成人窦性频率超过多少为窦性心动过速 : ( ) [单选题] \*

A . 120 次 / min

B . 100 次 / min ✓

C . 80 次 / min

D . 160 次 / mn

E . 180 次 / min

(9).引起左室后负荷增加的主要因素是 : ( ) [单选题] \*

A . 肺循环高压

B . 体循环高压 ✓

C . 主动脉瓣关闭不全

D . 血容量增加

E . 左向右分流的先天性心脏病

(10).下列哪项符合高血压的治疗原则 : ( ) [单选题] \*

A . 联合用药 , 达到降压目的后停药

B . 症状不重者 , 不宜用降压药

C . 联合用药 , 达到降压目的后短期服用维持量

D . 联合用药 , 达到降压目的后长期服用维持量 ✓

E . 间断用药 , 避免产生抗药性

(11).心电监护发现以下情况需准备急救处理 , 哪项除外 : ( ) [单选题] \*

A . 持久性心房颤动 ✓

- B . 反复短阵性室速
- C . 三度房室传导阻滞
- D . 多源性室早呈二联律
- E . 室性早搏 Ron - T 现象

(12).房颤发生后易引起哪种合并症： ( ) [单选题] \*

- A . 严重心力衰竭
- B . 心源性休克
- C . 体循环动脉栓塞√
- D . 神志模糊、抽搐
- E . 肺内感染

(13).给急性肺水肿患者吸氧，氧流量最好为： ( ) [单选题] \*

- A . 1-2L/min
- B . 2-3L/min
- C . 3-4L/min
- D . 4-6L/min
- E . 6-8L/min√

(14).急性心肌梗死早期最重要的治疗是： ( ) [单选题] \*

- A . 绝对卧床休息，吸氧，避免过度紧张和焦虑√
- B . 低分子右旋糖酐
- C . 极化液治疗
- D . 能量合剂
- E . 洋地黄

(15).下列各项中不属洋地黄中毒表现的是：（ ）[单选题] \*

- A . 心动过速
- B . 心动过缓
- C . 心律不齐
- D . 视力模糊
- E . 震颤抽搐✓

(16).急性心肌梗死发生心律失常的处理，下列哪组不正确：（ ）[单选题] \*

- A . 室性早搏——利多卡因
- B . 室颤——非同步直流电除颤
- C . 阵发室速——洋地黄✓
- D . 窦性心动过缓——阿托品
- E . 三度房室传导阻滞——安装心脏起搏器

(17).治疗急性肺水肿不当的是：（ ）[单选题] \*

- A . 取坐位两腿下垂
- B . 口服地高辛✓
- C . 高流量吸氧
- D . 静注氨茶碱
- E . 皮下注射吗啡

(18).广泛前壁心肌梗死特征性的心电图改变应见于：（ ）[单选题] \*

- A . V1 \_ V3
- B . V3 - V5
- C . V5、I、 aVL

D . V1 - V5✓

E . II、III、aVF

(19).在急性心肌梗死的辅助检查中，哪项不支持急性心肌梗死的诊断：（ ）[单选题] \*

A . 心电图出现病理性 Q 波

B . 嗜酸性粒细胞显著增高✓

C . 红细胞沉降率加速

D . 乳酸脱氢酶增高

E . 肌酸磷酸激酶增高

(20).鉴别心绞痛和心肌梗死最有意义的是：（ ）[单选题] \*

A . 疼痛的轻重

B . 疼痛时间的长短

C . 有无诱因

D . 心电图有无病理性 Q 波✓

E . 心电图有无 T 波倒置

(21).急性心肌梗死在监护中发现哪种情况应作紧急处理：（ ）[单选题] \*

A . 室性早搏每分钟 3 次

B . 窦性心律不齐

C . 心房颤动

D . 一度房室传导阻滞

E . 室性早搏出现在前一搏动的 T 波上✓

(22).急性前间壁心肌梗死的心电图改变出现在：（ ）[单选题] \*

A . II、III、aVF

B . V1、 V2、 V3✓

C . V1-V6

D . V5、 V6

E . V3、 V4、 V5

(23).高血压病分期标准，最主要的依据是：( ) [单选题] \*

A . 病程长短

B . 血压增高程度✓

C . 症状轻重

D . 心、脑、肾损伤及功能代偿情况

E . 血压能否降至正常

(24).左心功能不全最严重的表现是：( ) [单选题] \*

A . 心悸、气短

B . 咳嗽、咳痰增多

C . 肺水肿✓

D . 夜间阵发性呼吸困难

E . 心律失常

(25).二尖瓣狭窄早期大咳血的原因是： ( ) [单选题] \*

A . 支气管部膜微血管破裂✓

B . 肺水肿

C . 支气管静脉破裂

D . 合并肺炎

E . 肺栓塞

(26).诊断急性心肌梗死特异性最高的血清酶是： ( ) [单选题] \*

- A . 天冬氨酸氨基转移酶 ( AST )
- B . 肌钙蛋白 I(cTnT)或 T ( cTnT ) ✓
- C . 乳酸脱氢酶同工酶 ( LDH1 )
- D . 肌酸激酶 ( CK )
- E . 丙氨酸氨基转移酶

(27).洋地黄中毒常见的心电图表现是：( ) [单选题] \*

- A . Q - T 间期缩短
- B . 心电图 AT-T 鱼钩状改变
- C . 窦性心动过缓
- D . 三度房室传导阻滞
- E . 室性早搏二联律 ✓

.引起右心室前负荷增加的疾病： ( ) [单选题] \*

- A . 主动脉瓣关闭不全
- B . 二尖瓣狭窄
- C . 三尖瓣关闭不全 ✓
- D . 房间隔缺损
- E . 阻塞性肺气肿

(29).下列哪项应慎用洋地黄： ( ) [单选题] \*

- A . 房室传导阻滞 ✓
- B . 充血性心力衰竭
- C . 室上性心动过速



- D . 心率快的心房颤动
- E . 二尖瓣狭窄并关闭不全

(30).急性心肌梗死患者应避免排使用力，其目的主要是防止：( ) [单选题] \*

- A . 用力过度引起虚脱
- B . 腹压加剧导致呕吐
- C . 血压陡升致脑溢血
- D . 诱发心律失常致猝死✓
- E . 血流加速引起脑栓塞的 .

(31).急性心肌梗死发病 3 天的患者，在饮食上应注意：( ) [单选题] \*

- A . 少食多餐✓
- B . 按病人要求配餐
- C . 少量流质饮食，每日 2 次
- D . 多吃鸡蛋
- E . 禁食

(32).男性，65 岁，冠心病患者，重度体力活动时，有心悸、气短，可诊断为：( ) [单选题] \*

- A . 心功能 I 级✓
- B . 心功能 II 级
- C . 心功能 III 级
- D . 心功能 IV 级
- E . 以上都不是

(33).给患者投用洋地黄类药物前，护士应先测量： ( ) [单选题] \*

- A . 体温

B . 脉搏✓

C . 呼吸

D . 血压

E . 体重

(34).二尖瓣狭窄时血液动力学改变首先引起： ( ) [单选题] \*

A . 左心房肥大✓

B . 左心室肥大

C . 右心室肥大

D . 肺动脉扩张

E . 肺瘀血

(35).下列哪项属于心功能二级： ( ) [单选题] \*

A . 体力活动轻度受限，较重活动出现症状✓

B . 端坐呼吸

C . 体力活动明显受限，较轻活动出现症状

D . 休息时亦有呼吸困难

E . 体力活动不受限

(36).在心电图上，一度房室传导阻滞与其他较严重的房室传导阻滞间最根本区别是：( ) [单选题] \*

A . PR 间期延长

B . 心室律不整齐

C . 心率大于 40 次/min

D . QRS 波无脱漏✓

E . S - T 段和 T 波变化

(37).高血压脑病指的是：（ ）[单选题] \*

- A . 血压过高引起的头痛
- B . 脑血管破裂出血
- C . 脑血栓形成
- D . 普遍而剧烈的脑血管痉挛引起脑水肿√
- E . 肢体偏瘫，失语不可恢复

(38).预防风心病加重的根本措施是：（ ）[单选题] \*

- A . 积极治疗心衰
- B . 积极锻炼身体
- C . 清淡饮食
- D . 预防和治疗链球菌感染√
- E . 以上均不是

(39).心衰病人的护理，下列哪项是错误的：（D[单选题] \*

- A . 根据心功能情况决定休息时间和方式√
- B . 给予低盐易消化饮食
- C . 保持大便通畅，嘱患者勿用力大便
- D . 严重左心衰竭者，应立即取平卧位休息
- E . 控制静脉补液速度

(40).血压突然升高、剧烈头痛、抽搐、昏迷的患者，诊断属下列哪项。（ ）[单选题] \*

- A . 高血压病一期
- B . 高血压病二期
- C . 高血压病三期

D . 急进型高血压

E . 高血压脑病✓

(41).心力衰竭患者的饮食，下列哪项不妥：( ) [单选题] \*

A . 适当限制钠盐

B . 高热量✓

C . 少量多餐

D . 补充富含钾、镁的食物

E . 需摄入合适量纤维素的食物

(42).高血压危象紧急处理的关键是： ( ) [单选题] \*

A . 绝对卧床休息

B . 降低颅内压

C . 迅速降低血压✓

D . 给予氧气吸入

E . 限制钠盐摄入

(43).心绞痛发作时不出现下列哪项心电图改变：( ) [单选题] \*

A . ST 段降低 > 0.05mV

B . T 波平坦、双相或倒置

C . ST 段降低，伴 T 波倒置

D . QRS 波群 > 0.12s✓

E . ST 段抬高，伴 T 波倒置

(44).长期卧床的心力衰竭病人，其水肿最易出现的部位是：( ) [单选题] \*

A . 胫前

B . 踝部

C . 腹部

D . 腰骶部✓

E . 眼睑

(45).左心功能不全病人出现呼吸困难的主要原因是：（ ）[单选题] \*

A . 痰液堵塞气道

B . 支气管痉挛

C . 左肺受到扩大的心脏的压迫

D . 肺循环瘀血✓

E . 神经反应

(46).由于心排血量突然下降出现的晕厥称为：（ ）[单选题] \*

A . 预激综合征

B . 病窦综合征

C . 休克

D . 抽搐

E . 阿-斯综合征✓

(47).动脉血管又称为：（ ）[单选题] \*

A . 功能血管

B . 阻力血管✓

C . 容量血管

D . 运能血管

E . 以上都不是

(48).循环系统的功能一般不包括：（ ）[单选题] \*

- A . 内分泌功能
- B . 运输血液
- C . 保持新陈代谢正常进行
- D . 维持和调节血压
- E . 调节酸碱平衡✓

(49).不属于循环系统疾病常见症状的表现是：（ ）[单选题] \*

- A . 呼吸困难
- B . 发热✓
- C . 心悸
- D . 下肢水肿
- E . 心前区疼痛

(50).与心源性水肿的特征不符合的一项是：（ ）[单选题] \*

- A . 多见于右心衰竭
- B . 早期局限于身体低垂部位
- C . 常在活动后加重
- D . 严重病人有胸腔积液、腹水
- E . 水肿迅速✓

(51).从左心衰竭发展到全心衰竭时，可减轻的表现是：（ ）[单选题] \*

- A . 发绀
- B . 呼吸困难✓
- C . 颈静脉怒张

D . 下肢水肿

E . 肝肿大

(52).护士给病人服用地高辛前应先测量： ( ) [单选题] \*

A . 体温

B . 脉搏✓

C . 血压

D . 呼吸

E . 尿量

(53).左心室后负荷增加常见于 ( ) [单选题] \*

A . 回心血量增加

B . 肺动脉高压

C . 血容量不足

D . 严重贫血

E . 循环阻力过高✓

(54).右心室后负荷增加常见于 ( ) [单选题] \*

A . 房间隔缺损

B . 贫血

C . 肺动脉瓣狭窄✓

D . 室间隔缺损

E . 二尖瓣狭窄

(55).直接引起左心后负荷加重的瓣膜病变是 ( ) [单选题] \*

A . 主动脉瓣狭窄✓

B . 主动脉瓣关闭不全

C . 二尖瓣狭窄

D . 肺动脉瓣狭窄

E . 二尖瓣关闭不全

(56).肝颈静脉返流征阳性见于 ( ) [单选题] \*

A . 肺气肿

B . 肝硬化

C . 右心肥大

D . 右心功能不全 ✓

E . 左心功能不全

(57).左心衰竭的早期临床表现是 ( ) [单选题] \*

A . 水肿

B . 呼吸困难 ✓

C . 紫绀

D . 乏力

E . 咯铁锈色痰

(58).护士在发给心衰患者地高辛之前，应先数心率，若心率少于多少次则不能给药 ( ) [单选题] \*

A . 100 次 / min

B . 90 次 / min

C . 80 次 / min

D . 70 次 / min

E . 60 次 / min ✓



(59).下列哪项是洋地黄中毒最常见的临床 ( ) [单选题] \*

- A . 恶心、呕吐
- B . 室早二联律✓
- C . Q—T 间期缩短
- D . 出现奔马律
- E . 黄视、绿视

(60).右心功能不全时，出现腹水主要是由于 ( ) [单选题] \*

- A . 体循环静脉压明显增高✓
- B . 瘀血性肝硬化
- C . 血容量增多
- D . 血浆白蛋白明显降低
- E . 毛细血管通透性明显升高

(61).洋地黄中毒时不宜用钾盐治疗的心律失常是 ( ) [单选题] \*

- A . 房性期前收缩
- B . 心房颤动
- C . 室性期前收缩
- D . 三度房室传导阻滞✓
- E . 室上性阵发性心动过速

(62).频发期前收缩是指期前收缩的次数每分钟至少出现 ( ) [单选题] \*

- A . 3 次以上
- B . 5 次以上✓
- C . 8 次以上

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/186004104144010045>