

# 2021-2022 年江苏省南通市全科医学（中级）专业知识

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(30 题)

1.女，19 岁。发热、贫血 12 天，肝脾淋巴结肿大，胸骨有压痛，血红蛋白 60g/L，白细胞  $40 \times 10^9/L$ ，血小板  $60 \times 10^9/L$ ，首先考虑

A.病毒感 染 B.风湿热 C.急性白血病 D.慢性粒细胞性白血病 E.系统性红斑狼疮

2.股骨颈骨折最常见的并发症是

A.神经损伤 B.内翻位愈合 C.骨折不愈合 D.动脉损伤 E.骨筋膜室综合征

3.女，29 岁，咳嗽、黄痰，黏稠伴高热(体温  $39^{\circ}C$ )，周身不适 2 天，曾肌注氟美松及抗感冒剂，热退，第 4 天右胸吸气性疼痛，体温升至  $39.5^{\circ}C$ ，顿咳，痰有异味，X 线胸片：右下肺高密度片状影  
最先印象疾病是

A.肺结核 B.右下肺炎 C.肺化脓症 D.恶性肿瘤 E.肺隔离症

# 2021-2022 年江苏省南通市全科医学（中级）专业知识

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(30 题)

1.女，19 岁。发热、贫血 12 天，肝脾淋巴结肿大，胸骨有压痛，血红蛋白 60g/L，白细胞  $40 \times 10^9/L$ ，血小板  $60 \times 10^9/L$ ，首先考虑

A.病毒感 染 B.风湿热 C.急性白血病 D.慢性粒细胞性白血病 E.系统性红斑狼疮

2.股骨颈骨折最常见的并发症是

A.神经损伤 B.内翻位愈合 C.骨折不愈合 D.动脉损伤 E.骨筋膜室综合征

3.女，29 岁，咳嗽、黄痰，黏稠伴高热(体温  $39^{\circ}C$ )，周身不适 2 天，曾肌注氟美松及抗感冒剂，热退，第 4 天右胸吸气性疼痛，体温升至  $39.5^{\circ}C$ ，顿咳，痰有异味，X 线胸片：右下肺高密度片状影  
最先印象疾病是

A.肺结核 B.右下肺炎 C.肺化脓症 D.恶性肿瘤 E.肺隔离症

4.男性患者，28岁，反复上腹正中疼痛，进食后疼痛缓解，4小时前突发全腹剧烈疼痛。查体：全腹肌紧张，压痛及反跳痛。下述哪项支持消化性溃疡合并穿孔的诊断

A.腹痛前饮酒 B.腹痛部位不固定 C.腹痛伴肝浊音界缩小或消失 D.腹痛伴黄疸 E.腹部受外部暴力

5.肥厚型梗阻性心肌病时宜选择的治疗药物为

A.胺碘酮 B.洋地黄 C.阿托品 D.利多卡因 E.地尔硫革（硫氮革酮）

6.下列哪种呕吐为反射性呕吐

A.急性胆囊炎 B.抗癌药物 C.晕动病 D.癔症 E.脑出血

7.一名25岁男性患者出现右侧睾丸无痛性肿胀 到社区卫生服务中心就诊。他感觉睾丸实际上是每日逐渐长大的。他的最后一次性活动是6个月前，没有尿路症状，体检发现右侧睾丸大，无触痛，不透光。附睾外表正常，没有触痛。以下哪项是最合适的

- A.转诊行经阴囊穿刺活检
- B.转诊到上级医院进行超声检查，并请专科医生会诊
- C.告知患者在未来数天射精多次
- D.适当的抗生素治疗2周
- E.6个月后重新检查

8.男性·27

岁。近一周来自觉发热，腰痛、尿呈浓茶色。查体：巩膜黄染、睑结膜略苍白，心肺听诊正常，腹软无压痛，肝脾未触及。实验室检查：血清非结合胆红素明显增加，尿胆红素阴性。最可能的诊断为

- A.自身免疫性溶血性贫血
- B.急性肝炎
- C.胆总管结石
- D.Gilbert 综合征
- E.肝内胆汁淤积

9.一位类风湿关节炎患者，在社区就诊时主诉右肘关节伸侧长了一个蚕豆大小的结节约 4 个月，医生检查完后告诉她，这个结节说明

- A.病情活动已持续 4 个月
- B.病情目前并不活动
- C.曾有病情活动，目前是否活动应依据其他表现来判断
- D.曾有病情活动
- E.目前有病情活动

10.有关 2 型糖尿病，下列哪项概念是错误的

- A.存在胰岛素受体缺陷
- B.存在靶细胞膜上葡萄糖运转体的缺陷
- C.存在胰岛素抵抗
- D.存在脂代谢紊乱
- E.胰岛素水平很低，谷氨酸脱羧酶抗体(GAD)多为阳性

11.高血压合并双肾动脉狭窄应慎用

A.双氢克尿噻 B.美托洛尔 C.洛汀新 D.氨氯地平 E.哌唑嗪

12.根据上述血气分析结果，本例应属于下列哪项酸碱平衡失调

A.A.呼吸性酸中毒+代谢性碱中毒

B.代谢性酸中毒+呼吸性碱中毒

C.呼吸性酸中毒代偿

D.呼吸性酸中毒失代偿

E.代谢性碱中毒

13.咳铁锈色痰应考虑

A.肺炎球菌肺炎 B.支气管扩张 C.肺结核 D.肺脓肿 E.尘肺

14.不良反应会出现口干、口中金属味的药物是()。

A.甲硝唑 B.肠虫清 C.吡喹酮 D.氯硝柳胺

15.一般排泄性尿路造影检查不能显示的是()。

A.肾盂积水和输尿管扩张 B.肾盂受压、拉长变形 C.肾盂及输尿管的充盈缺损 D.分肾功能状态 E.膀胱尿液的输尿管反流

16.基本定为 SARS 病例，但尚无病原学依据者

A.进入正常诊断程序

B.可采用居家隔离观察并随诊的形式

C.留院观察，收入单人观察室

D.收至 SARS 定点医院，但为避免其中少数非 SARS

者被交叉感染，需置单人病房

E.收至 SARS 定点医院，可置多人病房

17.关于结核菌，下列哪项是错误的

A.生长快，抵抗力强 B.在干燥痰中可存活 6~8 个月 C.对湿热敏感

D.60°C经半小时即可被杀死 E.煮沸 5 分钟被杀灭

18.诊断急性肾盂肾炎的最重要依据是清洁中段尿细菌培养菌落计数

A.A. > 10<sup>3</sup>/ml B. > 10<sup>5</sup>/ml C. > 2×10<sup>5</sup>/ml D. > 5×10<sup>5</sup>/ml E. > 10×10<sup>5</sup>/ml

19.以下哪项不是大咯血窒息的临床表现

A.剧烈胸痛 B.唇、面发绀 C.三凹征 D.烦躁不安，甚至昏迷 E.呼吸音减弱或消失

20.哪个部位的急性心肌梗死最易发生房室传导阻滞

A.前壁心肌梗死 B.后壁心肌梗死 C.侧壁心肌梗死 D.下壁心肌梗死 E.左房心肌梗死

21.在类风湿关节炎中，最常受累关节是

A.脊柱关节 B.髌关节 C.膝关节 D.远端指间关节 E.近端指间关节

22.男性，38岁，发热38~39.5℃，疲倦、盗汗伴咳嗽、少量痰半个月。既往体健。肺部体检：右上实变体征伴两下肺散在湿性啰音  
最合适的首选检查是

A.血常规 B.胸部CT C.血培养 D.胸部X线摄片 E.痰涂片革兰染色

23.判断慢性肾盂肾炎治愈的最主要指标是

A.尿常规正常 B.尿细菌培养阴性 C.尿路刺激征消失 D.肾功能好转  
E.肾区叩击痛消失

24.复方碘溶液可

A.抑制甲状腺激素合成 B.抑制甲状腺激素释放 C.抑制甲状腺激素外周作用  
D.抑制5'脱碘酶 E.破坏甲状腺组织细胞

25.昏迷患者的损害部位是

A.意识内容 B.网状激活系统 C.脑干 D.丘脑 E.大脑

26.成人型多囊肾行肾切除的指征不包括

A.患肾巨大 B.难以控制的严重血尿 C.难以控制肾脏反复感染 D.伴有肾脏肿瘤  
E.行肾移植手术的同时可切除移植侧巨大的肾脏

27.脑出血急性期血压在什么范围内应使用降压治疗

A.收缩压 $\geq$ 140mmHg，或舒张压 $\geq$ 90mmHg



- B.收缩压 $\geq 160$ mmHg，或舒张压 $\geq 95$ mmHg
- C.收缩压 $\geq 180$ mmHg，或舒张压 $\geq 105$ mmHg
- D.收缩压 $\geq 200$ mmHg，或舒张压 $\geq 110$ mmHg
- E.收缩压 $\geq 220$ mmHg，或舒张压 $\geq 120$ mmHg

28.关于风湿性疾病的临床特点，下列哪项不正确

- A.病程多呈慢性经过
- B.临床表现差异很大
- C.反复发作与缓解交替出现
- D.对治疗反应的个体差异不大
- E.免疫学异常表现复杂

29.心肺复苏的治疗药物中，阿托品的适应证为( )

- A.心脏停搏或无脉电活动的患者
- B.有症状的缓慢性心律失常
- C.快速型室性心律失常
- D.快速型室性及室上性心律失常

30.下列哪项治疗措施对急性肾小球肾炎活动期最为合适

- A.休息和控制感染
- B.低蛋白饮食
- C.透析疗法
- D.强的松
- E.消炎痛

## 二、专业知识(10 题)

31.患者自诉左侧胸痛，沿肋间神经走行分布，伴有局部压痛，应诊断为

- A.急性心肌梗死
- B.肋间神经炎
- C.自发性气胸
- D.肺癌
- E.胸主动脉瘤

32.男性，33 岁，诊断为急性肺脓肿，下列哪项是不正确的

- A.大多以厌氧菌为主的混合感染

B.病后 10 天可咳出大量脓臭痰

- C.痰一般细菌培养不易生长
- D.脓肿好发右上叶后段和两下叶背段
- E.X 线可见空洞，其内壁凹凸不平，为偏心性

33.诊断变异型心绞痛，下述哪项是错误的

- A.安静时可以发病
- B.发作时心电图 ST 段明显压低
- C.每天可在同一时间发病
- D.疼痛时间延长
- E.发作时可有室性期前收缩

34.关于血液透析的适应证错误的是

- A.急性肺水肿
- B.血 BUN $>19 \cdot 4$ mmol / L
- C.血 BUN 每日上升 30mmol / L 以上
- D.CO<sub>2</sub> CP 低于 13mmol / L，pH $\leq 7 \cdot 25$
- E.无尿 2 天以上

35.男性，37 岁，近 1 个月来经常排鲜血便，血量少不与粪便混合，伴里急后重，不发热，无腹痛，最可能的诊断是

- A.直肠癌
- B.急性坏死性肠炎
- C.胃癌
- D.肠结核
- E.Crohn 病

36.女，30 岁。低热伴关节肿痛 3 个月，轻度贫血，抗核抗体(+)，抗双链 DNA 抗体(+)，疑患系统性红斑狼疮，治疗首选的药物是

- A.非甾体抗炎药
- B.糖皮质激素
- C.免疫抑制剂
- D.抗生素
- E.

柳氮磺胺吡啶

37.消化性溃疡病理损伤至少达

A.黏膜层 B.黏膜下层 C.黏膜肌层 D.肌层 E.浆膜层

38.上述患者最可能的诊断是

A.自发性气胸 B.胸膜炎 C.急性心肌梗死 D.消化性溃疡穿孔 E.急性肠梗阻

39.最易发生幽门梗阻症状的溃疡是

A.胃角溃疡 B.胃窦溃疡 C.球后溃疡 D.胃多发性溃疡 E.幽门管溃疡

40.蛛网膜下腔出血最常见的病因是

A.脑外伤 B.出血性疾病 C.抗凝治疗 D.脑血管畸形 E.腰椎穿刺损伤

三、共用题干单选题(5题)

41.入院后进一步检查

A.近红外线扫描 B.钼靶摄片 C.B超 D.冰冻切片 E.切取活检

42.该患者暂不宜立即使用

A.西地兰 B.卡维地洛 C.硝普钠 D.硝酸甘油 E.呋塞米

43.该值班医生在治疗休克时应用最多的液体可能是

A.全血 B.低分子右旋糖酐 C.10%葡萄糖液 D.0.9%氯化钠 E.平衡盐液

44.该患者在治疗过程中出现休克，心电图提示 V3R、V4R、V5R 导联 ST 段抬高，应考虑

A.失血性休克 B.感染性休克 C.心源性休克 D.低血容量性休克 E.心律失常引起休克

45.(题干)患者，男，20 岁。因“反复发热 1 周，牙龈出血 2 天”入院。

查体：体温 40℃，胸骨压痛(+)，全身浅表淋巴结及肝脾未触及。血

象：血红蛋白

**白 70g/L, 白细胞  $43.0 \times 10^9/L$ , 血小板  $38 \times 10^9/L$ ;骨髓象检查后考虑为急性白血病。**

该病例发热原因最可能的诊断是

A.真菌感染 B.病毒感染 C.细菌感染 D.白血病细胞高代谢引起 E.药物热

参考答案

1.C

急性白血病的临床表现可有发热、贫血、出血，组织浸润的表现可有肝、脾及淋巴结肿大，骨、关节疼痛，头痛、呕吐、颈项强直等脑膜炎或中枢神经系统症状，口腔黏膜浸润可致牙龈肿胀、口腔溃疡，皮肤受累较少见。患者符合上述表现。

2.C

### 3.C

C。根据患者急性发作的高热、咳嗽、咳黏液脓臭痰，X线胸片示右下肺高密度片状影。首先应考虑 C。

4.C 根据患者的病史、症状、体征考虑为消化性溃疡穿孔，腹痛伴肝浊音界缩小或消失支持此诊断。

### 5.E

6.A 由于器官或组织有病理改变或受到刺激，经神经反射而引起的呕吐为反射性呕吐，如急性胆囊炎。

7.B 这个病例是一个典型的睾丸癌。如果怀疑附睾炎，抗生素将是适当的治疗，但病史和体格检查不支持此诊断。性活动减少所产生的睾丸充血，可出现压痛和肿胀的睾丸，但是无痛快速增长的睾丸，直到证明并非如此之前，都应该考虑是癌症。经阴囊活检的方法是禁忌，因为有把癌播散到另一个淋巴结系统的风险。阴囊皮肤和睾丸有着不同的淋巴流出通道。从胚胎学上来说，睾丸原先是在腹部，后通过腹股沟管下降到阴囊，其次是它的血管系统、淋巴流出管道和神经也经此道下行。随诊观察不适合这个患者。

8.A 自身免疫性溶血性贫血发作期间可见发热、寒战、头痛、腰背酸痛、呕吐及血红蛋白尿(尿呈酱油色)，严重的可有急性肾衰竭。血清胆红素升高，以非结合胆红素为主，结合胆红素基本正常，尿胆原增加，尿胆红素(-)，尿血红蛋白(+)

### 9.D

### 10.E

11.C 高血压合并双肾动脉狭窄应慎用 ACEI 类药物，因为 ACEI

降低血压，使肾小球滤过率进一步降低，特别是存在肾动脉狭窄的患者，能使肾功能恶化，洛汀新属于 ACEI 类降压药，应慎用。

#### 12.D

患者有低氧血症、高碳酸血症，pH 值下降，提示有呼吸性酸中毒，失代偿。

13.A 肺炎球菌肺炎典型的痰液为铁锈色痰，因痰中含有红细胞破坏、崩解而来的含铁血黄素，使痰液呈铁锈色，故称为铁锈色痰。出现此痰对肺炎链球菌性大叶肺炎有诊断意义。

#### 14.A

15.E 排泄性尿路造影（静脉肾盂造影）能反映肾脏的结构变化和功能状态。静脉注射造影剂，经尿路排泄，但是不能显示膀胱向输尿管反流的影像。要了解膀胱向输尿管是否有反流，应该放置尿管，注入造影剂，并让患者做排尿动作，观察膀胱内的造影剂是否向输尿管内反流。

16.D①不是 SARS 者：可以排除 SARS 诊断，进入正常诊断程序。②不像 SARS 者：不像 SARS 但尚不能绝对排除者，应安排医学隔离观察，可采用居家隔离观察并随诊的形式。③疑似 SARS 者：综合判断与 SARS 有较多吻合处，但尚不能作出临床诊断者，应留院观察，收入单人观察室。④临床诊断者：基本定为 SARS 病例，但尚无病原学依据者，应收至 SARS 定点医院，但为避免其中少数非 SARS 者被交叉感染，需置单人病房。⑤确定诊断者：临床诊断基础上有病原学依据者，应收至 SARS 定点医院，可置多人病房。

17.A 结核菌生长缓慢。

#### 18.B

B. 诊断急性肾盂肾炎的最重要依据是清洁中段尿细菌培养菌落计数  $> 10^5/\text{ml}$ 。

19.A 大咯血窒息临床表现主要因大气道阻塞引起机体缺氧，可表现出胸闷、气促、三凹征及神志改变，少有剧烈胸痛。

20.D 下壁心肌梗死累及房室结、房室束等心传导系统，易发生房室传导阻滞。

21.E 类风湿关节炎可侵犯周围小关节和大关节，但以近端指间关节、掌指关节、腕关节及足关节最常见，其次为肘、肩、踝、膝、颈、颞颌及髋关节。远端指间关节和脊柱关节（颈椎除外）极少受累。

22.D

对于有咳嗽、咳痰、发热呼吸道症状，肺部有异常体征者，应首选 X 线胸片筛查。

23.B

尿路感染的诊断、复发、痊愈的主要确立指标是尿细菌学检查。

24.B 复方碘溶液主要用于术前准备及抢救甲亢危象，抑制甲状腺激素释放，故选答案 B。

25.B 意识的“开关”系统包括经典的感觉传导径路及脑干网状结构，“开关”系统不同部位与不同程度的损害，可发生不同程度的意识障碍。

26.A



成人型多囊肾手术切除肾脏要非常慎重，一般尽量不行手术切除。除非出现难以控制的出血、感染和恶性变等情况，巨大的多囊肾不是手术切除的指征。但是行肾移植手术时由于巨大多囊肾的存在，移植肾难以放入髂窝内，因此在肾移植的同时可行切除移植侧巨大的肾脏。

27.C 脑出血后血压升高是对颅内压增高情况下为保持相对稳定的脑血流量的脑血管自动调节反应，通常可不用降压药。收缩压 180 ~ 230mmHg，或舒张压 105 ~ 140mmHg，宜口服降压药治疗，使血压维持在略高于发病前水平；收缩压 180mmHg 以内，或舒张压 105mmHg 以内，可观察而不用降压药。

28.D 风湿性疾病是一组以内科治疗为主的肌肉骨骼系统疾病，其特点为病程多呈慢性经过，临床表现差异大，反复发作与缓解交替出现，多种疾病有复杂的免疫学异常，同一疾病的不同个体对治疗的反应有很大差异。

29.B

30.A

31.B 肋间神经炎所致的胸痛特点是疼痛沿肋间神经走行，局部有压痛。

32.E 肺脓肿 X 线显示脓腔内壁光整或略有不规则。

33.B 变异型心绞痛发作时有短暂的 ST 段抬高的特异性心电图变化。除 B 项外，其余各项均是变异型心绞痛的临床特点。

34.B 急性肾功能衰竭透析疗法的适应证是：①急性肺水肿。②高钾血症，血钾在 6.5mmol / L 以上。③血尿素氮 21.4retool / L 以上或血肌酐 442,umol / L 以上。④高分解代谢状态，血尿素氮每日上升 30mmol / L 以上，血钾每日上升 1mmol / L 以上。⑤无明显高分解代谢，但无尿 2

天以上或少尿 4 天以上。⑥酸中毒，二氧化碳结合力低于  $13\text{mmol/L}$ ，  
pH 小于或等于 7.25。⑦少尿 2

天以上，伴有下列情况任何一项者：体液潴留，如眼结膜水肿、心脏奔马律、中心静脉压增高；尿毒症症状，如持续呕吐、烦躁、嗜睡；高血钾，血钾 $>6.0\text{mmol/L}$ ，心电图有高钾改变。

35.A 所列 5 个选项中，仅直肠癌可表现血便、里急后重。

36.B 糖皮质激素目前仍是治疗 SLE 最常用、最有效的药物，适用于急性暴发型狼疮和(或)有重要脏器如肾脏、中枢神经、心肺和有溶血性贫血等病变的 SLE。

37.C 消化性溃疡是指胃肠黏膜被胃酸、胃蛋白酶等自身消化而形成的黏膜溃疡。病理损伤至少达黏膜肌层。

38.A 气胸大多起病急骤，患者突感一侧胸痛，继之胸闷和呼吸困难。体征为叩诊呈过清音或鼓音，听诊呼吸音减弱或消失。X 线胸片检查是诊断气胸的重要方法，典型 X 线表现为被压缩肺边缘呈外凸弧形的细线条形阴影，称为气胸线，线外透亮度增高，无肺纹理，线内为压缩的肺组织。

39.E 幽门管溃疡上腹痛节律不明显，对药物治疗反应较差，呕吐多见，易发生幽门梗阻、出血、穿孔等并发症。

40.D 蛛网膜下腔出血的病因以先天性脑动脉瘤、脑血管畸形和脑动脉硬化为多见。少见病因有脑肿瘤、脑动脉炎、血液病、抗凝治疗后等。

41.D

42.B

**卡维地洛为  $\beta$  肾上腺素能受体阻滞剂**，NYHA 心功能分级为 IV 级和严重心衰为禁忌证。

43.E

44.D

低血容量性休克是体内或血管内大量丢失血液、血浆或体液，引起有效血容量急剧减少所致的血压降低和微循环障碍。如严重腹泻、剧烈呕吐、大量排尿或广泛烧伤时大量丢失水、盐或血浆;食管静脉曲张破裂、胃肠道溃疡引起大量内出血;肌肉挫伤、骨折、肝脾破裂引起的创伤性休克及大面积烧伤所致的血浆外渗均属低血容量性休克。

#### 45.C

急性白血病患者半数以发热为早期表现，虽然白血病本身可以发热，但高热往往提示有感染，最常见的病原菌为革兰氏阴性杆菌。长期用抗生素者可出现真菌感染。因患者免疫功能缺陷，可发生病毒感染。

## 2021-2022 年江苏省南通市全科医学（中级）专业知识

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

### 一、单选题(30 题)

1.女，19 岁。发热、贫血 12 天，肝脾淋巴结肿大，胸骨有压痛，血红蛋白 60g/L，白细胞  $40 \times 10^9/L$ ，血小板  $60 \times 10^9/L$ ，首先考虑

A.病毒感染 B.风湿热 C.急性白血病 D.慢性粒细胞性白血病 E.系统性红斑狼疮

2.股骨颈骨折最常见的并发症是

A.神经损伤 B.内翻位愈合 C.骨折不愈合 D.动脉损伤 E.骨筋膜室综合征

3.女，29岁，咳嗽、黄痰，黏稠伴高热(体温 39°C)，周身不适2天，曾肌注氟美松及抗感冒剂，热退，第4天右胸吸气性疼痛，体温升至39.5°C，顿咳，痰有异味，X线胸片：右下肺高密度片状影  
最先印象疾病是

A.A.肺结核 B.右下肺炎 C.肺化脓症 D.恶性肿瘤 E.肺隔离症

4.男性患者，28岁，反复上腹正中疼痛，进食后疼痛缓解，4小时前突发全腹剧烈疼痛。查体：全腹肌紧张，压痛及反跳痛。下述哪项支持消化性溃疡合并穿孔的诊断

A.A.腹痛前饮酒 B.腹痛部位不固定 C.腹痛伴肝浊音界缩小或消失 D.腹痛伴黄疸 E.腹部受外部暴力

5.肥厚型梗阻性心肌病时宜选择的治疗药物为

A.胺碘酮 B.洋地黄 C.阿托品 D.利多卡因 E.地尔硫革(硫氮革酮)

6.下列哪种呕吐为反射性呕吐

A.急性胆囊炎 B.抗癌药物 C.晕动病 D.癔症 E.脑出血

7.一名25岁男性患者出现右侧睾丸无痛性肿胀 到社区卫生服务中心就诊。他感觉睾丸实际上是每日逐渐长大的。他的最后一次性活动是6

个月前，没有尿路症状，体检发现右侧睾丸大，无触痛，不透光。附睾外表正常，没有触痛。以下哪项是最合适的

- A.转诊行经阴囊穿刺活检
- B.转诊到上级医院进行超声检查，并请专科医生会诊
- C.告知患者在未来数天射精多次
- D.适当的抗生素治疗 2 周
- E.6 个月后重新检查

8.男性，27 岁。近一周来自觉发热，腰痛、尿呈浓茶色。查体：巩膜黄染、睑结膜略苍白，心肺听诊正常，腹软无压痛，肝脾未触及。实验室检查：血清非结合胆红素明显增加，尿胆红素阴性。最可能的诊断为

- A.自身免疫性溶血性贫血
- B.急性肝炎
- C.胆总管结石
- D.Gilbert 综合征
- E.肝内胆汁淤积

9.一位类风湿关节炎患者，在社区就诊时主诉右肘关节伸侧长了一个蚕豆大小的结节约 4 个月，医生检查完后告诉她，这个结节说明

- A.病情活动已持续 4 个月
- B.病情目前并不活动
- C.曾有病情活动，目前是否活动应依据其他表现来判断
- D.曾有病情活动
- E.目前有病情活动

10.有关 2 型糖尿病，下列哪项概念是错误的

- A.存在胰岛素受体缺陷
- B.存在靶细胞膜上葡萄糖运转体的缺陷
- C.存在胰岛素抵抗
- D.存在脂代谢紊乱
- E.胰岛素水平很低，谷氨酸脱羧酶抗体(GAD)多为阳性

11.高血压合并双肾动脉狭窄应慎用

- A.双氢克尿噻 B.美托洛尔 C.洛汀新 D.氨氯地平 E.哌唑嗪

12.根据上述血气分析结果，本例应属于下列哪项酸碱平衡失调

- A.A.呼吸性酸中毒+代谢性碱中毒
- B.代谢性酸中毒+呼吸性碱中毒
- C.呼吸性酸中毒代偿
- D.呼吸性酸中毒失代偿
- E.代谢性碱中毒

13.咳铁锈色痰应考虑

- A.肺炎球菌肺炎 B.支气管扩张 C.肺结核 D.肺脓肿 E.尘肺

14.不良反应会出现口干、口中金属味的药物是( )。



A.甲硝唑 B.肠虫清 C.吡喹酮 D.氯硝柳胺

15.一般排泄性尿路造影检查不能显示的是()。

A.肾盂积水和输尿管扩张 B.肾盂受压、拉长变形 C.肾盂及输尿管的充盈缺损 D.分肾功能状态 E.膀胱尿液的输尿管反流

16.基本定为 SARS 病例，但尚无病原学依据者

A.进入正常诊断程序

B.可采用居家隔离观察并随诊的形式

C.留院观察，收入单人观察室

D.收至 SARS 定点医院，但为避免其中少数非 SARS 者被交叉感染，需置单人病房

E.收至 SARS 定点医院，可置多人病房

17.关于结核菌，下列哪项是错误的

A.生长快，抵抗力强 B.在干燥痰中可存活 6~8 个月 C.对湿热敏感

D.60°C经半小时即可被杀死 E.煮沸 5 分钟被杀灭

18.诊断急性肾盂肾炎的最重要依据是清洁中段尿细菌培养菌落计数

A.  $> 10^3$ /ml B.  $> 10^5$ /ml C.  $> 2 \times 10^5$ /ml D.  $> 5 \times 10^5$ /ml E.  $> 10 \times 10^5$ /ml

19.以下哪项不是大咯血窒息的临床表现

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/186152142225010125>