

### 三、妇产科护理

(一) 单项选择题。每题含 A、B、C、D、E 五个选项，选项中有一个答案是正确的，参赛选手应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选、少选或不选均不得分。

1-2 题共用题干

李女士，24 岁，已婚，停经 45 天来院就诊。

1. 为了确诊其是否妊娠，快速且最准确的检查方法是 ( D )

- A. 妊娠试验
- B. 黄体酮试验
- C. 基础体温测定
- D. 超声检查
- E. 宫颈粘液检查

2. 经检查，确定为宫内孕，其末次月经为 2007 年 3 月 14 日，该孕妇的预产期是 ( B )

- A. 2007 年 11 月 21 日
- B. 2007 年 12 月 21 日
- C. 2007 年 10 月 2 日
- D. 2007 年 11 月 28 日
- E. 2007 年 12 月 28 日

3-4 题共用题干

刘某，初孕妇，孕 36 周，来院产前检查。

3. 四步触诊结果：子宫底部触到圆而硬的胎头，胎背位于母体腹部右前方，耻骨联合上方触及软而不规则的胎臀，其胎方位为 ( B )

- A. 骶左前
- B. 骶右前
- C. 枕右后
- D. 枕右前
- E. 枕左前

4. 该孕妇胎心听诊在哪里听最清楚 ( B )

- A. 脐上左侧
- B. 脐上右侧
- C. 脐下左侧
- D. 脐下右侧
- E. 脐下正中

5-7 题共用题干

高女士，孕 20 周，产前检查时医生为其进行骨盆外测量。

5. 测骶耻外径，应选择体位是 ( D )

- A. 仰卧位，双腿伸直
- B. 右侧卧位，左腿伸直，右腿屈曲
- C. 仰卧位，双手抱膝
- D. 左侧卧位，右腿伸直，左腿屈曲
- E. 左侧卧位，左腿伸直，右腿屈曲

6. 骶耻外径的正常值为 ( B )

- A. 16-18cm

B. 18-20cm

C. 20-22cm

D. 22-24cm

E. 24-26cm

7. 测坐骨结节间径，正常值为（ C ）

A. 6-7.5cm

B. 7-8.5cm

C. 8.5-9.5cm

D. 9.5-10cm

E. 10-10.5cm

8-11 题共用题干

某孕妇，末次月经不详，第一次来医院产前检查，发现子宫底位于脐与剑突之间。

8. 该孕妇可能的孕周是（ E ）

A. 24 周末

B. 26 周末

C. 28 周末

D. 30 周末

E. 32 周末

9. 此时胎儿身长为（ D ）

A. 25cm

B. 30cm

C. 35cm

D. 40cm

E. 45cm

10. 该孕妇咨询护士，妊娠足月孕妇的体重平均增加多少，回答正确的是（ C ）

A. 8.5kg

B. 10.5kg

C. 12.5kg

D. 14.5kg

E. 16.5kg

11. 护士给该孕妇进行健康宣教，告知其休息时，何种体位最佳（ B ）

A. 平卧位

B. 左侧卧位

C. 胸膝卧位

D. 头低足高位

E. 半卧位

12-13 题共用题干

某孕妇，25 岁，平时身体健康，目前孕 30 周。昨晚平卧于床上看书时，感觉头晕、心悸、出汗。

12. 该孕妇出现的问题是（ D ）

A. 妊娠合并心脏病

B. 妊娠合并高血压

C. 妊娠期高血压疾病

D. 仰卧位低血压综合征

E. 妊娠合并肾炎  
13. 正确的处理是 ( A )

- A. 改为左侧卧位
- B. 给予口服升压药
- C. 立即坐起
- D. 改为右侧卧位
- E. 起身进行户外活动

14-15 题共用题干

陆女士，孕 30 周，其小腿下半部及踝部出现水肿，休息后消退，无其他异常。

14. 该孕妇水肿程度为 ( B )

- A. (-)
- B. (+)
- C. (++)
- D. (+++)
- E. (++++)

15. 下列措施正确的是 (D)

- A. 严格限制盐的摄入
- B. 严格限制水的摄入
- C. 适当限制水的摄入
- D. 适当限制盐的摄入
- E. 可不做任何限制

16-17 题共用题干

某初孕妇，末次月经不详，今日初感胎动，第一次来医院检查。

16. 其孕周大约为 ( C )

- A. 妊娠 13-14 周
- B. 妊娠 15-17 周
- C. 妊娠 18-20 周
- D. 妊娠 21-23 周
- E. 妊娠 24-26 周

17. 护士给该孕妇进行宣教，告知其孕期最简便而又较准确地测定胎儿安危的方法是 ( A )

- A. 胎动计数
- B. 缩宫素激惹试验
- C. 羊膜镜检查
- D. 测定孕妇尿雌三醇值
- E. 胎心监测

18-19 题共用题干

某孕妇，孕 37 周，常规产前检查，咨询护士分娩先兆。

18. 护士告知该孕妇分娩最可靠的先兆是 ( C )

- A. 宫底下降
- B. 不规则宫缩
- C. 阴道见红
- D. 胎动活跃
- E. 阴道分泌物增多

19. 该先兆距离临产的时间大约为 ( E )

- A. 1-2 小时
- B. 5-8 小时
- C. 10-12 小时
- D. 12-20 小时
- E. 24-48 小时

20-23 题共用题干

某产妇，妊娠 38 周，规律宫缩 2 小时入院。

20. 护士给她做分娩知识的宣教，下列叙述错误的是 ( C )

- A. 子宫收缩是分娩的主要产力
- B. 宫缩随产程进展逐渐增强
- C. 软产道是由子宫体、子宫颈、阴道及盆底软组织构成
- D. 初产妇第一产程时间平均为 11-12 小时
- E. 自然破膜多发生在宫口近开全时

21. 入院后 9 小时，宫缩好。肛查：宫口开大 8cm，胎头位于坐骨棘下 2cm，诊断为 ( A )

- A. 正常活跃期
- B. 潜伏期延长
- C. 活跃期延长
- D. 正常第二产程
- E. 第一程延长

22. 入院 12 小时后，顺利娩出一女婴，此后的处理哪项是错误的 ( D )

- A. 新生儿娩出后立即清理呼吸道
- B. 对新生儿进行 Apgar 评分
- C. 处理脐带时注意给新生儿保暖
- D. 胎儿娩出后，立即按摩宫底，娩出胎盘，减少产后出血
- E. 产后 2 小时留在产房继续观察

23. 新生儿出生后，经检查心率每分钟 98 次，呼吸浅慢不规则，全身皮肤青紫，吸痰器清理呼吸道时喉部有轻微反射，四肢肌张力稍有抵抗，该新生儿 Apgar 评分应为 ( C )

- A. 0 分
- B. 3 分
- C. 5 分
- D. 6 分
- E. 7 分

24-25 题共用题干

某产妇，会阴侧切，顺产一女婴，母子无异常，母乳喂养。

24. 产后第 1 天，护士向其做产后乳房护理指导，不正确的指导是 ( D )

- A. 哺乳前可按摩乳房
- B. 喂奶结束后，挤出乳汁涂抹于乳头上
- C. 可用湿毛巾清洁乳房
- D. 可用酒精清洁乳头
- E. 使用合适大小的乳罩

25. 对该产妇的产褥期护理，下列内容错误的是 ( C )

- A. 产后 1 小时进流食或清淡半流食
- B. 休息时避免患侧卧位
- C. 鼓励多饮水，产后 7 小时内及时排尿
- D. 保持外阴清洁，勤换会阴垫
- E. 会阴伤口可用红外线照射，以利愈合

26-28 题共用题干

某高危孕妇，目前孕 35 周，提早住院观察待产。

26. 如要了解胎儿成熟度，可以进行下列哪项检查（ A ）

- A. 卵磷脂 / 鞘磷脂比值测定
- B. 胎儿电子监护
- C. 胎动计数
- D. 盆腔 B 超
- E. 雌三醇测定

27. 如想了解该孕妇的胎盘功能，可以进行下列哪项检查（ E ）

- A. 卵磷脂 / 鞘磷脂比值测定
- B. 肌酐值
- C. 脂肪细胞计数
- D. 胆红素测定
- E. 胎盘生乳素测定

28. 护士指导该孕妇数胎动，告知 12 小时的胎动总数，提示为胎儿窘迫的是（ A ）

- A. 10 次以下
- B. 15 次以下
- C. 20 次以下
- D. 25 次以下
- E. 30 次以下

29-30 题共用题干

初产妇，26 岁，妊娠 40 周，规律宫缩 5 小时，胎头高浮，胎心 140 次/分，宫口开大 2cm。6 小时后破膜，立即听胎心率，减慢至 80 次/分钟。

29. 本例应首先考虑的是（ B ）

- A. 胎头受压，脑血流量一时性减少
- B. 脐带脱垂
- C. 胎盘功能不良
- D. 宫体包裹胎体
- E. 脐带绕胎儿颈部

30. 经吸氧，左侧卧位等处理后，复测胎心为 85 次/分钟，此时正确处置应是（ E ）

- A. 继续吸氧，严密观察产程进展
- B. 补充水和食物，增强产妇体力
- C. 灌肠，督促排尿
- D. 静脉滴注缩宫素，加速产程进展
- E. 立即行剖宫产术

31-33 题共用题干

患者，女性，25 岁。停经 45 天，阴道少量流血 2 天，伴下腹部轻度酸痛，尿妊娠试验（+），妇科检查：宫口闭，子宫 6 周妊娠大小。

31. 该患者考虑哪项诊断（ A ）

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产
- D. 完全流产
- E. 稽留流产

32. 对确诊最有价值的检查项目应是 ( D )

- A. 黄体酮试验
- B. 测量基础体温
- C. 尿妊娠试验
- D. B 型超声检查
- E. 诊断性刮宫

33. 对该患者的护理, 下列哪项是正确的 ( D )

- A. 立即做清宫术准备
- B. 做凝血功能检查
- C. 顺其自然, 不做处理
- D. 绝对卧床休息
- E. 常规使用抗生素

34-35 题共用题干

患者, 女性, 23 岁, 停经 45 天, 2 天前有少量阴道出血, 今晨起阴道流血量增多, 多于月经量, 阵发性腹痛加重, 无组织排出。查体: 子宫如孕 40 天大小, 宫口开。

34. 该患者考虑哪项诊断 ( B )

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产
- D. 完全流产
- E. 稽留流产

35. 取以下哪项措施 ( B )

- A. 遵医嘱使用保胎药物
- B. 立即行清宫手术
- C. 可不需特殊处理
- D. 需做凝血功能检查
- E. 卧床休息

36-37 题共用题干

患者, 女性, 35 岁, 曾经因宫颈内口松弛, 发生过三次自然流产, 均在孕 4 个月左右。现停经 2 个月, 无阴道流血及腹痛, 妊娠试验阳性。

36. 该患者考虑哪项诊断 ( E )

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产
- D. 完全流产
- E. 复发性流产

37. 对该患者目前哪项护理是正确的 ( D )

- A. 有出血情况时再处理

- B. 有宫缩时卧床休息
- C. 立即行宫颈内口缝扎术
- D. 绝对卧床休息
- E. 预防性口服硫酸舒喘灵

38-40 题共用题干

患者，女性，已婚，27岁。停经50日，阴道少量流血1日。今晨5时无原因出现下腹剧痛，伴恶心呕吐及一过性晕厥。查面色苍白，血压70/40mmHg，脉搏120次/分，妇科检查：宫颈举痛明显，后穹隆触痛(+)，盆腔触诊不满意。

38. 该患者初步考虑哪项诊断 ( C )

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 异位妊娠
- D. 完全流产
- E. 葡萄胎

39. 为明确病情，此时最有价值的辅助检查方法是 ( C )

- A. 宫腔镜检查
- B. 诊断性刮宫
- C. 行阴道后穹隆穿刺
- D. B超
- E. 行腹腔镜检查

40. 此时最适宜的处理是 ( C )

- A. 住院观察病情
- B. 给予止痛药物
- C. 做急诊手术的准备
- D. 指导进食以增加热量摄入
- E. 卧床休息

41-44 题共用题干

孕妇，妊娠36周，主诉头晕、头痛、视物模糊、恶心。查血压160/110mmHg，尿蛋白6g/24h，下肢水肿(++).

41. 诊断可能性最大的为 ( D )

- A. 妊娠期高血压
- B. 子痫前期轻度
- C. 妊娠水肿
- D. 子痫前期重度
- E. 子痫

42. 为进一步明确诊断，下列哪项检查价值高 ( C )

- A. B超
- B. 心电图
- C. 眼底检查
- D. 肝肾功能检查
- E. 血常规

43. 该患者治疗药物首选 ( A )

- A. 硫酸镁
- B. 苯妥英钠

- C. 山莨菪碱
- D. 利血平
- E. 胍屈嗪

44. 用药过程中，如发生了中毒现象，除应停药外，还应给予（D）

- A. 5%的葡萄糖静脉滴注
- B. 肌注山莨菪碱
- C. 静注 50%的葡萄糖
- D. 静注 10%的葡萄糖酸钙
- E. 静注低分子右旋糖酐

45-46 题共用题干

初孕妇，37 岁，妊娠 35 周，诊断为妊娠期高血压疾病（子痫前期重度），枕左前位，胎心 140 次/分，骨盆外测量正常。

45. 本例恰当处理应是（B）

- A. 积极治疗，等待产程自然发动
- B. 积极治疗 24-48 小时病情无好转，应终止妊娠
- C. 积极治疗一周后病情无好转，应终止妊娠
- D. 立即引产
- E. 立即行剖宫产术

46. 治疗 3 小时后，患者突然出现抽搐，医生诊断为子痫，对该患者的护理错误的是（B）

- A. 将患者安置在单人暗室
- B. 放音乐使患者情绪稳定
- C. 严密监护，记录出入量
- D. 放置压舌板防止舌咬伤
- E. 及时清理呼吸道分泌物

47-51 题共用题干

孕妇，妊娠 33 周，无诱因阴道出血约 150ml，腹部检查：腹软，无压痛，胎位清楚，胎心 148 次/分，阴道可见少量血液。

47. 最可能的诊断是（C）

- A. 胎盘早剥
- B. 早产
- C. 前置胎盘
- D. 妊娠期高血压疾病
- E. 见红

48. 为进一步明确诊断，宜选择哪项检查（D）

- A. 阴道检查
- B. 肛查
- C. 腹部检查
- D. B 超检查
- E. X 线检查

49. 本例目前的处理应是（A）

- A. 期待疗法
- B. 催产素引产
- C. 人工破膜



D. 行剖宫产术

E. 口服止血药物

50. 对该患者错误的护理措施是 ( D )

A. 卧床休息，左侧卧位

B. 监测胎心、胎动，了解胎儿有无缺氧

C. 保持外阴清洁，每日会阴擦洗 2 次

D. 持续吸氧，加强胎儿的供氧

E. 遵医嘱使用宫缩抑制剂、镇静剂等

51. 预防本病发生最有意义的项目是 ( A )

A. 避免多次刮宫、多产及产褥感染

B. 避免宫腔内压力骤然降低

C. 加强定期的产前检查

D. 妊娠期间避免长时间仰卧和腹部外伤

E. 积极防治妊娠期高血压疾病

52-53 题共用题干

某孕妇，妊娠 32 周，因子痫前期重度入院治疗，4 小时后出现持续性腹痛，阴道无流血。查体：面色苍白，血压 80/50mmHg，子宫大于妊娠周数，硬如板状，有压痛，胎心、胎动消失。

52. 该孕妇最可能的诊断是 ( E )

A. 妊娠合并急性阑尾炎

B. 先兆子宫破裂

C. 前置胎盘

D. 先兆早产

E. 胎盘早剥

53. 下列护理中错误的是 ( B )

A. 观察生命体征，及时记录

B. 指导患者绝对卧床休息

C. 注意患者有无凝血功能障碍的表现

D. 建立静脉通路，遵医嘱输血、输液

E. 预防产后出血

54-56 题共用题干

患者，女性，32 岁。妊娠 33 周，出现不规则宫缩，宫口未开，胎膜未破，胎心 140 次/分。

54. 该患者的诊断为 ( A )

A. 先兆早产

B. 早产临产

C. 假临产

D. 足月临产

E. 生理性宫缩

55. 目前首要的处理应是 ( A )

A. 抑制宫缩

B. 卧床休息，右侧卧位

C. 促进宫缩

D. 顺其自然

E. 吸氧

56. 为预防早产儿特发性呼吸窘迫综合症,可在分娩前对孕妇使用哪种药物( D )

A. 给氧

B. 能量合剂

C. 小三联注射

D. 地塞米松

E. 抗生素

57-59 题共用题干

24 岁初孕妇,平时月经规律,目前妊娠 43 周,自觉胎动减少 2 日。血压 110/70mmHg 枕左前位,无头盆不称征象。

57. 该孕妇目前可以忽略的检查项目是 ( B )

A. B 型超声监测

B. 测量宫高和腹围

C. 胎儿监护仪监测胎心变化

D. 宫颈成熟度评分

E. 超声多普勒测胎心数

58. 为能正确处理,目前最重要的检查项目是 ( C )

A. 测羊水卵磷脂/鞘磷脂比值

B. 测羊水胆红素类物质值

C. 测孕妇尿中雌激素/肌酐比值

D. 测羊水肌酐值

E. 测羊水脂肪细胞百分率

59. 经上述检查证实胎盘功能减退,此时最恰当的处理应是 ( B )

A. 静滴缩宫素促使其经阴道分娩

B. 行剖宫产术结束分娩

C. 左侧卧位,吸氧,等待自然分娩

D. 刺激乳头诱发宫缩

E. 静滴维生素C,吸氧,等待自然分娩

60-61题共用题干

某孕妇,孕30周,腹壁紧张、膨隆,医生诊断为羊水过多,需要腹壁穿刺放羊水。

60. 放水速度宜控制在每小时约 ( D )

A. 200m

B. 300ml

C. 400ml

D. 500m

E. 600ml

61. 一次放水量不超过 ( D )

A. 500m

B. 800ml

C. 1200ml

D. 1500m

E. 2000ml

62-65题共用题干

患者，女性，23岁，初次怀孕，孕16周出现心慌、气短，经检查发现心功能Ⅱ级。给予严密孕期监测，目前孕37周，自然临产。

62. 该患者妊娠期心脏负担最重的时期是（ D ）

- A. 孕12周内
- B. 孕24-26周
- C. 孕28-30周
- D. 孕32-34周
- E. 孕36-38周

63. 妊娠期护理措施中错误的是（ E ）

- A. 加强产前检查，及早发现心衰表现
- B. 每天保证10个小时以上的睡眠
- C. 取左侧卧位或半卧位
- D. 饮食以高热量、高维生素，低盐低脂为宜
- E. 妊娠4个月起每天食盐量不超过6-7克

64. 该产妇分娩的体位最好取（ D ）

- A. 平卧位
- B. 右侧卧位
- C. 随意卧位
- D. 左侧卧位上半身抬高
- E. 仰卧位

65. 分娩比较顺利，产后心功能Ⅲ级，该产妇的产褥期护理正确的是（ A ）

- A. 产后前3天，最容易发生心衰
- B. 产后30分钟可以开奶
- C. 产后第2天可下床活动，防止便秘
- D. 为避免菌群失调，不使用抗生素治疗
- E. 指导做产后体操，尽早恢复盆底肌肉张力

66-67 题共用题干

某孕妇，29岁，妊娠期糖尿病，于孕39周顺产一男婴。

66. 对该孕妇的产褥期护理错误的是（ C ）

- A. 注意有无心悸、出冷汗等低血糖表现
- B. 保持清洁，预防产后感染
- C. 该男婴按正常新生儿护理
- D. 严密监测产妇血糖变化
- E. 指导产妇适度运动，合理饮食

67. 该新生儿出生后30分钟开始需定时喂服下列哪种溶液（ C ）

- A. 5%葡萄糖溶液
- B. 10%葡萄糖溶液
- C. 25%葡萄糖溶液
- D. 生理盐水
- E. 母乳

68-71 题共用题干

孕妇，妊娠27周，在产前检查中发现血红蛋白90g/L，血清铁5.5mmol/L。

68. 最可能的诊断是（ D ）

- A. 妊娠生理性贫血

- B. 再生障碍性贫血
- C. 巨幼细胞性贫血
- D. 缺铁性贫血
- E. 溶血性贫血

69. 首选的治疗为 ( D )

- A. 口服叶酸
- B. 少量多次输血
- C. 肌肉注射右旋糖酐铁
- D. 口服硫酸亚铁
- E. 肌注山梨醇铁

70. 正确的用药时间是 ( B )

- A. 餐前半小时
- B. 餐后 20 分钟
- C. 空腹时
- D. 睡前
- E. 晨起后

71. 在补充铁剂时应同时服 ( C )

- A. 维生素 A
- B. 维生素 B
- C. 维生素 C
- D. 维生素 D
- E. 维生素 E

72-75 题共用题干

初产妇，28 岁，规律宫缩 10 小时入院，肛查宫口开 4cm。4 小时后肛查宫口仍为 4cm，宫缩 7-8 分钟一次，持续时间 30 秒，胎膜未破，头盆相称，胎位正常。

72. 从产程图上可以看出，该产妇存在的问题是 ( C )

- A. 潜伏期延长
- B. 活跃期延长
- C. 活跃期停滞
- D. 第二产程延长
- E. 第二产程停滞

73. 目前最恰当的处理是 ( C )

- A. 镇静剂
- B. 催产素静滴
- C. 人工破膜
- D. 肌注杜冷丁
- E. 剖宫产

74. 经以上处理后，医嘱静滴缩宫素，护士在 0.9%生理盐水 500ml 中应加入缩宫素 ( A )

- A. 2.5U
- B. 3U
- C. 3.5U
- D. 4U
- E. 4.5U

75. 在使用缩宫素的注意事项中，下列哪项是错的（ D ）

- A. 专人观察
- B. 注意胎心
- C. 注意血压
- D. 一般滴速不超过 50 滴/分钟
- E. 以 4-5 滴/分钟开始

76-78 题共用题干

初孕妇，28 岁，妊娠 28 周，腹部检查：子宫呈纵椭圆形，胎先露部较软且不规则，胎心在脐上偏左。

76. 本例应诊断为（ B ）

- A. 肩先露
- B. 臀先露
- C. 额先露
- D. 枕先露
- E. 面先露

77. 如需要胎位矫正，护士应告知其最佳的干预时间是（ E ）

- A. 孕 20 周后
- B. 孕 22 周后
- C. 孕 24 周后
- D. 孕 28 周后
- E. 孕 30 周后

78. 矫正此胎位可采取的体位是（ A ）

- A. 膝胸卧位
- B. 半卧位
- C. 左侧卧位
- D. 膀胱截石位
- E. 俯卧位

79-81 题共用题干

初产妇，孕 33 周，有液体从阴道流出来院，无腹痛。行肛查，触不到羊膜囊，上推胎儿先露部可见到流液量增多，胎心率正常，体温正常。

79. 最可能的诊断为（ D ）

- A. 先兆流产
- B. 先兆早产
- C. 临产
- D. 胎膜早破
- E. 胎盘早剥

80. 护士应指导孕妇的体位是（ D ）

- A. 仰卧位
- B. 右侧卧位
- C. 头高足低位
- D. 左侧卧位，抬高臀部
- E. 半坐卧位

81. 对该患者的处理错误的是（ B ）

- A. 期待疗法

- B. 催产素引产
- C. 保持外阴清洁，会阴擦洗每日 2 次
- D. 监测胎心
- E. 密切观察体温

82-83 题共用题干

某产妇，胎儿娩出后 24 小时出血量达 600ml，检查子宫软，按摩后子宫变硬，阴道流血减少，该产妇诊断为产后出血。

82. 造成该产妇产后出血的最可能原因是（ A ）

- A. 子宫收缩乏力
- B. 胎盘残留
- C. 软产道裂伤
- D. 凝血功能障碍
- E. 胎膜残留

83. 首要的处理原则是（ D ）

- A. 检查凝血功能
- B. 抗感染
- C. 检查软产道
- D. 加强宫缩
- E. 清理宫腔

84-86 题共用题干

患者女性，足月产后 3 天，出现下腹痛，低热，恶露多，有臭味，子宫底脐上一指，子宫体软。

84. 考虑其最可能的病理是（ A ）

- A. 急性子宫内膜炎、子宫肌炎
- B. 急性宫颈炎
- C. 急性输卵管炎
- D. 急性盆腔结缔组织炎
- E. 盆腔腹膜炎

85. 该产妇宜采取的体位是（ C ）

- A. 侧卧位
- B. 仰卧位
- C. 半坐卧位
- D. 头低足高位
- E. 俯卧位

86. 该产妇最不可能存在的护理问题是（ A ）

- A. 营养失调
- B. 体温升高
- C. 焦虑
- D. 疼痛
- E. 知识缺乏

87-88 题共用题干

某产妇，10 日前顺产一女婴。今早突感阴道流血增多，查体：低热，血压 80/50mmHg 子宫大而软，宫口松弛，有残留组织堵塞，B 型超声检查提示宫腔内有残留组织。

87. 导致该患者出现目前状况最直接的原因可能是 ( C )

- A. 子宫复旧不全
- B. 子宫胎盘附着面感染
- C. 蜕膜残留
- D. 绒癌
- E. 胎盘、胎膜残留

88. 该患者最主要的护理诊断是 ( C )

- A. 焦虑
- B. 知识缺乏
- C. 外周组织灌注无效
- D. 急性疼痛
- E. 气体交换障碍

89-91 题共用题干

患者女, 35 岁, 已婚。主诉近日白带增多, 外阴瘙痒伴灼痛 1 周。妇科检查: 阴道内多量灰白泡沫状分泌物, 阴道壁散在红斑点。

89. 该患者初步考虑为 ( E )

- A. 细菌性阴道病
- B. 外阴阴道假丝酵母菌病
- C. 外阴瘙痒症
- D. 萎缩性阴道炎
- E. 滴虫性阴道炎

90. 为明确诊断, 首选的检查是 ( A )

- A. 阴道分泌物悬滴检查
- B. 宫颈刮片
- C. 盆腔 B 超
- D. 诊断性刮宫
- E. 阴道镜检查

91. 护士对该患者进行健康指导, 下列说法错误的是 ( C )

- A. 口服甲硝唑可有恶心、呕吐等副反应
- B. 甲硝唑用药期间因禁酒
- C. 局部用药时注意用药连贯性, 经期不能停药
- D. 穿纯棉内裤, 经常更换
- E. 外阴不要用肥皂擦洗

92-94 题共用题干

患者, 女性, 38 岁, 因外阴瘙痒, 白带异常就诊, 医生诊断为外阴阴道假丝酵母菌病。

92. 关于该病的认识, 患者认知错误的是 ( A )

- A. 假丝酵母菌对热的抵抗力很强
- B. 取分泌物检查前 24-48 小时禁止性交
- C. 局部用药是主要的治疗方法
- D. 局部用药宜在晚上睡前完成
- E. 分泌物取出后应及时送检

93. 对于该病的治疗, 适合阴道冲洗的溶液为 ( C )

- A. 1% 乳酸溶液

- B. 2%乳酸溶液
- C. 2-4%碳酸氢钠溶液
- D. 5%醋酸溶液
- E. 0.9%氯化钠溶液

94. 局部冲洗后阴道应放置 ( C )

- A. 甲硝唑泡腾片
- B. 红霉素
- C. 制霉菌素片
- D. 青霉素
- E. 链霉素

95-96 题共用题干

患者女性，60岁，患老年性阴道炎，该患者询问护士发病原因，护士告知直接影响阴道自净作用的激素下降。

95. 这个激素是 ( B )

- A. 孕激素
- B. 雌激素
- C. 促黄体生成素
- D. 促卵泡素
- E. 促性腺激素释放激素

96. 下列哪个溶液适合对该患者进行阴道灌洗 ( A )

- A. 1%乳酸溶液
- B. 2%乳酸溶液
- C. 2-4%碳酸氢钠溶液
- D. 5%醋酸溶液
- E. 0.9%氯化钠溶液

97-98 题共用题干

患者女性，29岁，外阴不适，白带增多。辅助检查：氨试验，有烂鱼样腥臭味。

97. 该患者所患疾病最可能是 ( A )

- A. 细菌性阴道病
- B. 外阴阴道假丝酵母菌病
- C. 外阴瘙痒症
- D. 萎缩性阴道炎
- E. 滴虫性阴道炎

98. 下列哪个溶液适合对该患者进行阴道灌洗 ( A )

- A. 1%乳酸溶液
- B. 2%乳酸溶液
- C. 2-4%碳酸氢钠溶液
- D. 5%醋酸溶液
- E. 0.9%氯化钠溶液

99-101 题共用题干

患者女性，37岁，已产，医生诊断为宫颈中度糜烂。

99. 针对该患者，最合适的处理是 ( D )

- A. 门诊随访观察
- B. 局部药物治疗



- C. 口服抗生素
- D. 排除早期宫颈癌后进行物理治疗
- E. 宫颈锥切术

100. 患者询问治疗的时间，护士告知最佳时间是（ E ）

- A. 月经来潮前 3-7 天
- B. 排卵期
- C. 无时间限制
- D. 确诊后
- E. 月经干净后 3-7 天

101. 患者询问治疗后禁止性生活和盆浴的时间，护士应回答（ D ）

- A. 1-2 周
- B. 2-3 周
- C. 3-6 周
- D. 4-8 周
- E. 6-12 周

102-104 题共用题干

患者，女，37 岁，G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>。3 天前发现“性生活后阴道有血性白带”。子宫颈刮片细胞学检查结果为巴氏Ⅲ级。

102. 患者询问检查结果的意义，正确的解释是（ C ）

- A. 轻度炎症
- B. 重度炎症
- C. 可疑癌症
- D. 高度可疑癌症
- E. 癌症

103. 对于该患者需要进一步做宫颈活检，关于宫颈活检哪项是错误的（ B ）

- A. 是确诊宫颈癌最有效的方法
- B. 钳取宫颈病变区边缘组织为宜
- C. 碘试验着色区域活检诊断价值高
- D. 宜多点取材
- E. 标本固定送病检

104. 经宫颈活检，确诊为宫颈癌，行宫颈癌根治术，术后 2 天，患者询问护士其尿管何时可拔出，护士的回答是（ D ）

- A. 1-3 天
- B. 2-5 天
- C. 3-7 天
- D. 7-14 天
- E. 2-3 周

105-107 题共用题干

患者，女性，28 岁，已婚，平素月经规律无痛经史。妇科学查发现盆腔包块，无特殊不适。查外阴、阴道正常，宫颈光滑，子宫前位，正常大小，其右侧扪及一近 3 个月妊娠大小包块，活动好，无压痛。B 超示子宫大小正常，其右侧有一儿头大小强回声团，边界清。

105. 下列诊断可能性最大的是（ D ）

- A. 卵巢癌

- B. 卵巢巧克力囊肿
- C. 卵巢畸胎瘤
- D. 输卵管卵巢囊肿
- E. 子宫浆膜下肌瘤

106. 患者转身时突然出现右下腹剧痛，伴恶心、呕吐，最可能的是该包块并发了（ A ）

- A. 蒂扭转
- B. 破裂
- C. 内出血
- D. 感染
- E. 急性阑尾炎

107. 患者需急诊手术，术前准备不需做（ B ）

- A. 皮肤准备
- B. 阴道准备
- C. 膀胱准备
- D. 床位准备
- E. 胃肠道准备

108-109 题共用题干

53 岁妇女，绝经 4 年，阴道流脓血样物伴有臭味月余。妇科检查子宫稍大、稍软，有压痛，双附件未触及异常。

108. 该患者应首先考虑（ D ）

- A. 功血
- B. 子宫肌瘤
- C. 生殖道炎症
- D. 生殖道恶性肿瘤
- E. 多囊卵巢综合征

109. 本例最有价值的处置是（ D ）

- A. 检查血、尿常规
- B. 宫颈刮片细胞学检查
- C. 阴道分泌物涂片查病原体
- D. 分段诊刮活组织检查
- E. 静滴广谱抗生素消炎治疗

110-112 题共用题干

27 岁妇女，停经近 3 个月，阴道少量流血 5 日。查子宫如妊娠 4 个月大，软，双附件区各有  $5\text{cm} \times 5\text{cm} \times 3\text{cm}$  囊性肿物。

110. 本例应考虑是（ C ）

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 葡萄胎
- D. 早孕合并卵巢囊肿
- E. 先兆流产合并卵巢囊肿

111. 为明确诊断，下列哪项检查最有价值（ A ）

- A. B 超
- B. hCG 检查

C. X线胸片

D. CT

E. 雌激素检查

112. 诊断明确后，首选的治疗（ B ）

A. 子宫全切除

B. 清宫术

C. 子宫次切术

D. 化疗

E. 雌激素治疗

113-114 题共用题干

患者，女性，子宫肌瘤，定于周四上午在连续硬膜外麻醉下行全子宫切除术。

113. 周三需做的术前准备不包括（ E ）

A. 皮肤准备

B. 测量生命体征

C. 抽血做血型及交叉配血试验

D. 心理护理

E. 留置尿管

114. 护士为其进行术后指导，告知患者术后阴道残端肠线吸收，可致阴道少量出血，大约在术后（ B ）

A. 1-2 天出现

B. 1-2 周出现

C. 3-4 天出现

D. 3-4 周出现

E. 5-6 天出现

115-117 题共用题干

患者女性，60 岁。自诉腰骶部酸痛，劳累后尤其明显。嘱患者平卧用力向下屏气时，发现宫颈脱出阴道口，宫体仍在阴道内。

115. 该患者属于（ C ）

A. 子宫脱垂 I 度轻型

B. 子宫脱垂 I 度重型

C. 子宫脱垂 II 度轻型

D. 子宫脱垂 II 度重型

E. 子宫脱垂 III 度

116. 给该患者予手术治疗，术后患者适宜的卧位为（ C ）

A. 半坐位

B. 截石位

C. 位

D. 侧卧位

E. 俯卧位

117. 护士指导患者盆底肌肉组织锻炼的方法为（ B ）

A. 下肢运动

B. 收缩肛门的运动

C. 仰卧起坐

D. 俯卧撑

E. 上肢运动

118-121 题共用题干

患者，女性，38 岁，已婚，自然流产 1 次，近半年来月经周期正常，30-32 天，经期延长，10-15 天，经量增多。

118. 该患者初步诊断为 ( B )

- A. 子宫内膜单纯型增生
- B. 子宫内膜不规则脱落
- C. 黄体功能不足
- D. 萎缩型子宫内膜
- E. 子宫内膜复杂型增生

119. 医生医嘱行诊刮术，患者询问护士诊刮目的是 ( A )

- A. 确定有无排卵及黄体功能
- B. 改善子宫内环境
- C. 防止感染
- D. 了解子宫大小
- E. 促进子宫收缩

120. 刮宫时间应在 ( D )

- A. 月经来潮前 1 周
- B. 月经来潮 12 小时内
- C. 月经第 3 天
- D. 月经第 5 天
- E. 月经来潮 24 小时内

121. 刮出的内膜呈现什么改变 ( C )

- A. 子宫内膜单纯型增生
- B. 增生晚期内膜
- C. 增生期内膜与分泌期内膜混合存在
- D. 萎缩型子宫内膜
- E. 子宫内膜复杂型增生

122-123 题共用题干

患者，女性，28 岁，痛经 3 年且逐渐加重，2 年前因不孕做过输卵管通液治疗，子宫较正常略大，后位，不活动，右侧触及 4×4×3cm 大的痛性包块，与子宫粘连，双宫骶韧带均触及豆粒大痛性结节。

122. 本病首先考虑为 ( D )

- A. 陈旧性宫外孕
- B. 生殖器结核
- C. 慢性盆腔炎
- D. 子宫内膜异位症
- E. 输卵管卵巢囊肿

123. 为进一步明确诊断，首选的检查方法是 ( C )

- A. 双合诊
- B. 三合诊
- C. 腹腔镜
- D. CA125
- E. 盆腔 B 超

124-127 题共用题干

患者，女性，30 岁，结婚 5 年。婚后第 1 年因工作繁忙于妊娠 40 天行药物流产。近 2 年多来未避孕，欲生育，但一直未孕。月经 5-6 天/28-30 天，妇科检查：宫颈轻度糜烂，子宫中位，大小正常，左侧附件增厚，右侧(一)。

124. 该患者的最主要诊断是 ( B )

- A. 原发性不孕症
- B. 继发性不孕症
- C. 宫颈糜烂
- D. 陈旧性宫外孕
- E. 宫外孕

125. 为明确原因，建议患者测基础体温，有关基础体温的描述，错误的一项是 ( C )

- A. 无排卵周期呈单相型
- B. 有排卵周期呈双相型
- C. 受雌激素影响基础体温上升 0.3-0.5℃
- D. 需连续测 3 个月以上
- E. 睡眠不足会影响结果

126. 该患者基础体温测定呈双相型，下一步处理宜首选 ( C )

- A. 宫腔镜检查
- B. 腹腔镜检查
- C. 输卵管通畅检查
- D. 诊断性刮宫
- E. 宫颈黏液涂片检查

127. 该患者作此检查选择的时间适宜在 ( D )

- A. 月经来潮前 6 小时
- B. 排卵前 24 小时
- C. 排卵后 48 小时
- D. 月经干净后 3-7 天
- E. 月经干净后 10 天

128-129 题共用题干

患者女性，30 岁。已婚，生育史:1-0-1-1，宫内节育器避孕，因“停经 45 天，阴道少量流血 1 日伴下腹隐痛 8 小时”就诊。体检:神智清，心肺(一)，生命体征正常，尿妊娠试验弱阳性。

128. 为确定诊断，除了妇科检查之外，此时最有价值的辅助检查方法是 ( D )

- A. 血常规
- B. 腹部 X 线摄片
- C. 阴道后穹隆穿刺
- D. B 型超声
- E. 腹腔镜检查

129. 若确定是宫内妊娠，最合适的处理措施是 ( C )

- A. 黄体酮保胎治疗
- B. 药物流产
- C. 取环后行人工流产
- D. 水囊引产术

E. 取环后继续保胎治疗

130-133 题共用题干

24 岁已婚妇女，停经 6 周，尿妊娠试验阳性，因高热一周，曾服多种药物，要求人流。人流时出现恶心呕吐、出汗，面色苍白。查体：血压 80/60mmHg，心率 46 次/分。

130. 本例最可能的诊断应是（ B ）

A. 宫腔粘连综合征

B. 人工流产综合反应

C. 多囊卵巢综合征

D. 希恩综合征

E. Turner 综合征

131. 本例正确处理应是（ B ）

A. 立即输液并输血

B. 静脉注射阿托品

C. 肌注肾上腺素

D. 静脉滴注间羟胺

E. 终止手术，待病情好转再进行

132. 经积极处理，手术顺利完成。对该患者的术后指导错误的是（ A ）

A. 术后在观察室休息观察 30 分钟

B. 应严密观察腹痛、阴道出血、生命体征等

C. 嘱患者术后注意保持外阴清洁

D. 嘱患者注意观察阴道流血和腹痛情况，如出血多于月经量并伴有腹痛应及时就诊

E. 嘱患者术后禁盆浴和性生活 1 个月

133. 该患者术后 15 天，仍有较多阴道出血，经抗菌素及宫缩剂治疗无效，子宫稍大而软，宫口开，应首先考虑（ E ）

A. 子宫内膜炎

B. 吸宫不全

C. 宫腔粘连

D. 月经不调

E. 子宫复旧不全

134-135 题共用题干

王女士，30 岁，育有 2 孩，准备避孕。

134. 来医院咨询宫内节育器的放置禁忌证，护士的回答错误的是（ A ）

A. 月经过少

B. 宫颈内口过松

C. 生殖道炎症

D. 严重全身性疾病

E. 月经频发或不规则阴道流血

135. 一个月后，该女士来医院顺利放置宫内节育器，术后 3 天因少量阴道流血，自觉下腹轻度不适来复诊。最合适的处理是（ C ）

A. 立即取出宫内节育器

B. 应用抗生素，待阴道流血停止后取环

C. 暂不予处理，观察 1 周后，如症状不消失再就诊

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/197030154066006041>