

异常临盆妇女的护理

选择题

A 型题

1. 宫缩乏力，行人工破膜加快产程进展合用于：

- A. 臀位，宫口开大 3cm 以上
- B. 横位，宫口开大 2cm
- C. 头先露，已连接，宫口开大 4cm
- D. 头盆不称

2. 以致继发性宫缩乏力最常有的原由是：

- A. 双胎妊娠
- B. 羊水过多
- C. 巨大胎儿
- D. 子宫发育不良
- E. 头盆不称

3. 协调性子宫缩短乏力的特色是：

- A. 宫缩的连续时间长、间歇时间短
- B. 宫缩屡次，但宫口不开大

C. 子宫缩短仍保持正常的节律性、对称性和极性

D. 只保持正常的节律性和对称性，极性倒置

E. 宫口扩充和先露降落不可比率

4. 滞产是指总产程超出：

5. 以下哪项属于不协调性子宫缩短乏力的特色：

A. 宫缩的喜悦点来自双侧子宫角部

B. 子宫缩短极性正常

C. 子宫缩短拥有节律性

D. 宫缩时间长且规律

E. 子宫缩短不协调，不可以使子宫颈口扩充和胎先露降落

6. 初产妇活跃期延伸是指:

A. 超出 8h

B. 超出 16h

C. 超出 20h

D. 超出 24h

E. 超出 30h

7. 以下哪项不是子宫缩短乏力对母体的影响:

A. 简单以致生殖道瘘

B. 可惹起产后出血

C. 病理性缩复环

D. 较易发生胎盘胎膜残留

E. 严重时可惹起低钾血症

8. 不属于不协调性宫缩乏力的护理举措是:

A. 冷静歇息

B. 赐予背部按摩, 分别注意力

C.有头盆不称做好剖宫产术准备

D.使用宫缩素增强宫缩

E. 指导产妇宫缩时做深呼吸

9. 用催产素静脉滴注催产，一般 5% 葡萄糖 500ml 加入缩宫素的单位是：

急产是指总产程不超出：

12. 强直性子宫缩短克制宫缩使用硫酸镁的量是：

14. 纯真扁平骨盆，是骨盆的哪条径线缩短：

A. 前后径

B. 横径

C. 坐骨棘间径

D. 耻骨弓角度

E. 坐骨结节间径

16. 骨盆的进口平面狭小，影响胎头的：

A. 连接

B. 内旋转

C. 外旋转

D. 复位

E. 俯曲

17. 连续性枕横位常见于以下哪一种骨盆：

A. 纯真性扁平骨盆

B. 漏斗骨盆

C. 均小骨盆

D. 佝偻性扁平骨盆

E. 偏斜骨盆

18. 均小骨盆是指骨盆的每条径线均小于骨盆正常值多少 cm:

妊娠末期发现跨耻征阳性，最大的可能为:

A. 妇女型骨盆

B. 漏斗骨盆

C. 中骨盆平面狭小

D. 进口平面狭小

E. 出口平面狭小

20. 以下哪项不属于骨盆进口平面狭小的护理举措的是:

A. 绝对性狭小者做好剖宫产准备

B. 专人守卫

C. 灌肠，促使宫缩

D. 严密察看产程进展

E. 注意羊水的性状

21. 临床上最常有的异常胎位是：

A. 枕横位

B. 枕前位

C. 臀位

D. 胎头高直位

E. 枕后位

22. 改正臀位最适合的时间是在妊娠：

周

周

周

周

周

23. 子宫破碎的预兆是：

A. 宫缩乏力

B. 宫缩过强

C. 病理性缩复环

D. 跨耻征阳性

E. 胎膜早破

24. 对母儿最不利的胎位是：

A. 臀位

B. 枕前位

C. 枕后位

D. 胎头高直位

E. 横位

25. 骨盆进口前后径短，横径正常者，属于：

A. 漏斗骨盆

B. 均小骨盆

C. 畸形骨盆

D.男性骨盆

E.扁平骨盆

26. 体重超出以下哪项的胎儿称巨大胎儿:

27. 臀位临盆, 以下哪项是正确的:

A. 禁用宫缩剂

B. 灌肠促使宫缩

C. 嘱产妇取头高足低位

D. 堵臀时间越长越好

E. 从脐部娩出到胎头娩出的时间为 8min

28. 肩位的临床表现, 下述不正确的选项是:

A. 宫缩过强

B. 胎膜早破

C. 不实时办理易发生子宫破碎

D. 子宫长度低于同妊娠周数

E. 嵌顿性肩先露

30. 产前检查发现巨大儿，最需考虑的病理状况是：

A. 孕妇并发糖尿病

B. 营养剩余

C. 经产妇

D. 父亲母亲身材高大

E. 过期妊娠

31. 初产妇，足月临产 4 小时住院，住院时，宫缩强，4 小时后转弱为 30s/5min，胎心好，经缩宫素注射后子宫开全顺利临盆，此临盆应属于：

A. 第一产程延伸

B. 潜藏期延伸

C.活跃期延伸

D.正常临盆经过

E.滞产

32. 初产妇，孕 40 周，临产后住院查：孕妇极度难过，喊叫不已，腹部与孕周相切合，宫缩强弱不一，宫缩间歇宫体不完整放松，胎心 160 次/min，宫口开大 2cm，羊水胎粪污染，以下何种诊疗正确：

A.协调性子宫缩短乏力

B.不协调性子宫缩短乏力

C.协调性子宫缩短过强

D.不协调性子宫缩短过强

E.宫缩正常

33. 初产妇，孕 38 周，宫口开全 3 小时屡次使劲，未见胎头拨露，检查：宫底为臀部，腹部前面可涉及胎儿小部分，未涉及胎头，肛查胎头已达坐骨棘下 2cm，大凶门在前面，矢状缝与骨盆前后径一致，诊疗为：

A.骨盆上口平面狭小

B.头盆不称

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/198065053121006034>