

护理三基三严考试题含答案

1、【单选题】对于压力性损伤的预防措施,描述错误的是

- A、动态评估患者全身状况
- B、动态评估患者皮肤情况
- C、患者入院时未发生压力性损伤者无需评估
- D、建立体位变换时刻表
- E、保持患者皮肤适宜的湿润度

答案: C

2、【单选题】半坐卧位的目的不包括

- A、利于引流
- B、利于呼吸
- C、利于循环
- D、防止膈下脓肿
- E、利于排尿

答案: E

3、【单选题】反射性呕吐见于下列些疾病

- A、妊娠
- B、脑炎
- C、急性胆囊炎
- D、有机磷中毒
- E、胃神经症

答案: C

4、【单选题】男, 38 岁, 车祸伤及头部, 当即出现右侧鼻唇沟变浅, 右外耳道流出淡血性液体, 右耳听力下降, CT 示颅内少量积气。目前患者适宜的体位是

- A、头低位
- B、仰卧中凹位
- C、左侧卧位
- D、右侧卧位
- E、平卧位

答案: D

5、【单选题】肝源性水肿最常见的病因是

- A、早期原发性肝癌
- B、肝硬化
- C、急性病毒性肝炎

- D、肝内血管癌
- E、急性中毒性肝炎

答案：B

6、【单选题】新生儿室的适宜温度是

- A、13-14° C
- B、15-16° C
- C、18-22 ° C
- D、22-24° C
- E、25-27° C

答案：E

7、【单选题】不伤害原则对精神科护理人员的要求是

- A、不滥用护理措施
- B、重视患者及监护人的意愿
- C、注重护理结果评估
- D、合理分配医疗资源
- E、提供适度的护理服务

答案：A

8、【单选题】新生儿窒息复苏时,胸外按压的深度为

- A、胸廓前后径的 1/2
- B、胸廓前后径的 1/2-2/3
- C、胸廓前后径的 1/3
- D、胸廓前后径的 2/3
- E、胸廓前后径的 3/4

答案：C

9、【单选题】治疗和抢救休克的关键环节是

- A、应用纠酸药物
- B、应用皮质激素
- C、应用血管活性药物
- D、防治弥散性血管内凝血
- E、消除病因,补充血容量

答案：E

10、【单选题】最适合糖尿病患者的菜单组合是

- A、可乐鸡翅、拔丝白薯、醋溜土豆丝
- B、糖醋里脊、糖醋排骨、东坡肉
- C、红烧牛肉、白萝卜清蒸鲫鱼、梅菜扣肉

- D、西湖醋鱼, 玉米烙、香菇炒青菜
- E、香菇木耳焖豆腐、海米冬瓜、苦瓜炒肉丝

答案: E

11、【单选题】儿童孤独症又称自闭症, 其核心症状为

- A、社会交往障碍
- B、交流障碍
- C、兴趣局限及动作行为异常
- D、认知障碍
- E、智力低下

答案: A

12、【单选题】三凹征见于

- A、混合性呼吸困难
- B、呼气性呼吸困难
- C、心源性呼吸困难
- D、吸气性呼吸困难
- E、以上均可以

答案: D

13、【单选题】关于稽留热的描述不正确的是

- A、体温恒定维持在 39-40℃ 的高水平
- B、可达数天或数周
- C、24h 内体温波动范围不超过 1℃
- D、常见于大叶性肺炎、斑疹伤寒和伤寒高热期
- E、12h 体温波动范围不超过 0.5℃

答案: E

14、【单选题】十二指肠溃疡合并幽门梗阻, 呕吐物为

- A、食物, 不含胆汁
- B、胆汁, 不含食物
- C、咖啡样物质
- D、食物和胆汁
- E、粪臭味物质

答案: A

15、【单选题】大肠是人体参与排便的主要器官, 关于其描述正确的是

- A、全长约 1m
- B、起自回肠末端, 止于直肠
- C、可利用肠内细菌制造维生素

- D、包括盲肠、结肠、直肠三部分
- E、运动少而慢,对刺激反应较敏感

答案: C

16、【单选题】下述符合无菌技术操作原则的是

- A、无菌操作前 30min 清扫地面
- B、无菌包潮湿须待干后使用
- C、取出的无菌物品未用立即放回原无菌包内
- D、治疗室每周用紫外线照射 1 次
- E、操作时手臂保持在腰部水平以上

答案: E

17、【单选题】下列哪类患者应使用胃肠外营养

- A、严重水电解质紊乱
- B、凝血功能障碍
- C、严重呼吸/循环功能衰竭
- D、短肠综合征
- E、不可逆性昏迷

答案: D

18、【单选题】骨盆骨折引起膀胱破裂, 需要首先处理的是

- A、修补膀胱破裂处
- B、清除外渗尿液和血液
- C、处理骨盆骨折
- D、纠正休克
- E、留置导尿

答案: D

19、【单选题】普通病室的适宜温度是

- A、13~14° C
- B、15~16° C
- C、18-22 ° C
- D、22~24° C
- E、25~27° C

答案: C

20、【单选题】以下哪一脏腑与恐的情志有密切关系

- A、肾
- B、肝
- C、心

D、肺

E、脾

答案：A

21、【单选题】建立人工通气的最优方法是

A、呼吸机

B、人工气囊

C、气管切开

D、口对口呼吸

E、气管内插管

答案：E

22、【单选题】护理不良事件上报系统的正确顺序是

A、上报-责任确认-分析-系统整改-落实反馈

B、上报-分析-责任确认-系统整改-落实反馈

C、责任确认-上报-分析-系统整改-落实反馈

D、责任确认-分析-上报-系统整改-落实反馈

E、上报-系统整改-分析-责任确认-落实反馈

答案：B

23、【单选题】胃的特有运动形式是

A、紧张性收缩

B、容易性舒张

C、蠕动

D、分节运动

E、集团蠕动

答案：B

24、【单选题】男，70岁。家中烧煤炭取暖，清晨家属发现患者意识模糊，立即拨打急救电话。关于重度一氧化碳中毒的护理措施错误的是

A、保持呼吸道通畅，给予吸氧

B、昏迷并高热和抽搐患者，降温 and 解除痉挛

C、开放静脉通路，给予输液和药物治疗

D、高压氧治疗

E、防治肺损伤和肺纤维化

答案：E

25、【单选题】患者，李某，由于躁狂症住院治疗，以下关于躁狂症治疗描述不正确的是

A、碳酸锂的治疗与中毒剂量很接近

- B、碳酸锂对预防躁狂或抑郁症复发有效
- C、躁狂症属于心境障碍，所以心理治疗是最重要的治疗方法
- D、对急性兴奋躁动的躁狂患者，可用电抽搐治疗
- E、丙戊酸钠对控制躁狂发作疗效较好

答案：C

26、【单选题】下列哪项为无氧运动形式

- A、长跑
- B、步行
- C、骑车
- D、游泳
- E、举重

答案：E

27、【单选题】乙肝肝硬化大量腹水患者取半坐卧位的原因是

- A、增加回心血量
- B、促进舒适
- C、减轻呼吸困难
- D、减轻心脏负担
- E、有利于腹水消失

答案：C

28、【单选题】被称为“后天之本”的是

- A、心
- B、脾
- C、肝
- D、肾
- E、肺

答案：B

29、【单选题】黄疸按病因学分类, 正确的是

- A、溶血性黄疸
- B、肝细胞性黄疸
- C、胆汁淤积性黄疸
- D、先天性非溶血性黄疸
- E、以上均正确

答案：E

30、【单选题】分离转换障碍与神经系统疾病的感觉障碍的区别在于前者

- A、起病急

- B、感觉障碍较轻
- C、症状持续时间较短
- D、感觉变化与气候相关
- E、感觉障碍与神经分布不相符

答案：E

31、【单选题】谵妄是一组表现为急性广泛性的认知障碍，尤其以下面哪项为主要特征，疾病发展迅速，因此又称为急性脑综合征

- A、记忆损害
- B、注意缺陷
- C、错觉或幻觉
- D、情感障碍
- E、意识障碍

答案：E

32、【单选题】乳糜尿最常见的原因因为

- A、肿瘤
- B、结石
- C、结核
- D、梗阻
- E、丝虫病

答案：E

33、【单选题】银屑病的病因有

- A、遗传
- B、免疫
- C、内分泌
- D、感染
- E、以上均是

答案：E

34、【单选题】男，35岁。不慎溺水，被救后心跳呼吸停止。首要的处理措施是

- A、尽快转运至医院
- B、清除口鼻分泌物及异物
- C、胸外心脏按压
- D、人工通气
- E、大声呼救

答案：B

35、【单选题】男，46岁，因昏迷、尿失禁半小时被送入医院。血压150/90mmHg，多汗、流涎、双侧瞳孔缩小，直径1mm，全身肌肉颤动，双肺可闻及湿罗音，心率48次/min，律齐、无杂音。患者最可能的诊断是

- A、有机磷农药中毒
- B、一氧化碳中毒
- C、安眠药中毒
- D、蛛网膜下腔出血
- E、癫痫持续状态

答案：A

36、【单选题】呋塞米的利尿作用特点是

- A、迅速、强大而短暂
- B、迅速、强大而持久
- C、迅速、微弱而短暂
- D、缓慢、强大而持久
- E、缓慢、微弱而短暂

答案：A

37、【单选题】强直性脊柱炎疼痛的性质：

- A、持续、休息后加重
- B、休息后加重
- C、活动后加重
- D、疼痛剧烈，夜间痛

答案：B

38、【单选题】男，35岁。因车祸由救护车送至急诊，查心率122次/min，血压70/40mmHg，面色苍白，出冷汗，意识模糊，血红蛋白75g/L。该患者最可能发生了

- A、昏迷
- B、失血性休克
- C、心源性休克
- D、感染性休克
- E、创伤性休克

答案：B

39、【案例单选题】女30岁。医生与其交流时表现为沉默寡言，内容空洞、单调，常以“不知道”做答，自觉脑子空洞洞的，没有什么可说的，您认为患者的症状是

- A、思维迟缓

- B、思维贫乏
- C、思维松弛
- D、思维奔逸
- E、象征性思维

答案：B

40、【单选题】以下有关子宫的说法，正确的是

- A、子宫壁厚、腔小
- B、成人未孕子宫前后稍扁、呈倒置的梨形
- C、子宫长 7-9cm, 厚 2-3cm
- D、宫颈下端接阴道前庭
- E、卵巢和输卵管位于子宫两侧

答案：D

41、【单选题】食管癌根治术后胃管常规保留时间为

- A、1 ~ 2d
- B、3 ~ 4d
- C、5 ~ 6d
- D、7 ~ 8d
- E、9 ~ 10d

答案：B

42、【单选题】静脉输液常用晶体溶液和胶体溶液, 以下属于胶体溶液的是

- A、乳酸钠溶液
- B、甘露醇
- C、碳酸氢钠
- D、右旋糖酐
- E、葡萄糖溶液

答案：D

43、【单选题】护士为缺铁性贫血的住院患者进行健康宣教时, 尤其需要注意口服铁剂的护理宣教, 下列宣教错误的是

- A、铁剂应在饭后服用
- B、铁剂禁止与浓茶一起服用
- C、铁剂不能与氨基酸同服
- D、铁剂避免与牛奶、咖啡同服
- E、液体铁剂需用吸管服用

答案：C

44、【单选题】社区诊断与临床诊断的最主要区别是

- A、针对健康与针对疾病
- B、全人群参加与只有患者参加
- C、在医院里与在社区中
- D、事前诊断与事后诊断
- E、通过调查与不需要调查

答案：C

45、【单选题】治疗蛛网膜下腔出血患者，常用的扩张脑血管作用较强的钙通道阻滞药是

- A、维拉帕米
- B、尼莫地平
- C、地尔硫卓
- D、氨氯地平
- E、硝苯地平

答案：B

46、【单选题】对病室空气相对湿度要求较高的患者是

- A、气管切开
- B、急性胃炎
- C、急性阑尾炎
- D、心绞痛
- E、风湿性心脏病

答案：A

47、【单选题】输血最常见的并发症是

- A、溶血反应
- B、过敏反应
- C、发热反应
- D、细菌污染反应
- E、循环负荷过重

答案：C

48、【单选题】以下哪项是患者跌倒的环境因素

- A、昏暗的灯光，湿滑、不平坦的路面
- B、不合适的家具高度和摆放位置
- C、卫生间没有扶栏、把手
- D、台阶和人行道缺乏修缮
- E、以上都是

答案：E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/205301242230011104>