

泌尿外科规培护士 8 月份考核试题

1. 确诊膀胱结石最佳方法是 [单选题] *

- A、膀胱镜检查(正确答案)
- B、双合诊检查
- C、B超

2. 右肾绞痛伴有镜下血尿，进一步检查应先进行 [单选题] *

- A、膀胱镜
- B、腹部平片(正确答案)
- C、尿脱落细胞检查

3. 诊断尿路结石首选的辅助检查是 [单选题] *

- A、腹部平片+静脉尿路造影(正确答案)
- B、MRI
- C、肾动脉造影

4. 上尿路结石典型的症状是 [单选题] *

- A、尿频+尿痛
- B、腰痛+血尿(正确答案)
- C、腰痛+脓尿
- D、B 【答案解析】 上尿路结石主要表现是与活动有关的疼痛与血尿。

5. 两次体外冲击波碎石，治疗间隔时间应大于 [单选题] *

- A、7天(正确答案)
- B、5天

C、10天

6. 肾结石患者的主要症状是 [单选题]*

A、活动后镜下血尿(正确答案)

B、排尿艰难

C、尿频、尿急

7. 输尿管结石的主要症状为 [单选题]*

A、无痛性全程血尿

B、肾绞痛+镜下血尿(正确答案)

C、尿痛、尿频

8. 男性患者，50岁，排尿过程中蓦地尿流中断，疼痛剧烈，改变体位后又可排尿，应考虑 [单选题]*

A、肾结石

B、输尿管结石

C、膀胱结石(正确答案)

9. 预防泌尿系统结石即简单且最有效的方法是 [单选题]*

A、多饮水(正确答案)

B、多食含钙高食物

C、调节尿液 pH 值

10. 预防上尿路结石的措施不正确的是 [单选题]*

A、多饮浓茶，以起到利尿作用(正确答案)

B、少食用富含草酸的食物

C、少吃动物蛋白

11. 体外冲击波碎石的适应证，错误的是() [单选题]*

- A.下尿路梗阻(正确答案)
- B.肾功能检查、血肌酐小于 265umol / L
- C.无急性尿路感染
- D.手术残留或者复发性肾结石
- E.结石在 1cm 以上

12. 预防肾和输尿管结石形成和增大的最有效的方法是() [单选题]*

- A.大量饮水(正确答案)
- B.应用抗生素
- C.口服维生素 C
- D.碱化尿液
- E. 以上全是

13. 膀胱结石的典型症状是() [单选题] *

- A.排尿艰难
- B.排尿蓦地中断(正确答案)
- C.膀胱刺激征
- D.血尿
- E.恶心、呕吐

14. 关于肾与输尿管结石引起的疼痛，错误的是() [单选题] *

- A.较小，易活动的结石表现为肾绞痛
- B.较大结石表现为钝痛
- C.普通疼痛与活动无关(正确答案)
- D.当结石嵌顿时可引起剧烈肾绞痛
- E. 以上全是

15. 结石引起肾绞痛时，应首先采用() [单选题] *

- A.给抗感染药物
- B.手术取石
- C. 中西医排石治疗
- D.解痉止痛(正确答案)
- E.给镇静药物

16. 输尿管结石的主要症状为 () [单选题] *

- A.无痛性全程血尿
- B.肾绞痛+镜下血尿(正确答案)
- C.尿痛、尿频
- D.排尿艰难
- E.尿失禁

17. 输尿管结石在 x 线平片上显影率约占结石总数的() [单选题] *

- A.10%
- B.30%
- C.50%
- D.80%
- E.95%(正确答案)

18. 输尿管结石发生肾功能不全的原因是() [单选题] *

- A. 肾绞痛
- B.双侧结石梗阻(正确答案)
- C.饮水过少
- D.输尿管黏膜损伤
- E.排尿艰难

19. 突发左腰部疼痛伴肉眼血尿的中年男性病人应首先考虑() [单选题] *

- A. 肾癌
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 肾、输尿管结石(正确答案)
- D. 输尿管癌
- E. 肾结核

20. 为了解有无合并尿路感染需检查() [单选题] *

- A. 血常规
- B. 尿常规+尿培养(正确答案)
- C. X 线光片
- D. 排尿性尿路造影
- E. CT

21. 输尿管结石的血尿() [单选题] *

- A. 无痛性肉眼血尿
- B. 疼痛后血尿(正确答案)
- C. 终末血尿
- D. 血尿进行性加重

22. 肾结石患者的主要症状：() [单选题] *

- A. 尿失禁
- B. 排尿艰难
- C. 尿频尿急
- D. 活动后镜下血尿(正确答案)

23. 肾结石患者行非手术治疗，为酸化尿液宜服用：() [单选题] *

- A. 维生素 B1

B.呋喃硫胺

C.氯化铵(正确答案)

D.碳酸钙

24. 输尿管切开取石术后，为减少结石复发，下列做法正确的是：() [单选题] *

A.尿酸结石者避免浓茶等含草酸量高的食物，宜食动物内脏

B.含钙结石者宜食用含纤维丰富的食物(正确答案)

C.成年人每日尿量应保持在 1000ml 以上

D.长期卧床者注意大量补钙和功能锻炼，防止骨脱钙

25. 离心尿每高倍镜视野红细胞超过 () 个为镜下血尿： [单选题]*

A. 0 个

B. 3 个(正确答案)

C. 5 个

D. 10 个

26. 离心尿每高倍镜视野白细胞超过 个为镜下脓尿：() [单选题]*

A. 0 个

B. 3 个(正确答案)

C. 5 个

D. 10 个

27. 膀胱结石的主要临床表现：() [单选题] *

A.尿频、尿急、尿痛(正确答案)

B.排尿中断

C.肉眼血尿

D.脓尿

28. 输尿管切开取石术围手术期护理，下列哪项不正确：() [单选题] *

A.术前遵医嘱予抗生素控制感染

B.术前 1 小时拍腹部平片

C.术后绝对卧床 2 周(正确答案)

D.术后密切监测生命体征，注意伤口敷料、引流管氧流量及尿量

29. 含钙结石者应：() [单选题] *

A. 使用含纤维丰富的食物(正确答案)

B. 大量摄入动物蛋白、精制糖和动物脂肪

C.食用含草酸高的食物

D.食用含钙高的食物

30. 10 . 关于 ESWL 下列说法错误的是：() [单选题] *

A.两次治疗时间间隔大于 7 天

B.合用于直径小于 2.5cm 的结石

C.下尿路结石合用此方法(正确答案)

D.优点是无伤口、恢复快、价格低

31. 下列哪项是膀胱结石最典型的症状 [单选题] *

尿频

尿急

排尿终末痛

排尿蓦地中断(正确答案)

放射痛

32. 上尿路结石位于 [单选题] *

肾(正确答案)

膀胱

前列腺

尿道

33. 5cm 的肾结石，下列哪项护理措施是正确的 [单选题] *

指导患者绝对卧床歇息

指导患者大量饮水以促进结石排出(正确答案)

饮食无禁忌

禁止使用止痛药物，防止影响病情观察

34. 泌尿系结石最常见的类型为 [单选题] *

碳酸钙

磷酸钙

尿酸钙

草酸钙(正确答案)

35. 体外冲击波碎石术护理错误的是 [单选题] *

鼓励病人多喝水

饮食无禁忌，可喝牛奶(正确答案)

时常变换体位，多活动

观察排尿情况

36. 双 J 管的作用不包括() [单选题] *

A 支撑、引流

B 扩张输尿管、助于结石排除

C 减轻疼痛(正确答案)

37. 对侧肾功能良好的肾结石患者，下列()情况可做患侧肾切除 [单选题] *

- A 肾盂结石功能尚好
- B 肾盏结石
- C 肾下及多发结石
- D 鹿角形结石合并肾积水
- E 肾多发结石合并肾积水，肾功能丧失(正确答案)

38. 少尿是指每日尿量少于()ml [单选题] *

- A 100
- B 300
- C 400(正确答案)
- D 1000

39. 输尿管结石临床症状，下列哪项错误() [单选题] *

- A 疼痛
- B 血尿
- C 尿频、尿急、尿痛
- D 结石越大症状越明显(正确答案)

40. 输尿管 3 个生理狭窄不包括() [单选题] *

- A 肾盂输尿管连接处
- B 输尿管跨过髂血管处
- C 输尿管膀胱壁段
- D 尿道口(正确答案)

41. 尿道结石的主要症状是() [单选题] *

- A 排尿艰难、排尿痛(正确答案)
- B 运动后血尿

- C 肾绞痛
- D 全程血尿
- E 排尿中断

42. 患者男，28岁。11天前无明显诱因蓦地发作，剧烈疼痛，呈绞痛，向下腹、大腿内侧及会阴部放射，伴恶心、呕吐、面色苍白、大汗淋漓。尿常规显示大量红细胞。该患者符合下列哪种疾病？ [单选题] *

- A 尿路感染
- B 输尿管结石(正确答案)
- C 急性肾盂肾炎
- D 急性肾小球肾炎
- E 急性肾衰竭

43. 患者男，35岁，运动后突发右下腹阵发性剧烈疼痛伴恶心呕吐及镜下血尿，应考虑是() [单选题] *

- A 急性阑尾炎
- B 膀胱结石
- C 右输尿管结石(正确答案)
- D 急性胆囊炎
- E.肠套叠

44. 关于B超检查在诊断尿路结石方面的价值，下列哪项错误的() [单选题] *

- A 能发现尿路平片不能显示的小结石和透光结石
- B 能发现结石所致的肾脏结构改变
- C 可直接显示双肾功能改变(正确答案)
- D 可用于无尿、慢性肾衰竭的患者
- E 可用于对碘剂过敏或者孕妇合并结石的患者

45. 体外冲击波碎石的禁忌症应除外() [单选题] *

A 妊娠

B 过于肥胖，影响焦虑

C 严重尿路感染

D 结石以下有梗阻

E 鹿角形结石(正确答案)

46. 结石沿输尿管行径挪移，常停留或者嵌顿于三个生理狭窄处，以哪里多见 [单选题] *

输尿管上 1/3 处

输尿管中段

输尿管下 1/3 处(正确答案)

47. 肾损伤患者绝对卧床休息时间为 [单选题] *

两周

尿液转清后

尿液转清后继续休息两周(正确答案)

48. 膀胱尿道镜主要用于 [单选题] *

确定血尿的原因及出血部位。(正确答案)

输尿管疾病的诊断。

输尿管肿瘤的活检。

49. 膀胱结石的主要临床表现是 [单选题] *

血尿

膀胱刺激征(正确答案)

排尿艰难

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/228040133127006035>