

灾难护理学理论知识考核

一、单项选择题

1. 复苏时，口对口人工呼吸与胸外心脏按压的比例为（ ）[单选题] *

A . 1:1

B . 1:5

C . 1:10

D . 3:20

E . 2:30✓

2. 复苏时，胸外心脏按压的部位是（ ）[单选题] *

A . 心前区

B . 胸骨上段

C . 胸骨下段

D . 胸骨正中

E . 胸骨中下 1/3 交界处✓

3. 对脊椎损伤者的搬动正确的是（ ）[单选题] *

A . 随便搬动

B . 抱扶行走

C . 3 ~ 4 人手从后背插入一齐协调抬起✓

D . 一人抬上身，一人抬下身，同时用力

E . 双手在病人头、肩、臀部同时施力，以保证身体以脊柱做一轴线转动

4. 固定的作用是 () [单选题] *

- A. 限制受伤部位的活动度, 减轻疼痛
- B. 有利于防治休克
- C. 防止闭合性骨折变为开放性骨折
- D. 防止骨折断端损伤血管、神经
- E. 以上都是 ✓

5. 包扎的作用有 () [单选题] *

- A. 保护创面
- B. 压迫止血
- C. 固定骨折、关节
- D. 固定敷料药品
- E. 以上都是 ✓

6. 对疑有颈部损伤者开放气道常用的方法 () [单选题] *

- A. 仰头抬颈法
- B. 仰面举颊法
- C. 托下颌法 ✓
- D. 仅清除口中异物
- E. 只松解病人的衣领

7. 口对口人工呼吸每次吹气应持续 () [单选题] *

- A. 1 秒以上 ✓
- B. 2 秒以上
- C. 3 秒以上

D . 4 秒以上

E . 越长越好

8 . 口服毒物中毒的病人在哪种情况下不宜采用吸引器洗胃 () [单选题] *

A . 昏迷

B . 妊娠

C . 伴有器质性心脏病

D . 体质衰弱

E . 腐蚀剂中毒 ✓

9 . 抢救急性中毒病人最为重要的处理措施是 () [单选题] *

A . 立即停止接触毒物 ✓

B . 马上查清毒物种类

C . 迅速做出明确诊断

D . 控制病人的随意走动

E . 保护重要脏器功能

10 . 抢救心脏骤停心脏按压时 , 下压的深度应为 () [单选题] *

A . 1 ~ 2cm

B . 2 ~ 3cm

C . 3 ~ 4cm

D . 至少 5cm ✓

E . 3 . 5 ~ 4.5cm

11 . 气管插管病人一般采取 () [单选题] *

A . 颈仰卧位 ✓

- B . 侧卧位
- C . 半卧位
- D . 俯卧位
- E . 膝胸卧位

12 . 气管插管留置时间不宜超过 () [单选题] *

- A . 24 小时
- B . 48 小时
- C . 36 小时
- D . 72 小时✓
- E . 96 小时

13 . 口对口人工呼吸 , 对成人吹气频率为 () [单选题] *

- A . 2~5 次 / 分
- B . 5 ~8 次 / 分
- C . 8~10 次 / 分✓
- D . 14 ~16 次 / 分
- E . 16 ~15 次 / 分

14 . 抢救成人心脏骤停心脏按压的次数应是 () [单选题] *

- A . 40 次 / 分
- B . 60 次 / 分
- C . 80 次 / 分
- D . 至少 100 次 / 分✓
- E . 等于 100 次 / 分

15. 一般伤口出血简单而有效的止血方法是 () [单选题] *

- A. 指压止血法
- B. 压迫包扎止血法 ✓
- C. 填塞止血法
- D. 止血带止血法
- E. 钳夹止血法

16. 适用于关节部位包扎的方法是 () [单选题] *

- A. 环形
- B. "8" 字形 ✓
- C. 螺旋形
- D. 螺旋反折形
- E. 回反形

17. 李先生, 男, 50 岁, 因肺癌手术后进行气管插管吸氧, 气管插管后随时检查导管是否通畅, 每次吸痰时间不应大于 () [单选题] *

- A. 5 秒
- B. 10 秒
- C. 15 秒 ✓
- D. 20 秒
- E. 25 秒

18. 小明在打球时摔伤左臂疼痛剧烈, 经 x 片确诊为左侧挠骨骨折, 须矫正后行绷带固定, 应准备的绷带是 () [单选题] *

- A. 纱布绷带

- B . 棉布绷带
- C . 弹性绷带
- D . 石膏绷带✓
- E . 三角巾

19 . 老王上山采药时 , 不慎摔伤 , 右小腿骨折 , 其同伴找来树枝帮其固定 , 撕下衣片作绷带 , 但长度不够 , 他应选择的包扎方法是 () [单选题] *

- A . 环形
- B . 蛇形✓
- C . 螺旋形
- D . 螺旋反折形
- E . 回反形

20 . 由于车祸导致张先生严重损伤 , 用汽车转运该病人时 , 病人应保持何种体位 () [单选题] *

- A . 头在前平卧位
- B . 头在后平卧位✓
- C . 侧卧位
- D . 坐位
- E . 半卧位

21 . 下列哪项不是灾难伤员的现场紧急救护原则? () [单选题] *

- A . 生命质量第一原则✓
- B . 快速及时原则
- C . 救治与转运相结合的原则
- D . 合理顺序原则

E . 前后衔接原则

22 . 口对口人工呼吸施行过程中的压额抬颏法步骤的主要目的是什么 () [单选题] *

A . 清除食道内的异物

B . 开放气道 , 维持呼吸道的畅通 ✓

C . 检查呼吸的有无

D . 检查颈动脉脉搏

E . 看口唇的颜色

23 . 复苏的首要步骤是 () [单选题] *

A . 呼救

B . 判断心脏是否停搏

C . 开放气道 , 保持呼吸道通畅

D . 口对口人工呼吸

E . 胸外心脏按压 ✓

24 . 对疑有颈部损伤者开放气道常用的方法 () [单选题] *

A . 仰头抬颈法

B . 仰面举颊法

C . 托下颌法 ✓

D . 仅清除口中异物

E . 只松解病人的衣领

(25~27 题共用题干) 男性 , 25 岁 , 因车祸造成脊柱损伤 , 小腿有开放性伤口。

25 . 该病人小腿的伤口用下列哪种止血方法 () [单选题] *

- A . 指压止血法
- B . 压迫包扎止血法✓
- C . 填塞止血法
- D . 止血带止血法
- E . 钳夹止血法

26 . 该病人小腿的伤口用下列哪种包扎法() [单选题] *

- A . 环形
- B . 螺旋形
- C . 螺旋反折形✓
- D . “ 8 ” 字形
- E . 回反形

27 . 该病人搬运时应选用下列何种方法 () [单选题] *

- A . 抱持搬运法
- B . 背负搬运法
- C . 软质担架搬运法
- D . 硬质担架搬运法✓
- E . 拉车搬运法

28 . 猝死病人抢救的最佳时间是 () [单选题] *

- A . 4 分钟✓
- B . 8 分钟
- C . 10 分钟
- D . 30 分钟

E . 60 分钟

29 . 动脉出血的特点是 () [单选题] *

A . 血色鲜红

B . 血流急

C . 呈喷射状

D . 出血在断裂血管的近心端

E . 以上都是✓

30 . 电击除颤，首次电击的能量可选 () [单选题] *

A . 100J

B.200J✓

C . 300 J

D . 320J

E . 360 J

31.肺鼠疫在大、中城市发生，并有扩散趋势的鼠疫疫情属于几级 () [单选题] *

A. I 级✓

B. II 级

C. III 级

D. IV 级

E. V 级

32.什么是低镁血症 () [单选题] *

A.血清镁低于 0.55mmol/L

B.血清镁低于 0.75mmol/L✓

C.血清镁低于 0.65mmol/L

D.血清镁低于 0.90mmol/L

E.血清镁低于 0.80mmol/L

33.将经过营养风险筛选总分为多少时属于营养支持的指征 () [单选题] *

A.等于或大于 2 分

B.等于或大于 3 分✓

C.等于或大于 4 分

D.等于或大于 5 分

E.等于或大于 6 分

34.止血带止血时应隔多久放松一次 () [单选题] *

A.3 小时

B.2.5 小时

C. 2 小时

D. 1.5 小时

E.1 小时✓

35.常用脉率/收缩压计算休克指数，帮助判断休克有无及轻重。当此指数值为多少时属于严重休克 ()

[单选题] *

A.等于 0.5

B.大于 1.0

C.小于 1.0

D.大于 2.0✓

E.小于 2.0

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/235330011123011111>