

# 医院医疗机构麻醉科医生招聘考试试题

## 一、选择题

1. 下列哪个部位施行局部麻醉时麻醉药可加肾上腺素( ) [单选题] \*

- A、高血压病人椎管内麻醉
- B、疝气修补，局部浸润麻醉✓
- C、阴茎神经阻滞
- D、指间神经阻滞
- E、气管内粘膜麻醉

2. 下列哪种吸入麻醉药可引起弥散性缺氧( ) [单选题] \*

- A、恩氟烷
- B、异氟烷
- C、七氟烷
- D、氧化亚氮✓
- E、地氟烷

3. 下列哪种吸入麻醉药麻醉效能最低( ) [单选题] \*

- A、安氟醚
- B、异氟醚
- C、氟烷
- D、七氟醚
- E、地氟醚✓

4. 椎管内麻醉对生理的影响下列叙述哪项不正确( ) [单选题] \*

- A、阻断阻滞区域交感神经使动脉舒张、静脉扩张，使心血量减少
- B、低血压的发生率与麻醉平面有关
- C、高平面麻醉可使心率减慢
- D、休克病人宜选用椎管内麻醉✓
- E、高血压病人不是椎管内麻醉的禁忌

5. 下列哪种吸入麻醉药可引起痉挛性脑电图改变( ) [单选题] \*

- A、安氟醚✓
- B、异氟醚
- C、氟烷
- D、七氟醚
- E、地氟醚

6 下列吸入麻醉药属气体麻醉药是( ) [单选题] \*

- A、氧化亚氮✓
- B、恩氟烷(安氟醚)
- C、异氟烷(异氟醚)
- D、七氟烷(七氟醚)
- E、地氟烷(地氟醚)

7. 有关下列吸麻醉药特点哪项不正确( ) [单选题] \*

- A、氧化亚氮 MAC 高麻醉效能强✓
- B、氧化亚氮麻醉可产生弥散性缺氧
- C、氧化亚氮可使体内封闭空腔内压增加

D、氧化亚氮对循环影响小

E、氧化亚氮常与其它麻醉药复合使用

8. 下列哪个部位施行局部麻醉时麻醉药内不宜加肾上腺素( ) [单选题] \*

A、臂丛麻醉

B、椎管内麻醉

C、趾间神经阻滞✓

D、乳腺肿块的区域阻滞

E、腹壁脂肪瘤的区域阻滞

9. 局麻药内加肾上腺素的主要目的是( ) [单选题] \*

A、增强麻醉药的效能

B、加快药物的吸收代谢

C、预防过敏反应

D、局部血管收缩，延缓药物吸收✓

E、对抗局麻药的副作用

10. 有关局部麻醉方法下列叙述哪项不正确( ) [单选题] \*

A、粘膜麻醉以选用渗透能力强的局麻药

B、局部浸润麻醉需用药量大时宜选用毒性低的药物，并使用最低有效浓度

C、神经阻滞麻醉以普鲁卡因为首选✓

D、布比卡因一般不应用于做局部浸润麻醉

E、区域阻滞可避免穿刺肿瘤组织

11. 下列哪种药物可抑制肾上腺皮质功能( ) [单选题] \*

A、普鲁泊福(异丙酚)

- B、氧化亚氮
- C、硫喷妥钠
- D、依托咪酯✓
- E、安氟醚

12 . 下列药物作为麻醉诱导时对循环影响最小( ) [单选题] \*

- A、硫喷妥钠
- B、氯胺酮
- C、依托咪酯✓
- D、羟丁酸钠
- E、普鲁泊福(异丙酚)

13 . 某冠心病患者择期手术麻醉诱导药物宜选择( ) [单选题] \*

- A、硫喷妥钠
- B、氯胺酮
- C、依托咪酯✓
- D、羟丁酸钠
- E、普鲁泊福

14 . 下列哪种是去极化肌肉松弛剂( ) [单选题] \*

- A、琥珀胆碱✓
- B、泮库溴库
- C、维库溴铵
- D、筒箭毒碱
- E、阿曲库胺

15. 使用肌肉松弛剂时应注意，除外( ) [单选题] \*

- A、保持呼吸道通畅应行气管插管控制呼吸
- B、肌松药可单独应用于手术病人 ✓
- C、琥珀胆碱有升高血钾、眼压和颅内压作用
- D、重症肌无力患者对肌松药异常敏感
- E、部分肌松药有阻胺释放作用

16. 下列哪种情况是去极化肌松药的禁忌( ) [单选题] \*

- A、严重创伤
- B、大面积烧伤
- C、高位截瘫
- D、青光眼
- E、以上都是 ✓

17. 某严重创伤病人使用琥珀胆碱后发生心跳骤停最可能的原因是 [单选题] \*

- A、低血压
- B、高钾 ✓
- C、低钠
- D、酸中毒
- E、颅内压升高

18. 有关依托咪酯的叙述哪项不正确( ) [单选题] \*

- A、可降低颅内压
- B、可降低脑代谢
- C、对血压和心排出量影响小

D、可产生注射后疼痛

E、作为麻醉维持用药✓

19 . 不能经抗胆碱酯酶药拮抗的药物是( ) [单选题] \*

A、琥珀胆碱✓

B、泮库溴铵

C、维库溴铵

D、筒箭毒碱

E、阿曲库胺

20 . 经过霍夫曼(Hofmann)消除的药物是( ) [单选题] \*

A、琥珀胆碱

B、泮库溴铵

C、维库溴铵

D、筒箭毒碱

E、阿曲库胺✓

21 . 严重创伤病人不宜使用下列哪种肌松药物( ) [单选题] \*

A、琥珀胆碱✓

B、泮库溴铵

C、维库溴铵

D、筒箭毒碱

E、阿曲库胺

22 . 下列哪种不是琥珀胆碱的副作用( ) [单选题] \*

A、心动过缓

- B、血钾升高
- C、血压升高✓
- D、术后肌疼
- E、眼压升高

23 . 下列哪种吸入麻醉后禁忌与肾上腺素配伍( ) [单选题] \*

- A、安氟醚
- B、异氟醚
- C、氟烷✓
- D、七氟醚
- E、地氟醚

24 . 下列哪种药物最适合于门诊手术( ) [单选题] \*

- A、硫喷妥钠
- B、氯胺酮
- C、依托咪酯
- D、羟丁酸钠
- E、异丙酚✓

25 . 下列哪种药物的镇痛效能最强( ) [单选题] \*

- A、硫喷妥钠
- B、氯胺酮✓
- C、依托咪酯
- D、羟丁酸钠
- E、普鲁泊福(异丙酚)

26. 循环紧闭式呼吸环路系统特点，除外( ) [单选题] \*

- A、便于病人的呼吸管理，可行辅助呼吸和控制呼吸
- B、呼出气体中麻醉药可再利用
- C、不能保持吸入气体的温度和湿度接近生理状态✓
- D、结构复杂，呼吸道阻力大
- E、呼吸环路中必须设有 CO<sub>2</sub> 吸收器

27. 下列哪项不是氯胺酮麻醉的特点( ) [单选题] \*

- A、起效快，维持时间短
- B、镇痛作用强，镇静作用相对弱
- C、兴奋交感神经
- D、使用途径只适于深部肌肉注射✓
- E、可扩张支气管

28. 下列哪种药物可出现精神症状( ) [单选题] \*

- A、硫喷妥钠
- B、氯胺酮✓
- C、依托咪酯
- D、羟丁酸钠
- E、普鲁泊福(异丙酚)

29. 下列哪项不是氯胺酮的作用( ) [单选题] \*

- A、降低颅内压✓
- B、升高血压
- C、增加眼内压



D、心率增快

E、唾液分泌增加

30 . 有关硫喷妥钠的作用特点下列哪项不正确( ) [单选题] \*

A、降低颅内压

B、直接抑制心脏扩张血管

C、扩张支气管✓

D、高脂溶性，具有再分布特点

E、使喉头敏感性增强

31 . 有关硫喷妥钠的临床应用下列哪项不正确( ) [单选题] \*

A、全麻诱导

B、麻醉维持✓

C、短小手术

D、控制惊厥

E、小儿基础麻醉

32 . 硫喷妥钠的叙述哪项不正确( ) [单选题] \*

A、属于苯二氮卓类药物✓

B、起效快，维持时间短

C、具有抗惊厥作用

D、对循环有明显抑制作用

E、能抑制交感神经使迷走神经作用相对增强

33 . 麻药的全身效应以哪个系统最敏感( ) [单选题] \*

A、心血管系统

B、中枢神经系统✓

C、呼吸系统

D、泌尿系统

E、消化系统

34 . 吸入麻醉药的主要排出途径( ) [单选题] \*

A、肾

B、肝

C、皮肤

D、呼吸道✓

E、胆汁

35 . ASA 分级标准哪项不正确( ) [单选题] \*

A、 I 级 身体健康，发育营养不良，各器官功能正常

B、 II 级 除外科疾病外，有轻度并存病，功能代偿健全，

C、 III 级 并存病较严重，体力活动有限，生活不能自理✓

D、 IV 级 并存病严重，丧失日常工作能力，经常面临生命威胁

E、 V 级：无论手术与否，生命难以维持 24 小时的濒死病人

36 . 麻醉前准备事项哪项不正确( ) [单选题] \*

A、纠正或改善病理生理状态

B、高血压病人抗高血压药物术前应停用✓

C、精神状态准备

D、胃肠道准备

E、麻醉设备和用具及药品准备

37. 有关术前禁食禁饮哪项不正确( ) [单选题] \*

- A、应激情况胃排空加速✓
- B、成人禁食 8 小时，禁饮 2 小时
- C、小儿禁食 4 小时，禁水 2 小时
- D、急症病人病情紧急时，不能等待禁食，应立即手术
- E、饱胃病人必需立即手术时，应采取避免呕吐误吸的措施

38. 有关术前准备哪些正确( ) [单选题] \*

- A、高血压病术前宜使用中枢性降压药
- B、抗高血压治疗应持续到手术当日✓
- C、术前高血压病人，术前血压应降至正常水平
- D、血压高不宜行择期手术
- E、单胺氧化酶抑制剂不影响病人手术中血压情况

39. 麻醉前用药的目的不包括( ) [单选题] \*

- A、清除病人紧张焦虑
- B、预防术后感染✓
- C、提高病人疼痛阈值减轻痛苦
- D、抑制呼吸道腺体分泌功能
- E、减轻或清除手术或麻醉引起的不良反射

40. 下列叙述哪项不正确( ) [单选题] \*

- A、抗胆碱药目前并不常规作为术前用药
- B、阿托品的中枢作用弱于东莨菪碱
- C、东莨菪碱对心率增快的影响弱于阿托品

D、抗胆碱药不影响散热✓

E、抗胆碱能减轻椎管内麻醉时迷走神经亢进反应

41. 术前用药的使用原则下列叙述哪项正确( ) [单选题] \*

A、老人、小儿宜用麻醉性镇痛药于手术前缓解疼痛

B、老人、小儿宜首选东莨菪碱

C、婴幼儿代谢率高镇静药相对较大

D、小儿腺体分泌旺盛，术前抗胆碱药量可偏大✓

E、术前用药只能采用肌肉注射途径给药

42. 术前用药原则下列哪项不正确( ) [单选题] \*

A、一般情况差，老年体弱术前用药应酌情减量

B、冠心病、高血压病人镇静药可适当加量

C、选择椎管内麻醉者一般不用抗胆碱药

D、全身麻醉一般使用镇静药和抗胆碱药✓

E、有呼吸抑制的病人一般术前不使用镇静药和阿片类药物

43. 下列有关术前常用药物的叙述哪些不正确( ) [单选题] \*

A、地西洋具有镇静、催眠、抗焦虑及抗惊厥的作用

B、苯巴比妥具有镇静、催眠和抗惊厥的作用

C、抗胆碱药能拮抗 N 受体激动剂作用✓

D、阿托品有明显抑制汗腺分泌的能力

E、镇静催眠药均具有对局麻药毒性反应也有一定的防治作用

44. 影响吸入麻醉药吸收的因素，下列哪项不正确( ) [单选题] \*

A、通气效应即有效肺泡通气量

B、浓度效应，即吸入药浓度

C、心输出量

D、血气分配系数，指药物的溶解度

E、最低肺泡有效浓度✓

45. 有关美国麻醉医师协会(ASA)分级下列哪项正确( ) [单选题] \*

A、I级病人病情最重，V级最轻

B、Ⅲ级病人的器官功能已受损但在代偿范围内✓

C、V级病人风险大，但仍可考虑行择期手术

D、体格健康，发育营养良好各器官功能正常属Ⅱ级

E、I级病人无手术死亡率

46. 有关美国麻醉医师协会(ASA)分级下列哪项不正确( ) [单选题] \*

A、ASA 分级分为 6 级

B、分级越高，病情越重，死亡率也越高

C、急性阑尾炎病人有发热、无伴随病应分类为 I 级✓

D、V级者为濒死病人，麻醉和手术异常危险

E、Ⅲ级病人如术前准备充分，尚能耐受手术

47. 腋路法行臂丛神经阻滞出现阻滞不全哪项多见( ) [单选题] \*

A、桡神经✓

B、尺神经

C、正中神经

D、中正神经和尺神经

E、中正神经和桡神经

48. 星状神经节阻滞的标志是( ) [单选题] \*

- A、霍纳氏征✓
- B、眼睑下垂
- C、Bell 征
- D、声嘶
- E、瞳孔扩大

49. 颈丛阻滞和星状神经节阻滞术病人偶尔出现声音嘶哑，最可能的原因是( ) [单选题] \*

- A、喉返神经阻滞✓
- B、喉上神经阻滞
- C、舌咽神经阻滞
- D、颈交感神经阻滞
- E、膈神经阻滞

50. 有关控制性降压原则，下列哪项不正确( ) [单选题] \*

- A、保证组织、器官的血流灌注量，满足机体的需要
- B、降压时间以满足手术需要为准✓
- C、血压降低程度为基础血压的 30%为标准
- D、当平均压以下降低于 60mmHg，可致脑供血不足
- E、收缩压低于 80mmHg，肾小球滤过率可能降低

51. 下列控制性降压的方法哪项不正确？( ) [单选题] \*

- A、嗜铬细胞瘤摘除术，宜用氟烷降压✓
- B、氟烷、异氟醚、安氟醚通过加深麻醉而达到降压效果
- C、控制性降压药物宜选用起效快，维持时间短，可控性好的药物

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/248004062017006032>