
2020年海南省《内科护理学》测试卷

考试须知：

- 1、考试时间：180 分钟。
- 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
- 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的地方填写您的答案。
- 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
- 5、答案与解析在最后。

姓名：_____

考号：_____

得分	评卷人

一、A1(共 30 题)

1. 下列乙肝病毒标志物检查结果中, 提示病毒复制活跃的是

- A. 抗-HBs(+)
- B. 抗-HBc(+)
- C. HBsAg(+), HBeAg(+)
- D. HBsAg(+), HBeAg(-), i-HBe(+)
- E. HBsAg(+), HBeAg(-), ti-HBc(+)

2. 流行性出血热的低血压休克期多发生于病程的()。

- A. 1~2天
- B. 2~4天
- C. 4~6天
- D. 6~8天
- E. 8~12天

3. 系统性红斑狼疮患者出现胸膜炎考虑损害了()。

-
- A. 循环系统
 - B. 造血系统
 - C. 泌尿系统
 - D. 神经系统
 - E. 呼吸系统
4. 心力衰竭患者多吃粗纤维食物的用意是()。
- A. 增进食欲
 - B. 增强心肌收缩
 - C. 减少食物热量
 - D. 减少便秘
 - E. 避免低血钾
5. 慢性肾衰竭患者发生营养失调的相关因素一般不包括()。
- A. 厌食
 - B. 呕吐
 - C. 低蛋白饮食
 - D. 代谢障碍
 - E. 尿蛋白丢失
6. 甲型肝炎的隔离期限为()。
- A. 病后3~4周
 - B. 病后1~2个月
 - C. 病后2个月
 - D. 病后5~7周
 - E. 病后3~5个月
7. 解磷定或双解磷类药物作用是()。
- A. 直接兴奋大脑

-
- B. 使锥体束兴奋
- C. 解除迷走神经兴奋
- D. 恢复胆碱酯酶活性
- E. 解除交感神经兴奋
8. 再生障碍性贫血与急性白血病的主要区别为()。
- A. 全血细胞减少
- B. 有无肝脾大
- C. 网织红细胞缺乏
- D. 外周血中有无幼稚细胞
- E. 骨髓象特点
9. 类风湿性关节炎缓解期间, 指导患者活动的目的是()。
- A. 防止疾病复发
- B. 保持关节功能位
- C. 防止关节畸形
- D. 减少晨僵发生
- E. 防止关节僵硬和肌肉萎缩
10. 紧急胃镜检查应在上消化道出血后()。
- A. <24小时
- B. 24~48小时
- C. 48~72小时
- D. >72小时
- E. 出血停止
11. 流行性脑脊髓膜炎败血症期的主要表现为()。
- A. 发热、头痛、呕吐
- B. 发热、惊厥

-
- C. 发热、关节痛
- D. 发热、淤点、淤斑
- E. 发热、皮肤感觉过敏
12. 目前认为艾滋病的传播途径不包括()。
- A. 性传播
- B. 静脉滥用毒品而传播
- C. 输血及血制品
- D. 母婴垂直传播
- E. 昆虫叮咬传播
13. 短暂性脑缺血发作()。
- A. 持续时间不超过1小时
- B. 持续时间不超过24小时
- C. 持续时间不超过2天
- D. 持续时间不超过1周
- E. 持续时间不超过3周
14. 流行性出血热早期休克属于()。
- A. 心源性休克
- B. 过敏性休克
- C. 神经源性休克
- D. 低血容量性休克
- E. 感染性休克
15. 慢性喘息型支气管炎的特点是()。
- A. 呼气性呼吸困难, 双肺布满哮鸣音
- B. 端坐呼吸, 双肺底水泡音
- E. 进行性呼吸困难, 咳嗽, 痰中带血

-
16. 系统性红斑狼疮临床累及关节、肌肉可表现为()。
- A. 关节畸形
 - B. 关节附近肌肉萎缩
 - C. 非畸形性关节炎
 - D. 梭状指
 - E. 天鹅颈样畸形
17. 主动脉瓣关闭不全可致()。
- A. 下肢水肿
 - B. 心包炎
 - C. 脉压增大
 - D. 腹膜炎
 - E. 右心衰
18. 某下肢瘫痪患者, 经查肢体能在床面上滑动但不能自行抬起, 此肌力应判为()。
- A. 0级
 - B. 1级
 - C. 2级
 - D. 3级
 - E. 4级
19. 一般认为除下列哪项外, 均和白血病发病有关()。
- A. 病毒感染
 - B. 电离辐射
 - C. 遗传因素
 - D. 化学及某些药物因素
 - E. 免疫功能亢进
20. 我国狂犬病的主要传染源是()。

-
- A. 患者
 - B. 病犬
 - C. 家猫
 - D. 野狼
 - E. 吸血蝙蝠

21. 关于口服铁剂的护理, 下列哪项不正确()。

- A. 应在饭后服用
- B. 禁饮浓茶
- C. 不能与氨基酸同服
- D. 避免与牛奶、咖啡同服
- E. 液体铁剂需用吸管服用

22. 有机磷农药的毒理作用是()。

- A. 抑制呼吸中枢
- B. 抑制胆碱酯酶活性
- C. 增加胆碱酯酶活性
- D. 直接作用于呼吸中枢
- E. 使乙酰胆碱在体内分解

23. 慢性肾炎的主要病变部位是()。

- A. 单侧肾脏的肾小球
- B. 双侧肾脏的肾小球
- C. 单侧肾脏的肾小球和肾小管
- D. 双侧肾脏的肾小球和肾小管
- E. 双侧肾间质

24. 诊断有机磷中毒最重要的指标是()。

- A. 血磷

-
- B. 大汗
- C. 肌束颤动
- D. 血清脂肪酶活力
- E. 全血胆碱酯酶活力
25. 心绞痛发作的典型部位是()。
- A. 心前区向左上臂放射
- B. 心尖区
- C. 胸骨后中上段
- D. 胸骨后下段
- E. 剑突下
26. 对溃疡性结肠炎腹泻患者的护理措施不包括()。
- A. 指导患者便后使用柔软的手纸
- B. 便后进行温水坐浴
- C. 必要时留取粪便标本送检
- D. 注意补充水、电解质
- E. 给予高纤维素饮食
27. 甲状腺功能亢进症良性突眼的原因主要是()。
- A. 球后组织有细胞浸润
- B. 球后组织有水肿
- C. 眼外肌水肿变性
- D. 上眼睑肌的痉挛和回缩
- E. 球后脂肪组织增生
28. 对肝炎病毒最可靠的消毒剂是()。
- A. 来苏水
- B. 75%酒精

-
- C. 过氧乙酸
 - D. 37%~40%甲醛熏蒸
 - E. 苯扎溴铵

29. 出现胸膜反应时应采取的紧急处理方法, 错误的是()。

- A. 停止抽液
- B. 平卧
- C. 皮下注射肾上腺素
- D. 观察血压
- E. 吸氧

30. 慢性心力衰竭患者应用硝普钠的护理注意事项不包括()。

- A. 避光滴注
- B. 注意防止低血压反应
- C. 监测地高辛浓度, 预防洋地黄中毒
- D. 药物现用现配, 每4小时重新配剂1次
- E. 用药过程中监测血压变化, 注意输液速度

二、A2(共 20 题)

31. 患者, 男性, 32岁。因淋雨受凉后突起畏寒、高热, 右侧胸痛伴咳嗽, 咳少量铁锈色痰。体温 39°C , 胸部x线摄片见左下肺野大片模糊阴影。血白细胞计数 $15 \times 10^9 / \text{L}$ 。神志清楚, 血压 $100/78\text{mmHg}$, 心率100次/分。最可能的诊断是()。

- A. 支气管哮喘
- B. 结核性胸膜炎
- C. 肺炎球菌肺炎
- D. 肺炎伴中毒性休克
- E. 急性原发性肺脓肿

32. 患者, 女性, 41岁。患类风湿性关节炎12年, 3天前再次出现双手腕肿痛。下列检查中, 提示患者病情活动的指标是()。

-
- A. 血沉偏低
 - B. C反应蛋白增高
 - C. 关节腔滑液增多
 - D. 血常规示轻度贫血
 - E. 关节X线检查示关节端骨质疏松

33. 男孩, 近2年发育明显迟于同龄儿童, 近1个月出现咳嗽, 低热, 经抗感染治疗后无明显好转, PD试验(++)阳性, 应考虑该儿童患有()。

- A. 营养不良
- B. :上呼吸道感染
- C. 原发性肺结核
- D. 继发性肺结核
- E. 血行播散型肺结核

34. 某慢性支气管炎并发肺气肿患者, 于一阵剧咳后突感左上胸剧烈刺痛, 出现明显的呼吸困难, 不能平卧, 听诊左肺呼吸音明显减弱, 心率增快达130次/分。考虑发生了下列哪种情况()

- A. 急性肺炎
- B. 自发性气胸
- C. 渗出性胸膜炎
- D. 肺不张
- E. 心肌梗死

35. 男性, 70岁, 原有高血压病, 血压为180/95mmHg, 某日因故与人争吵, 突然跌倒, 立即昏迷, 伴四肢抽搐, 待医务人员赶到检查发现口眼歪斜、左侧上下肢不能活动, 尚未送CT室时, 仅上述表现可考虑()。

- A. 脑梗死
- B. 脑血栓形成
- C. 高血压脑出血
- D. 蛛网膜下腔出血

E. 短暂脑缺血发作

36. 男性, 65岁, 脑出血昏迷, 检查时发现两眼向右凝视, 双侧巴宾斯基征(+), 该患者最可能出血部位在()。

A. 左颞枕叶

B. 左额中回后部

C. 右额中回后部

D. 右基底节区

E. 左基底节区

37. 患者, 女性, 46岁, 午后低热2个月, 咳嗽, 少量白痰, 痰结核菌阳性, x线胸片发现左上肺结核, 用链霉素+乙胺丁醇+对氨基水杨酸治疗1个月后症状明显改善, 但出现耳鸣、听力下降、血沉45mm/h, 肝功能正常, 胸片示右上肺结核空洞形成。拟改选的最佳治疗方案为()。

A. 利福平+乙胺丁醇+异烟肼

B. 异烟肼+链霉素+利福平

C. 异烟肼+链霉素+吡嗪酰胺

D. 利福平+异烟肼+卡那霉素

E. 异烟肼+链霉素+乙胺丁醇

38. 患者, 男性, 31岁。突发高热, 牙龈出血, 胸骨压痛。血常规检查示白细胞明显增高, 血小板减少, 需进行骨髓检查。行腰椎棘突骨髓穿刺, 一般应选择的体位是()。

A. 坐位

B. 侧卧位

C. 仰卧位

D. 中凹位

E. 头低足高位

39. 患者, 女性, 53岁, 确诊肺结核3年, 近日发现卡那霉素耐药, 结核病恶化选择最佳方案是()。

A. 2HRSE/6HRE

B. 2HRAKZ/6HRE

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/268101104010006036>