

## 女性生殖系统肿瘤患者的护理试题

1. 外阴恶性肿瘤中最常见的是 ( )

- A. 外阴恶性黑色素瘤
- B. 前庭大腺癌
- C. 外阴鳞状细胞癌(正确答案)
- D. 外阴鲍文病
- E. 外阴基底细胞癌

2. 外阴鳞状细胞癌最主要的转移途径是 ( )

- A. 直接浸润和淋巴转移(正确答案)
- B. 种植转移
- C. 血行转移
- D. 局部扩散蔓延
- E. 无转移

3. 外阴恶性肿瘤发病部位最常见的是 ( )

- A. 大阴唇(正确答案)
- B. 小阴唇
- C. 阴蒂
- D. 会阴
- E. 阴道口

4. 外阴癌主要的治疗方法是 ( )

- A. 物理疗法
- B. 手术治疗(正确答案)

D.化学药物治疗

C.放射治疗

E.中药外敷

5.下列哪项是外阴鳞状细胞癌主要的症状（）

A.反复疼痛

B.外阴出血

C.外阴渗液

D:外阴瘙痒久治不愈(正确答案)

E.外阴感染

6.诊断宫颈癌最可靠的方法是（）

A.宫颈刮片细胞学检查

B.宫颈或颈管活体组织检查(正确答案)

C.子宫锥形切除术

D.碘试验

E.诊断性刮宫

7.普查筛查宫颈癌最常用的检查方法是（）

A.宫颈刮片细胞学检查+HPV检测(正确答案)

B.碘试验

C.宫颈和子宫颈管活体组织检查

D.分段诊刮

E.子宫锥形切除术

8.子宫颈癌最早出现的症状是（）

A.腰背疼痛

B.接触性出血(正确答案)

C.恶病质

D.阴道大出血

E.阴道排液

9.预防子宫颈癌的措施不正确的是 ( )

A.提倡晚婚、晚育

B.30岁以上妇女每3-5年普查1次(正确答案)

C.积极治疗宫颈疾病

D.重视接触性出血的症状

E.积极开展性健康教育工作

10.怀疑子宫颈癌，下列哪项检查无意义 ( )

A.宫颈刮片

B.宫颈活检

C.碘试验

D.阴道镜检查

E.腹腔镜检查(正确答案)

11.与宫颈癌关系最密切的因素是 ( )

A.人乳头瘤病毒(HPV)(正确答案)

B.晚婚晚育

C.不孕症

D.宫颈裂伤

E.宫颈炎症

12.下列哪项是女性生殖器中最常见的恶性肿瘤（）

- A.外阴癌
- B.子宫颈癌(正确答案)
- C.输卵管癌
- D.子宫内膜癌
- E.卵巢癌

13.哪种类型的子宫肌瘤容易发生蒂扭转（）

- A.肌壁间肌瘤
- B.黏膜下肌瘤
- C.浆膜下肌瘤(正确答案)
- D.阔韧带内肌瘤
- E.宫颈部肌瘤

14.子宫肌瘤的类型最常见的是（）

- A.子宫颈肌瘤
- B.黏膜下肌瘤
- C.肌壁间肌瘤(正确答案)
- D.浆膜下肌瘤
- E.阔韧带内肌瘤

14.黏膜下肌瘤最常见的临床表现是（）

- A.经量增多，经期延长(正确答案)
- B.下腹部包块
- C.白带增多

D.压迫症状

E.疼痛

16.子宫肌瘤的变性中最常见的是（）

A.玻璃样变(正确答案)

B.脂肪样变

C.肉瘤变

D.钙化

E.囊性变

17.浆膜下子宫肌瘤最常见的临床症状是（）

A.血性白带

B.下腹部包块(正确答案)

C.月经量过多

D.痛经

E.腹痛

18.下列发生率最高的女性生殖道良性肿瘤是（）

A.畸胎瘤

B.卵巢纤维瘤

C.子宫肌瘤(正确答案)

D.宫体癌

E.黏液性囊腺瘤

19.与子宫肌瘤发病可能的相关因素是（）

A.早婚、早育

B.高血压、肥胖

C.雌激素长期刺激(正确答案)

D.性生活紊乱

E.不良饮食习惯

20.子宫肌瘤发生红色变性时，多见于下列哪种情况（）

A.子宫肌瘤蒂扭转

B.妊娠期或产褥期(正确答案)

C.妇女绝经期

D.运动后

E.月经期

21.下列哪项不是子宫内膜癌的诱发因素（）

A.未婚，少育

B.糖尿病

C.肥胖，高血压

D.早婚，多产(正确答案)

E.绝经延迟

22.子宫内膜癌首选的治疗方法是（）

A.放疗

B.手术治疗(正确答案)

C.化疗

D.抗雌激素制剂

E.中医中药治疗

23.子宫内膜癌最典型的临床症状是（）

- A.绝经后阴道流血(正确答案)
- B.经量增多，经期延长
- C.接触性出血
- D.阴道排液
- E.血性白带

24.确诊子宫内膜癌最可靠的方法是（）

- A.阴道镜
- B.超声检查
- C.宫腔镜
- D.分段诊断性刮宫(正确答案)
- E.宫腔分泌物细胞学检查

25.子宫内膜癌最常见的转移途径是（）

- A.上行蔓延
- B.下行蔓延
- C.血行转移
- D.腹腔种植
- E.直接蔓延(正确答案)

26.子宫内膜癌主要的病理类型是（）

- A.鳞状细胞癌
- B.鳞腺癌
- C.腺癌(正确答案)
- D.高分化癌

E.低分化癌

27.卵巢肿瘤最常见的并发症是（）

A.蒂扭转(正确答案)

B.感染

C.破裂

D.出血

E.疼痛

28.卵巢囊肿蒂扭转的典型临床表现是（）

A.恶心

B.突然一侧下腹部剧痛(正确答案)

C.呕吐

D.高热

E.腹肌紧张

29.女性生殖器肿瘤病死率最高的是（）

A.卵巢纤维瘤

B.子宫颈癌

C.子宫内膜癌

D.恶性卵巢肿瘤(正确答案)

E.成熟畸胎瘤

30.卵巢肿瘤中容易发生蒂扭转的是下列哪项（）

A.卵泡膜细胞瘤

B.卵巢纤维瘤



C.畸胎瘤(正确答案)

D.颗粒细胞瘤

E.无性细胞瘤

31. 下列肿瘤中，对妇女生命威胁最大的是（）

A.外阴癌

C.子宫体癌

B.子宫颈癌

D.输卵管癌

E.卵巢癌(正确答案)

32.对放疗最敏感的卵巢肿瘤是（）

A.卵巢纤维瘤

B.浆液性囊腺癌

C.黏液性囊腺瘤

D.无性细胞瘤(正确答案)

E.成熟畸胎瘤

33.卵巢良性肿瘤中最常见的是（）

A.卵巢纤维瘤

B.皮样囊肿(正确答案)

C.未成熟畸胎瘤

D.黏液性囊腺瘤

E.卵泡膜细胞瘤

34.下列哪种卵巢肿瘤细胞产生甲胎蛋白，是其诊断及病情监测的重要标志物（）

- A.畸胎瘤
- B.颗粒细胞瘤
- C.卵泡膜细胞瘤
- D.无性细胞瘤
- E.卵黄囊瘤(正确答案)

35.患者，女，63岁。出现外阴瘙痒2年余，经多次到医院治疗无效，近半年来瘙痒加重并发现外阴肿块伴疼痛。妇检:阴唇内侧有白斑，见大阴唇中段一大小约3Cm×2cm×2cm大小的结节。查体:右侧腹股沟触及大小不等的3枚淋巴结。

此案例可能的医疗诊断是（）

- A.外阴炎症
- B.外阴脓肿
- C.外阴纤维瘤
- D.外阴恶性肿瘤(正确答案)
- E.外阴汗腺瘤

36患者，女，38岁。阴道分泌物增多半年左右，近1个月出现血性白带。妇科检查:宫颈重度糜烂、触之易出血，子宫正常大小、两侧附件正常。为明确病情，应该做何项检查（）

- A.宫颈活检(正确答案)
- B.宫颈刮片
- C.阴道镜检查
- D.宫颈碘试验
- E.宫腔镜检查

37.患者，女，35岁。出现性交后阴道出血，自己怀疑患上“宫颈癌”，要求检查，下列哪项检查能明确病情（）

- A.阴道镜
- B.腹腔镜
- C.宫颈刮片
- D.宫颈活体组织检查(正确答案)
- E.分段诊刮

38.患者，女，因为担心患宫颈癌。向护士咨询宫颈癌的早期症状，护士对其说明的典型症状是（）

- A.绝经后阴道流血
- B.接触性出血(正确答案)
- C.恶病质
- D.白带呈臭米汤样
- E.大量血性白带

39.患者，女，35岁，孕3产1。近1周发现“性生活后阴道有血性白带”。妇科检查:子宫颈轻度糜烂，有接触性出血，子宫正常大小，两侧附件阴性。子宫颈刮片细胞学检查为巴氏3级，其结果提示（）

- A.轻度炎症
- B.可疑癌症(正确答案)
- C.高度可疑癌症
- D.重度炎症
- E.癌症

40.患者，女，40岁。出现接触性出血。妇检:宫颈肥大，怀疑宫颈癌，需做宫颈活检确诊。护士对患者做宣教，正确的是（）

- A.术后2个月内避免性生活

- B.伴滴虫性阴道炎需治愈后再检查(正确答案)
- C.术前充盈膀胱，取膀胱截石位
- D.术后48小时自行取出阴道内纱布
- E.为排除癌变，在月经来潮前3~5天活检最合适

41患者，女，32岁。1年来月经量增多，有血块，经期延长，近3个月每次行经伴头晕、乏力、心悸。妇科检查:子宫增大如孕3个月，质硬、表面不平，两侧附件正常。该患者可能患哪种疾病（）

- A.子宫肌瘤(正确答案)
- B.慢性宫颈炎
- C.月经失调
- D.子宫颈癌
- E.子宫内膜癌

42.患者，女，45岁。体检时行B超检查发现子宫浆膜下肌瘤，询问护士该肌瘤量常见的临床表现，护士告知（）

- A.下腹部包块(正确答案)
- B.不孕
- C.腰酸
- D.月经量过多
- E.白带增多

43.患者，女，30岁，已婚。停经2月余。B超示:宫内早孕8周并子宫肌瘤，1个多月后李女士无任何诱因出现剧烈腹痛伴恶心、呕吐，B超检查见肌瘤增大明显，该女士可能是（）

- A.子宫肌瘤肉瘤样变

B.子宫肌瘤红色样变(正确答案)

C.子宫肌瘤感染

D.子宫肌瘤蒂扭转

E.子宫肌瘤玻璃样变

44.患者，女，38岁。体检发现多发性子宫肌瘤，子宫增大如妊娠60天大小，但无临床症状。其心情沉重，前来咨询关于女性生殖器肿瘤情况。下列回答中错误的是（）

A.子宫肌瘤是女性生殖器肿瘤中发病率最高的良性肿瘤

B.子宫肌瘤目前无症状，不必忧虑，但必须定期随访

C.随访手段之一是做CA125测定(正确答案)

D.如果肌瘤迅速增大，超过妊娠2个半月大小，再考虑手术治疗

E.子宫肌瘤恶变率很低，暂时不手术是安全的

45.患者，女，52岁，绝经4年后出现阴道流血近1个月。妇科检查:宫颈光滑，子宫增大，质地柔软，两附件未触及。为明确诊断应该做哪项检查（）

A.盆腔检查

B.阴道镜检查后行宫颈活检

C.分段诊刮(正确答案)

D.阴道后穹隆涂片细胞学检查

E.宫颈刮片细胞学检查

46.患者，女，57岁，已绝经6年。阴道少量不规则出血3个月，经检查诊断为子宫体癌。下列哪项不是该病的特点（）

A.生长缓慢

B.预后较好

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/286220025012010050>