

儿科实习生出科考试题

姓名：_____ 成绩：_____

1.训练小儿定时小便的习惯开始的时间宜为

A.2 个月

B.3 个月

C.4 个月

D.5 个月

E.6 个月

2.听觉发育完善的年龄是

A.2 岁

B.3 岁

C.4 岁

D.5 岁

E.6 岁

3.小儿最易发生意外事故的阶段为

A.新生儿期

B.婴儿期

C.幼儿期

D.学龄期

E.学龄前期

4.婴儿静脉输液时常选用的部位是

A.手背静脉

B.肘静脉

C.头皮静脉

D.桡静脉

E.颈静脉

5.低体重儿是指

A.初生 1 小时内体重低于 1500g 者

B.初生 1 小时内体重低于 1000g 者

C.初生 1 小时内体重低于 2500g 者

D.初生 1 小时内体重低于 3000g 者

6.新生儿产热主要依靠

A.寒战反应

B.白色脂肪

C.棕色脂肪

D.能量摄入

E.肝脏代谢

7.新生儿正常的呼吸频率是

A.28~30 次/分

B.30~35 次/分

C.35~40 次/分

D.40~45 次/分

E.45~50 次/分

8.新生儿出生后开始排胎便的时间为

A.生后 6 小时内

B.生后 8 小时内

C.生后 10 小时内

D.生后 12 小时内

E.生后 24 小时内

9.下列情况不是导致新生儿窒息的因素的是

A.孕母吸毒、吸烟

B.脐带受压、打结

C.遗传因素

D.早产

E.手术产

10.引起新生儿败血症的常见致病菌是

A.绿脓杆菌

B.肺炎球菌

C.葡萄球菌

D.溶血性链球菌

E.真菌

11.下列新生儿肺炎中，最严重、病死率最高是

A.羊水吸入性肺炎

B.胎粪吸入性肺炎

C.乳汁吸入性肺炎

D.细菌感染性肺炎

E.支原体感染性肺炎

12.引起新生儿宫内感染性肺炎常见的病毒是

A.巨细胞病毒

B.呼吸道合胞病毒

C.柯萨奇病毒

D.流感病毒

E.腺病毒

13.新生儿生理性体重下降幅度一般不超过

A.8%

B.9%

C.10%

D.15%

E.20%

14.营养不良是指缺乏

A.热量和(或)脂肪

B.热量和(或)蛋白质

C.热量和(或)糖

D.蛋白质和(或)脂肪

E.脂肪和(或)糖

15.导致婴儿营养不良最主要的原因是

A.喂养不当

B.迁延性腹泻

C.糖尿病

D.甲亢

E.肠吸收不良综合征

16.小儿肥胖症成为成人多种疾病的诱因，但应除外

A.冠心病

B.糖尿病

C.胆石症

D.风湿热

E.痛风

17.引起维生素 D 缺乏性佝偻病的最主要原因是

A.生长过速

B.日光照射不足

C.维生素

D.摄入不足

E.肝胆疾病

18.可引起手足搐搦的血钙数值是

A.1.4mmol/L(5.5mg/dl)

B.1.5mmol/L(6mg/dl)

C.1.6mmol/L(6.5mg/dl)

D.1.75~1.88mmol/L(7~7.5mg/dl)

E.2mmol/L(8mg/dl)

19.维生素 D 缺乏可引起手足搐搦症主要是由于

A.血磷降低

B.甲状旁腺反应迟钝

C.食物中含钙量低

D.血钙磷乘积小于 30

E.尿钙排出过多

20.出现生理性流涎的年龄为

A.5~6 个月

B.3~4 个月

C.2~3 个月

D.6 个月以后

E.新生儿期

21.胃食管反流消失的年龄多为

A.8~10 个月

B.6~8 个月

C.1 个月以后

D.3~5 个月

E.1 岁以后

22.婴儿发生溢乳的原因是

A.胃排空快

B.胃容量小

C.贲门肌发育差，幽门括约肌发育好

D.胃较垂直

E.幽门括约肌发育差，贲门肌发育好

23.母乳喂养儿肠道主要细菌为

A.大肠杆菌

B.大肠埃希菌

C.葡萄球菌

D.双歧杆菌

E.链球菌

24.下列不属于腹泻易感因素的是

A.胃排空较慢，血清免疫球蛋白的 IgM 较低

B.消化系统发育不完善

C.生长发育快，需要营养物质相对多，消化道负担重

D.肠道菌群失调

E.人工喂养

25.母乳中含有大量体液因子，下列不符合的一项是

A.巨噬细胞

B.乳铁蛋白

C.低聚糖

D.溶菌酶

E.粒细胞

26.婴幼儿肝的位置是

A.右肋缘下 1~2cm

B.右肋缘下 2~3cm

C.右肋缘下 3~4cm

D.右肋缘下 4~5cm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/295004312320011110>