

2023 年主治医师之消化内科主治 306 考前冲刺模拟 试卷 B 卷含答案

单选题（共 50 题）

1、胃酸分泌增多较明显的疾病是

- A. 慢性浅表性胃炎
- B. 慢性萎缩性胃炎
- C. 十二指肠溃疡
- D. 反流性食管炎
- E. 胃溃疡

【答案】 C

2、我国流行的肾综合征出血热病毒是

- A. 鼠平型和田鼠型
- B. 野鼠型和鹿鼠型
- C. 野鼠型和家鼠型
- D. 田鼠型和家鼠型
- E. 鼠平型和野鼠型

【答案】 C

3、急性肾小管坏死和急性间质性肾炎鉴别困难时，为了不贻误治疗应当

- A. 尽快使用抗生素
- B. 积极透析治疗
- C. 立即开始甲基强的松龙冲击治疗
- D. 尽快肾活检明确诊断

E. 大量使用利尿剂

【答案】 D

4、肺淤血

A. CVP, PWP 均降低

B. 中心静脉压(CVP)增高, 肺动脉压(PAP)正常或下降

C. PAP 增高, PWP 正常

D. 肺小动脉楔压(PWP)增高

E. CVP 增高

【答案】 C

5、发热疾病中, 常见合并肝脾肿大的是

A. 疟疾

B. 急性肾盂肾炎

C. 麻疹

D. 药物热

E. 肺结核

【答案】 A

6、溃疡性结肠炎的主要临床表现为

A. 腹痛

B. 黏液脓血便

C. 腹胀

D. 恶心、呕吐

E. 发热

【答案】 B

7、肱二头肌反射中枢在()

A. 颈髓

B. 颈髓

C. 颈髓

D. 颈髓

E. 颈髓

【答案】 A

8、女，24岁，幼年有“支气管哮喘病”。反复出现发作性气喘、咳嗽2年，每月发作2~4次，吸入煤烟或香烟烟雾后出现喘息，咳少量白色黏痰，口服抗生素及氨茶碱后缓解，无发作时如常人，曾胸片检查无异常，本次就诊查体双肺呼吸音清晰，无干湿鸣

A. 慢性支气管炎

B. 支气管肺癌

C. 支气管内膜结核

D. 支气管哮喘

E. 支气管扩张

【答案】 D

9、机体代谢的枢纽是哪一脏器

A. 脾

B. 胰

C. 肝脏

D. 胃

E. 肠

【答案】 C

10、女性，55岁。进食哽噎感3个月，逐渐加重伴消瘦，食管吞钡造影见食管下段贲门处狭窄，黏膜破坏，应诊断为

A. 食管癌

B. 食管腐蚀性狭窄

C. 贲门失弛缓症

D. 食管炎

E. 食管痉挛

【答案】 A

11、女性，40岁，反复右下腹痛、糊状便5年，无脓血，有时伴低热。查体：腹平软，右下腹可触及包块。

A. 十二指肠球部溃疡

B. 结肠癌

C. 肠结核

D. 克罗恩病

E. 溃疡性结肠炎

【答案】 D

12、胃食管反流病治疗至少应维持用药

A. 6个月

- B. 3 个月
- C. 2 年
- D. 1 年
- E. 1 年半

【答案】 A

13、肝硬化最严重的并发症

- A. 上消化道出血
- B. 肝性脑病
- C. 肝肾综合征
- D. 肝肺综合征
- E. 腹水

【答案】 B

14、关于胰腺消化酶的错误说法是

- A. 一种是有生物活性的酶，如淀粉酶和脂肪酶
- B. 一种是无活性的酶原，如胰蛋白酶原
- C. 胰液进入十二指肠后首先激活肠激酶
- D. 胰蛋白酶是关键酶
- E. 胰腺腺泡内的酶原颗粒被异常激活后，引起胰腺的自身消化

【答案】 C

15、门诊对有便血伴有腹泻或便秘的患者，首先应进行的检查是

- A. 直肠指检

- B. 纤维结肠镜检
- C. 钡餐 X 线检查
- D. 钡灌肠 X 线检查
- E. 直肠镜检

【答案】 A

16、抑制质子泵(H

- A. 多潘立酮
- B. 奥美拉唑
- C. 西咪替丁
- D. 前列腺素 E
- E. 阿托品

【答案】 B

17、有关进展期胃癌最早的临床表现，下列哪项是错误的

- A. 呕血
- B. 厌食
- C. 上腹痛
- D. 体重减轻
- E. 纳差

【答案】 A

18、慢性乙型病毒性肝炎抗病毒治疗的目的应排除

- A. 消除病因

- B. 抑制 HbV 复制
- C. 提高生存率
- D. 防止肝硬化及原发性肝癌的发生
- E. 使肝病缓解

【答案】 A

19、结缔组织病不包括()

- A. 原发性干燥综合征
- B. 痛风
- C. 血管炎
- D. RA

【答案】 B

20、柳氮磺胺吡啶治疗溃疡性结肠炎的机制是

- A. 降低肠腔酸度，促进溃疡愈合
- B. 抑制炎症反应
- C. 促进肠上皮细胞再生
- D. 免疫抑制作用
- E. 抑制细菌生长

【答案】 B

21、有关复合性溃疡下列哪种说法是最正确的

- A. 十二指肠有 2 个以上的溃疡
- B. 胃有 2 个对称的溃疡

- C. 胃和十二指肠均有溃疡
- D. 胃大弯和小弯对称的溃疡
- E. 十二指肠壶腹部和球后溃疡

【答案】 C

22、男性，37岁。高热，咳嗽，咳铁锈色痰，该患者的诊断可能为

- A. 大叶性肺炎
- B. 肺结核
- C. 支气管哮喘
- D. 慢性支气管炎
- E. 支气管扩张

【答案】 A

23、对诊断甲亢最有意义的体征是

- A. 甲状腺动脉血管杂音
- B. 舌、手震颤
- C. 心率快、第一心音亢进及二尖瓣收缩期杂音
- D. 甲状腺肿大
- E. 突眼

【答案】 A

24、男性，60岁。持续性中上腹胀痛1天，伴恶心、呕吐。查体：BP80/60mmHg，HR92次/分，R30次/分，精神萎靡，全腹压痛，以上腹部为重，反跳痛(+)。腹部B超见胆囊内0.4cm×0.4cm息肉，胰腺弥漫性肿大，回声减低、不均质。血气分析PaO

- A. 急性胆囊炎
- B. 急性水肿型胰腺炎
- C. 急性出血坏死型胰腺炎
- D. 急性消化道穿孔
- E. 急性肠梗阻

【答案】 C

25、肝肾综合征患者血流动力学特征是

- A. 有效循环血容量减少，动脉血压下降，肾小球滤过率减少，体循环血管阻力下降
- B. 有效循环血容量增加，动脉血压下降，肾小球滤过率增加，体循环血管阻力下降
- C. 有效循环血容量增加，动脉血压升高，肾小球滤过率增加，体循环血管阻力下降
- D. 有效循环血容量增加，动脉血压升高，肾小球滤过率增加，体循环血管阻力升高
- E. 有效循环血容量减少，动脉血压升高，肾小球滤过率增加，体循环血管阻力升高

【答案】 A

26、男性，61岁，反复咳嗽2年，伴低热、消瘦。查体：气管左移，左上肺可闻及湿性啰音。X线胸片示左上肺多个厚壁空洞，左肺门上移，诊断首先考虑

- A. 肺脓肿
- B. 癌性空洞
- C. 真菌性脓肿
- D. 慢性纤维空洞型肺结核

E. 阿米巴肺脓肿

【答案】 D

27、女性，26岁。甲状腺功能亢进，其查体特征性的改变是

- A. 甲状腺质地柔软
- B. 甲状腺弥漫，对称
- C. 甲状腺可闻及血管杂音
- D. 甲状腺随吞咽动作活动
- E. 甲状腺触及结节

【答案】 C

28、患者，男，45岁。1天来呕血500ml，黑便600g。查体：巩膜轻度黄染，肝脏未触及，脾肋下及边，肠鸣音活跃，移动性浊音(+)。最可能的诊断为

- A. 肝癌破裂
- B. 食管胃底静脉曲张出血
- C. 胆道出血
- D. 胃癌出血
- E. 消化性溃疡出血

【答案】 B

29、男性，70岁。进行性吞咽困难3个月，食管钡剂检查示食管中段有6cm长不规则充盈缺损，病理检查为鳞状细胞癌，ECG示ST段下移，T波倒置；肺功能严重障碍。最佳治疗方案是

- A. 手术切除
- B. 放射治疗

- C. 免疫治疗
- D. 化学治疗
- E. 中医治疗

【答案】 B

30、以腹痛为主要不通常用

- A. 解痉剂
- B. 易蒙停
- C. 容积性泻药
- D. 观察
- E. 5-羟色胺摄取抑制药

【答案】 A

31、患者，女性，33岁。2年来反复腹痛、腹泻，初为糊状便，每日排便2~3次，严重时排粘液脓血便伴里急后重。经当地医院抗炎治疗无效。近1月来腹痛明显。有疼痛-便意-便后缓解的规律。查体：体温38.6℃，腹平软，下腹压痛，肠鸣音亢进。

- A. 重复大便细菌培养
- B. 粪便涂片找抗酸菌
- C. 纤维结肠镜检查
- D. 钡剂灌肠检查
- E. 腹部CT
- F. 立位腹平片

【答案】 C

32、男性，58岁，近5个月来有2次左手无力，每次持续2~5分钟缓解，有高血压病多年，体检发现左侧肢体轻偏瘫。首选的辅助检查是

- A. 头颅CT
- B. 脑干听诱发电位
- C. 经颅多普勒超声
- D. 血电解质
- E. 脑血管造影

【答案】 A

33、消化道大出血成人患者一次出血量在多少毫升以上，即可出现休克体征

- A. 1000ml
- B. 800ml
- C. 1200ml
- D. 500ml
- E. 2000ml

【答案】 B

34、我国慢性肾衰竭的最常见病因为

- A. 糖尿病肾病
- B. 尿酸肾病
- C. 慢性肾小球肾炎
- D. 反流性肾病
- E. 慢性肾盂肾炎

【答案】 C

35、消化性溃疡最常见的并发症是

- A. 穿孔
- B. 出血
- C. 癌变
- D. 幽门梗阻
- E. 息肉

【答案】 B

36、下面哪项很少发生肝性脑病

- A. 血吸虫病性肝纤维化
- B. 药物性肝病
- C. 病毒性肝炎肝硬化
- D. 重症病毒性肝炎
- E. 中毒性肝炎

【答案】 A

37、上消化道大出血的特征性临床表现是

- A. 黑便与发热
- B. 呕血与发热
- C. 呕血与黑便
- D. 黑便与腹痛
- E. 呕血与腹痛

【答案】 C

38、女性，35岁。甲状腺功能亢进，查体：眼球下转时上睑不能相应下垂，该患者此体征称为

- A. Graefe 征
- B. Joffroy 征
- C. Ewart 征
- D. Stellwag 征
- E. Mobius 征

【答案】 A

39、男性，55岁。黑便7个月，乏力，消瘦，查体：贫血貌，右下腹可触及一3cm×6cm×4cm的包块，质硬，表面不平，边缘不整，压痛。该患者高度怀疑

- A. 慢性阑尾炎
- B. 肠结核
- C. 回盲部肿瘤
- D. 克罗恩病
- E. 卵巢囊肿

【答案】 C

40、吸入性肺脓肿()

- A. 肺脓肿直接蔓延
- B. 多为单发病灶，以段叶分布
- C. 肺部病变继发感染所致
- D. 肺结核空洞继发感染
- E. 常为多发病灶，两肺外带多见

【答案】 B

41、慢性肝炎的炎症活动度 3 级

- A. 小叶内肝细胞桥接坏死范围广，累及多个小叶，小叶结构失常
- B. 小叶内肝细胞变性，点灶状坏死或嗜酸性小体
- C. 小叶内肝细胞变性及少数坏死灶
- D. 小叶内肝细胞变性坏死重或见桥接坏死
- E. 小叶内肝细胞无炎症

【答案】 D

42、上消化道出血病因诊断的首选检查为()

- A. X 线钡餐造影
- B. 吞线试验
- C. 选择性动脉造影
- D. 内镜检查
- E. 大便隐血试验

【答案】 D

43、患者，男，55 岁。上腹部及两肋胀痛半年，无反酸、烧心，体重无下降。发病以来，睡眠差。曾多次就医，肝、肾功能未见异常。腹部 CT 见肝右叶直径 1cm 囊肿。胃镜示慢性浅表性胃炎。服用奥美拉唑 2 周症状无缓解。最能解释患者临床症状的疾病诊断是

- A. 功能性消化不良
- B. 慢性萎缩性胃炎
- C. 肠易激综合征

D. 慢性浅表性胃炎

E. 肝囊肿

【答案】 A

44、男性，36岁。头昏、乏力3年。血压160/100mmHg，血红蛋白80g/L，尿比重1.014，尿蛋白(++)，颗粒管型0~2个/HP，BUN16.4mmol/L(4.6mg/dl)，血肌酐309.4 μ mol/L。眼底视网膜动脉细窄迂曲。B超双肾缩小。

A. 慢性肾小球肾炎，慢性肾功能不全，尿毒症晚期

B. 慢性肾盂肾炎

C. 肾性高血压

D. 慢性肾小球肾炎，慢性肾功能不全，氮质血症期

E. 高血压病

【答案】 D

45、主动脉瓣狭窄可触及

A. 胸骨左缘3~4肋间收缩期震颤

B. 胸骨左缘第2肋间连续性震颤

C. 胸骨左缘第2肋间收缩期震颤

D. 胸骨右缘第2肋间收缩期震颤

E. 心尖部舒张期震颤

【答案】 D

46、女性，25岁，反复喘息发作2年，确诊为支气管哮喘。既往无类似病史。

A. 患者曾行皮肤过敏原试验，示花粉过敏

B. 其父患湿疹多年

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/315144021123011111>