

# 2022年-2023年执业药师之西药学专业二练习题 (一)及答案

## 单选题（共40题）

1、患者，女，26岁。头晕、乏力，2年来月经量多，浅表淋巴结及肝、脾无肿大，血红蛋白62g/L，白细胞 $7.0 \times 10^9/L$ ，血小板 $175 \times 10^9/L$ ，血片可见红细胞中心淡染区扩大，网织红细胞计数0.005。在积极寻找该患者病因，并进行病因治疗外，考虑该患者存在缺铁性贫血的情况，需要补充铁剂。可以与铁剂一起服用的是

- A. 果汁
- B. 牛奶
- C. 茶
- D. 咖啡
- E. 抗酸药

【答案】 A

2、男性，70岁，进食后饱胀不适伴反酸5年余，黑便1天。胃镜检查提示：“胃多发性溃疡（A期）伴出血。”C呼气试验：Hp(+)。患者既往有高血压病史8年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0.9%氯化钠注射液100ml+注射用埃索美拉唑钠40mg，静脉滴注，2次/日；阿莫西林胶囊1g，口服，2次/日；克拉霉素缓释胶囊0.5g，口服，2次/日；注射用矛头蝮蛇血凝酶1KU，静脉注射，1次/日；替米沙坦40mg，口服，1次/日；硝苯地平缓释片30mg，口服，1次/日；美托洛尔12.5mg，口服，2次/日；胶体果胶铋胶囊100mg，口服，3次/日。对该患者症状判断有影响，出血期不宜使用的是

- A. 替米沙坦
- B. 胶体果胶铋胶囊
- C. 埃索美拉唑钠
- D. 美托洛尔
- E. 克拉霉素

【答案】 B

3、（2021 年真题）属于阳离子型表面活性剂，可用于治疗咽喉炎的药物是（ ） e

- A. 氨溴索
- B. 羟甲唑啉
- C. 度米芬
- D. 西地碘
- E. 左卡巴斯汀

【答案】 C

4、患者女，59 岁，既往高脂血症病史 5 年，心功能 II 级。因发现血压升高 7 天入院。入院查体血压 172/95mmHg，心率 62 次 / 分。该患者目前服用的药物除抗高血压药外有辛伐他汀。

- A. 特拉唑嗪
- B. 美托洛尔
- C. 氢氯噻嗪
- D. 双氯芬酸
- E. 氨氯地平

【答案】 C

5、关于使用依折麦布的说法，错误的是

- A. 可单独服用或与他汀类联合应用
- B. 需空腹服用
- C. 成人剂量一次 10mg。一日 1 次

- D. 剂量超过 10mg / d 对降低 LDL 水平无增效作用
- E. 不能与葡萄柚汁合用

【答案】 B

6、肾病综合征采用

- A. 糖皮质激素小剂量代替疗法
- B. 糖皮质激素大剂量冲击疗法
- C. 糖皮质激素一般剂量长期疗法
- D. 抗结核病药与糖皮质激素合用
- E. 糖皮质激素与肾上腺素合用

【答案】 C

7、维生素 K 参与下列哪些凝血因子活化( )

- A. II、VII因子
- B. II、VIII、XI、IV因子
- C. II、VII、IX、X因子
- D. VII、XI、VII、IX因子
- E. II、X因子

【答案】 C

8、（2017 年真题）应用维生素 B12 治疗巨幼红细胞性贫血 48 小时内，应监测的电解质是（ ）

- A. 钠
- B. 钾

C. 锂

D. 钙

E. 锌

【答案】 B

9、成人使用美罗培南一日剂量不得超过

A. 3g

B. 4g

C. 5g

D. 6g

E. 7g

【答案】 D

10、（2017年真题）维 A 酸软膏治疗痤疮时，合理的用法是（ ）

A. 一日一次，睡前使用

B. 一日一次，晨起使用

C. 一日一次，固定时间使用

D. 一日二次，早晚使用

E. 一日三次，早、中、晚使用

【答案】 A

11、（2021年真题）患者，男，48岁，入院接受结肠癌手术，术后因合并肺部感染，静脉给予头孢哌酮舒巴坦钠治疗6天，观察到手术切口和静脉输液穿刺部位有少量渗血，实验室检验结果显示凝血功能异常。针对此症状，宜选用的治疗药物是（ ）

- A. 重组链激酶
- B. 重组人促红素
- C. 维生素 K1
- D. 维生素 B12
- E. 叶酸

【答案】 C

12、属于凝血因子 Xa 直接抑制剂的是

- A. 依诺肝素
- B. 肝素
- C. 华法林
- D. 利伐沙班
- E. 达比加群酯

【答案】 D

13、氟替卡松吸入气雾剂用于重度哮喘时的用法和用量为

- A. 一次 50~100  $\mu$ g, 一日 2 次
- B. 一次 100~250  $\mu$ g, 一日 2 次
- C. 一次 250~500  $\mu$ g, 一日 2 次
- D. 一次 500~1000  $\mu$ g, 一日 2 次
- E. 一次 1000~1500  $\mu$ g, 一日 2 次

【答案】 D

14、下述关于铋剂的描述, 错误的是

- A. 牛奶可促进铋剂的吸收，服药期间应同服牛奶
- B. 不得同食高蛋白饮食，如牛奶
- C. 剂量过大时，可导致铋剂脑病现象
- D. 两种铋剂不宜联用
- E. 服药期间大便呈灰黑色属于正常现象

【答案】 A

15、使用奥沙利铂后最需要关注的典型不良反应是

- A. 神经毒性
- B. 消化道反应
- C. 肝毒性
- D. 肾毒性
- E. 血液毒性

【答案】 A

16、联合应用可使部分患者血压升高的药物是

- A. 磷霉素氨丁三醇
- B. 利奈唑胺+哌替啶
- C. 利奈唑胺+苯丙醇胺
- D. 磷霉素钠+万古霉素
- E. 磷霉素钠+ $\beta$ -内酰胺类

【答案】 C

17、治疗绦虫病的首选药品是( )。

- A. 哌嗪
- B. 伊维菌素
- C. 吡喹酮
- D. 伯氨喹
- E. 噻嘧啶

【答案】 C

18、利尿作用最强，特别当急、慢性肾衰竭(肌酐清除率

- A. 袢利尿药
- B. 噻嗪类利尿药
- C. 留钾利尿药
- D. 碳酸酐酶抑制剂
- E. 磷酸二酯酶抑制剂

【答案】 A

19、以下可作为缓解轻、中度急性哮喘症状首选药的是

- A. 孟鲁司特
- B. 沙美特罗
- C. 特布他林
- D. 氨茶碱
- E. 噻托溴铵

【答案】 C

20、患者。男，42岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

- A. 急性恶心呕吐
- B. 延迟性恶心呕吐
- C. 预期性恶心呕吐
- D. 爆发性恶心呕吐
- E. 难治性恶心呕吐

【答案】 A

21、我国研制的可用于抗氯喹恶性疟和恶性疟脑型凶险发作的药物是

- A. 乙胺嘧啶
- B. 青蒿素
- C. 伯氨喹
- D. 磷酸咯萘啶
- E. 蒿甲醚

【答案】 D

22、患者男性，56岁。有糖尿病史15年，近日并发肺炎，呼吸35次/分，心率105次/分，血压160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖500mg/dl，诊断为糖尿病酮症酸中毒。

- A. 口服
- B. 皮下
- C. 静脉
- D. 舌下含服
- E. 灌肠



【答案】 C

23、西咪替丁治疗消化性溃疡病的机制是( )

- A. 抑制胃壁细胞的 H
- B. 阻断 H
- C. 阻断 CTZ 的 D
- D. 抗幽门螺杆菌
- E. 选择性阻断外周多巴胺受体( )

【答案】 B

24、弥散性血管内凝血早期可选用( )

- A. 叶酸
- B. 肝素
- C. 尿激酶
- D. 维生素 K
- E. 氨基己酸

【答案】 B

25、以下关于比索洛尔说法错误的是

- A. 为水脂双溶性  $\beta$  受体阻断剂
- B. 首关效应高、半衰期短
- C. 口服吸收率高，中度透过血-脑屏障
- D. 可阻断部分  $\beta_1$  受体
- E. 中枢神经系统的不良反应较少

【答案】 B

26、哮喘急性发作首选的药物是

- A. 沙丁胺醇气雾剂
- B. 孟鲁司特片
- C. 布地奈德福莫特罗吸入剂
- D. 羧甲司坦口服液
- E. 氨茶碱片

【答案】 A

27、抗酸作用较强，有收敛、止血和引起便秘作用

- A. 氢氧化镁
- B. 氢氧化铝
- C. 碳酸钙
- D. 三硅酸镁
- E. 碳酸氢钠

【答案】 B

28、可能引起心悸、心绞痛发作的药物是

- A. 碘及碘化物
- B. 丙硫氧嘧啶
- C. 左甲状腺素
- D. 鲨肝醇
- E. 左炔诺孕酮

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/316125231012010050>