

医院中年资护士考核试题及答案

护士对患者实施健康教育的第一步是

评估教育需求

确定教育目标

制定教育计划

评估患者的经济状况

了解患者的意愿和能力

门诊教育的内容主要是关于

病人病因的教育

医院环境的教育

常见病防治的教育

医院规章制度的教育

病人所患疾病治疗原则的教育

健康教育诊断中的强化因素指

产生某种行为的愿望

诱发某种行为的因素

激励行为维持、发展的因素

使行为动机得以实现的因素

形成某种行为所必需的社会条件

属于电子媒介传播的是

书籍

电影、电视

报刊、杂志

标本、模型

咨询、演讲

根据健康教育诊断，不属于高可变性行为的是

社会不赞成的行为

正处在发展时期的行为

与传统文化不相关的行为

与生活方式及风俗习惯不密切的行为

在其他计划中没有成功改变的实例的行为

进行交谈时，当发现对方不正确的言行或存在的问题时，应该

严厉地指出对方的错误之处

为避免冲突，应对对方不正确的言行或存在的问题不予纠正

为保持关系，随声附和对方

应先肯定对方值得肯定的一面，然后以建议的方式指出问题的所在

中断交谈，不再理对方

不是脑死亡的诊断标准的是

瞳孔散大

不可逆的深度昏迷

自发呼吸停止

脑干反射消失

脑电波消失

处于临终的患者，其循环系统出现衰竭表现为

脉细数不规则，血压测不到

张口呼吸，呼吸困难

嗜睡或昏迷

疼痛

肌张力降低

下列信息中，属于客观资料的是

头痛 天

感到恶心

体温 $^{\circ}\text{C}$

不易入睡

常有咳嗽

。

患者头部外伤后出现昏迷、休克 急诊入院，病室值班护士首先要做的护理工作是

迎接患者

简单做入院介绍

简短向患者家属介绍住院环境

边通知医生，边做好抢救准备工作

配合医生共同抢救患者

患者，男性， 岁。诊断肺炎入院。患者进入病区后，护士的初步护理工作不包括

测量生命体征

通知病区医生

做护理评估

准备急救物品

建立患者住院病历

社会环境中危害健康的因素不包括

文化教育落后

医院设施配制不全

医疗保障服务体系不完善

人际关系紧张

缺乏科学管理

在诸多环境类别中，在保障人类健康中起决定作用的是

健康的生理环境

健全的心理环境

安全的自然环境

优良的社会环境

友善的治疗性环境

佝偻病患儿早期的临床表现主要是

睡眠不安、多汗、枕秃

颅骨软化

方颅

前凶晚闭

出牙延迟

唾液腺发育，唾液分泌逐渐增多，能产生较多淀粉酶的时间是

个月

个月

个月

个月

个月

患儿， 岁，因肺炎入院。经治疗后症状好转，又突发高热，呼吸困难，右肺叩诊浊音。该患儿可能并发了

急性心力衰竭

呼吸衰竭

中毒性脑病

中毒性心肌炎

脓胸

患者女， 岁，大学生。患有癫痫。正确的用药指导是

发作时服用

睡前服用

多种药物联合使用控制发作

感觉好可以突然停药

停药前必须缓慢减量

颅底骨折发生脑脊液耳漏时，下列措施正确的是

立即外耳道滴抗生素

做腰穿

卧床休息，头偏向健侧

头颅 X线检查寻找骨折线

清洁外耳道，保持外耳道通畅

患者女， 岁。近 年来肩背疼痛及僵硬，并放射至双侧上肢，有无力或放电样串痛。入院查体：颈部活动受限，前屈 ，后伸 ，侧屈左 ，右 ， 及 棘间及双侧小关节压痛，压头试验阳性。该患者的颈椎病类型是

神经根型

脊髓型

交感神经型

椎动脉型

食管型

患者男， 岁。咳嗽，咳白色泡沫痰 个月，胸痛半个月。 X线胸片检查提示右下肺肺叶带进肺门处有一 分叶状阴影。 CT检查提示不规则高密度肿块阴影，同侧淋巴结肺门肿大，直径约 ，支气管纤维镜检查确诊为鳞癌，行全肺切除术。术后第一天， ， 次分， 次分， ℃。尿量正常，以下护理措施正确的是

保持胸腔引流管通畅，使之呈全程开放状态

侧卧位，以预防纵隔移位和压迫健侧肺导致的呼吸循环功能障碍

控制钠盐摄入， 小时补液量应控制在 以内，速度 滴分

术后前三天以卧床休息为主，以预防引流管滑脱

出院前告知患者，出院后不必再进行呼吸运动锻炼

患者男， 岁。突发剧烈腹痛，恶心、呕吐，体温 ℃，以“急性化脓性腹膜炎”被收入院，入院后急查白细胞 ，患者出现里急后重感，超检查盆腔有巨大肿块，应采取的治疗措施为

持续胃肠减压

应用抗生素治疗

热水坐浴

物理透热治疗

手术治疗

自体游离皮片移植属于

细胞移植

组织移植

器官移植

同质移植

同种移植

患者女， 岁。甲状腺亢进病史半年，妊娠 个月，甲状腺功能亢进症状加重，应选用

甲状腺次全切除术

放射性 治疗

丙基硫氧嘧啶

普洛萘尔

碘剂

临产后的主要产力是

腹肌收缩力

膈肌收缩力

肛提肌收缩力

子宫收缩力

产妇向下屏气

类风湿性关节炎突出的临床表现是

全身不适，发热，食欲减退，手足发冷

晨起僵硬

关节畸形

局部发热

疼痛明显

属于肺心病代偿期病人的体征是

肺动脉瓣第二心音亢进

颈静脉怒张

腹水

心脏叩诊浊音界向右扩大

二尖瓣区舒张期杂音

患者男， 岁，近 个月出现排尿射程短，尿后滴沥，排尿不尽，最可能的诊断是

慢性膀胱炎

前列腺炎

前列腺增生

前列腺癌

神经性膀胱炎

破伤风护理措施中错误的是

接触隔离

各项护理操作尽量集中

床旁备气管切开包

设专人护理

病人用过的大单应清洗后再消毒灭菌

对低钾患者静脉补钾，最重要的参考指标是

给药速度

药液浓度

每小时尿量

尿液总量

患者精神状态

患者，男， 岁。患“化脓性扁桃炎”，医嘱青霉素皮试，护士在做青霉素皮试后五分钟，患者突然胸闷，皮肤苍白，出冷汗，脉细速，血压下降，呼之不应。此时患者最可能发生的是

心绞痛

低血容量性休克

心源性休克

过敏性休克

感染性休克

抢救时首选的药物为

异丙肾上腺素

肾上腺素

地塞米松

多巴胺

去甲肾上腺素

抢救中患者突发心跳骤停，首选的急救方法为

立即静脉注射肾上腺素

心内注射异丙肾上腺素

行心脏胸外按压建立循环

给予氧气吸入，纠正缺氧

注射洛贝林以兴奋呼吸

胸外心脏按压的频次至少为

次/分

次/分

次/分

次/分

次/分

抢救过程中，该患者发生了室颤，护士采取的处理措施正确的是

同步电复律

非同步电复律

心内注射利多卡因

立即肌注阿托品

立即给予患者心脏按压

护理系统性红斑狼疮患者，错误的措施是

保持口腔清洁

食用少渣食物

定期接触日光照射

急性期卧床休息

皮肤瘙痒时涂抹止痒剂

最易发生嵌顿的腹外疝是

腹股沟斜疝

腹股沟直疝

股疝

脐疝

切口疝

临床生存时间最长的青紫型先心病是

法洛四联症

大动脉转位

主动脉狭窄

室间隔缺损

动脉导管未闭晚期

颅内高压患儿，遵医嘱应用甘露醇治疗，护士控制静脉滴入的时间是

小时

小时

小时

小时

小时

惊厥较重或时间较长者不是观察重点的是

血压

呼吸

脉搏

意识及瞳孔变化

体温

护理急性呼吸衰竭患儿，下列哪项操作是错误的

立即取半卧位或抬高床头

立即给氧

立即行气管切开术

立即将患儿送入监护室

保持呼吸道通畅

产妇 岁，产下一男婴。社区护士对其进行母乳喂养方法的指导，错误的是

早开奶，生后可以立即吸吮

哺乳时，母亲宜采取坐位

每次哺乳 左右

个月可开始逐渐添加辅食

小儿 个月可逐渐完全断奶

诊断应首选考虑

肾炎性肾病

单纯性肾病

急性肾小球肾炎

慢性肾炎

急性尿路感染

目前最可能并发

急性肾功能不全

水、电解质平衡紊乱

严重循环充血

脑膜炎

高血压脑病

下列护理措施，不妥的是

定期查尿常规

监测血压变化

限制钠、水入量

观察有无感染病灶

观察有无脑膜刺激征

属于严密隔离的疾病是

传染性非典型性肺炎

腮腺炎

气性坏疽

伤寒

非甲非乙型肝炎

属于血液、体液隔离的疾病是

传染性非典型性肺炎

腮腺炎

气性坏疽

伤寒

非甲非乙型肝炎

属于呼吸道隔离的疾病是

传染性非典型性肺炎

腮腺炎

气性坏疽

伤寒

非甲非乙型肝炎

属于消化道隔离的疾病是

传染性非典型性肺炎

腮腺炎

气性坏疽

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/318062043060006035>