

门诊办理论识考核试题

一、选择题

1. 医患关系最一般、最基本、最常见的表现为哪一种？（ ）[单选题]*
 - A. 经济关系
 - B. 技术关系
 - C. 伦理关系 ✓
 - D. 法律关系
2. 分时段预约时间一般精准到？（ ）[单选题]*
 - A. 10 分钟
 - B. 20 分钟
 - C. 30 分钟 ✓
 - D. 60 分钟
3. 最多能一次要求提前 10 天将（ ）的号源向基层医疗卫生机构开放。 [单选题]*
 - A. 10%
 - B. 20%
 - C. 30%
 - D. 40% ✓
4. 确立六经辨证论治纲领的医家是：（ ）[单选题]*
 - A. 张介宾
 - B. 华佗

C. 姚乙

D. 陈无碍

E. 张帆✓

5. 专家门诊准入与准出制度中专家的准入与准出由（ ）负责资质审核？[单选题]*

A. 门诊办

B. 医务科✓

C. 质管科

D. 医保办

6. 患者检查途中突然意识不清，面色苍白，大汗淋漓，首先判断发生了什么？[单选题]*

A. 低血糖✓

B. 心源性晕厥

C. 体位性低血压

D. 脑源性晕厥

E. 贫血

7. 低血糖的最易处理：(1单选题)*

A. 吃一碗饭

B. 喝一杯含糖饮料√

C. 静推葡萄糖

D. 静滴葡萄糖

E. 吃一个馒头

8. 抢救心脏骤停应选用：(1单选题)*

A. 氯化钙

B. 利多卡因

C. 去甲肾上腺素

D. 肾上腺素 ✓

E. 苯肾上腺素

9. 下列归属五行之“土”的是：() [单选题]*

A. 目

B. 舌

C. 口 ✓

D. 鼻

E. 耳

10. 气逆病变多见于：() [单选题]*

A. 肝脾胃

B. 肺脾胃

C. 脾胃肾

D. 肺肝肾 ✓

E. 肺肝肾

11. 大多数成人突发非创伤性心跳骤停的是：() [单选题]*

A. 心室颤动 ✓

B. 心房颤动

C. 室扑

D. 房扑

E. 室性心动过速

12、嗜食肥甘厚味，易形成：() [单选题]*

- A. 火旺体质
- B. 痰湿体质 ✓
- C. 心气虚体质
- D. 脾气虚体质
- E. 肝郁体质

13、下列哪项不是复苏后评估有效指征：() [单选题]*

- A. 大动脉有搏动
- B. 自主呼吸恢复
- C. 瞳孔由小变大 ✓
- D. 收缩压 > 60mmhg
- E. 肢端回暖

14、与心相表里的是：() [单选题]*

- A. 大肠
- B. 小肠 ✓
- C. 心包
- D. 三焦
- E. 胃

15、具有“泻而不藏”特点的是：() [单选题]*

- A. 五脏
- B. 六腑 ✓
- C. 奇恒之腑

D. 五体

E. 五液

16. 根据耳郭的表面解剖，对耳轮上、下角之间的三角形凹窝称为：() [单选题]*

A. 耳轮

B. 对耳轮

C. 三角窝 ✓

D. 耳舟

E. 耳甲腔

17. 在耳甲腔中心最凹陷处耳穴是：() [单选题]*

A. 脾

B. 胃

C. 心 ✓

D. 肝

E. 肾

18. “膻中”是指：() [单选题]*

A. 心

B. 胸腔

C. 心包 ✓

D. 膈

E. 肺

19. 嗜食肥甘厚味，易形成：() [单选题]*

A. 火旺体质

B. 痰湿体质✓

C. 心气虚体质

D. 脾气虚体质

E. 肝郁体质

20. 《内经》所言的“命门”指：() [单选题]*

A. 右肾

B. 两肾

C. 两肾之间

D. 肾间动气

E. 目✓

21. 安神止痛要穴是：() [单选题]*

A. 神门✓

B. 三角窝

C. 风溪

D. 耳穴

E. 枕

22. 耳尖穴的主要功能是：() [单选题]*

A. 退热、镇静、止痛✓

B. 消炎、止痛、镇静、安眠的功能

C. 抗过敏、提高免疫调节的功能

D. 调节胃肠功能、促进肠蠕动

23. 耳穴压豆时一般每穴按摩()分钟，以耳朵发热，胀麻感为度：() [单选题]*

A、1-2✓

B、2-3

C、3-4

D、4-5

24、瞳孔缩小最常见于() [单选题]*

A、有机磷农药中毒✓

B、阿托品中毒

C、深昏迷患者

D、视神经萎缩

E、视网膜脱落

25、治疗室的管理中，下列哪项是错误的() [单选题]*

A、注射治疗时要铺无菌盘，抽出的药液存放不能超过2小时

B、治疗室中开启的各种溶酶超过24个小时不能使用，最好采用小包装

C、治疗室中开启的无菌溶液需在2小时内使用

D、碘酒、酒精瓶应保持密闭，每周更换并对容器灭菌1~2次

E、经灭菌后的棉球、纱布包一经打开，使用时间不能超过48小时✓

26、留罐法的留置时间一般为() [单选题]*

A、3~5分钟

B、5~10分钟

C、10~15分钟✓

D、15~20分钟

E、30分钟

27、治疗局部皮肤麻木、疼痛或功能减退等疾患常选用的拔罐法是（ ）[单选题]*

- A、留罐法
- B、走罐法
- C、闪罐法√
- D、刺络拔罐法
- E、水罐法

28、适用于病变范围较小或压痛点的是（ ）[单选题]*

- A、单罐√
- B、多罐
- C、针罐
- D、闪罐
- E、刺络拔罐

29、罐子吸拔后立即取下，反复多次的是（ ）[单选题]*

- A、单罐
- B、多罐
- C、针罐
- D、闪罐√
- E、刺络拔罐

30、用纸片燃着投入罐内，将其吸牢于应拔部位的方法称（ ）[单选题]*

- A、闪火法
- B、投火法√
- C、贴棉法

D. 烟火法

E. 滴酒法

31、伤口处理包扎固定，一般覆盖面积超过四周（ ），胶布固定方向。[单选题]*

A. 1-2CM

B. 2-3CM

C. 3-4CM

D. 3-5CM√

32、伤口处理一般使用的药水，不正确的是（ ）[单选题]*

A. 碘伏

B. 双氧水

C. 医用酒精

D. 次氯酸√

33、换药环境准备，如需在病房换药者，（ ）之前必须停止一切清扫工作。[单选题]*

A. 10 分钟

B. 20 分钟

C. 30 分钟√

D. 60 分钟

34、以下那种伤口处理方式是正确的：（ ）[单选题]*

A. 用酒精清洗伤口√

B. 用暖水冲洗伤口

C. 用手指挤压伤口

D. 不处理伤口

35、伤口包扎处理的作用是什么 () [单选题]*

- A. 防止感染
- B. 加快伤口愈合
- C. 控制出血
- D. 以上都是 ✓

36、以下那种伤口处理方式会导致伤口感染 () [单选题]*

- A. 将伤口用干净的水冲洗
- B. 用肥皂和水清洗伤口
- C. 用脏手触摸伤口 ✓
- D. 用纱布包扎伤口

37、伤口出血，选择的止血方式不正确的是 () [单选题]*

- A. 使用止血棉压迫止血
- B. 用手直接按住出血的伤口 ✓
- C. 用纱布轻轻按压在伤口上止血
- D. 用绷带包扎

38、以下哪种方式可以减少伤口疼痛 () [单选题]*

- A. 使用冷敷 ✓
- B. 使用热敷
- C. 吹吹风
- D. 忽略疼痛

39、当处理一个深度较大的伤口时，该采取的措施是 () [单选题]*

- A. 将伤口简单包扎

B、使用缝合线缝合伤口 ✓

C、用冷水冲洗伤口

D、不予处理，等待自愈

40、清创会用到的工具有（ ） [单选题]*

A、血管钳

B、无菌剪刀

C、手术刀

D、以上都是 ✓

41、若肩背疼痛且范围较大应选下列哪种方法为好（ ） [单选题]*

A、走罐 ✓

B、针罐

C、闪罐

D、药罐

E、刺络拔罐

42、适用于病变范围较小或压痛点的是（ ） [单选题]*

A、单罐 ✓

B、多罐

C、针罐

D、闪罐

E、刺络拔罐

43、罐子吸拔后立即取下，反复多次的是（ ） [单选题]*

A、单罐

- B. 多罐
- C. 针罐
- D. 闪罐 ✓
- E. 刺络拔罐

44、下列除哪项外均可能为颅内压骤然增高导致脑疝的诱因 () [单选题]*

- A. 腰椎穿刺 ✓
- B. 呼吸道梗阻
- C. 便秘
- D. 癫痫发作
- E. 情绪激动

45、预防压疮最关键的措施是 () [单选题]*

- A. 改善患者营养
- B. 皮肤清洁
- C. 肢体被动运动
- D. 观察皮肤情况
- E. 避免局部长期受压 ✓

46、膀胱肿瘤术后化疗灌注常用药物为 () [单选题]*

- A. 等渗盐水
- B. 0.02% 呋喃西林
- C. 塞替派 ✓
- D. 3% 硼酸溶液
- E. 庆大霉素

47、甲状腺危象多发生于术后() [单选题]*

A、12~36小时 ✓

B、1~4小时

C、4~6小时

D、8~12小时

E、24~36小时

48、开放性气胸急救首先是() [单选题]*

A、抗生素治疗

B、药物止痛

C、缝合

D、手术治疗

E、闭合伤口 ✓

49、肋骨骨折最常见于() [单选题]*

A、1~3肋骨

B、4~7肋骨 ✓

C、7~9肋骨

D、9~10肋骨

E、11~12肋骨

50、关于腰外疝手术前后的护理，下列哪项是错误的() [单选题]*

A、术后患侧膝下垫枕头

B、术前应治愈或控制引起颅内压升高的症状

C、严格准备会阴部皮肤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/328005124006006035>