

2023 年主治医师之全科医学 301 精选试题及答案一

单选题（共 30 题）

1、患者，男性，73 岁。尿频、尿急 5 年，近 1 年来出现排尿迟缓、尿线细、尿后滴沥。5 年前出现过 2 次脑梗死，经神经科治疗 2 年明显改善，目前除行走略不稳以外，无其他明显的后遗症。

- A. 再次复查尿流率，尿量要在 150ml 以上
- B. 以现有尿量的尿流率作参考
- C. 留置气囊尿管注入 150ml 的生理盐水，再拔除尿管行尿流率检查
- D. 夹闭患者前尿道，憋足 150ml 后，再行尿流率检查
- E. 经尿道直接注入 150ml 以上生理盐水后马上进行尿流率检查

【答案】 A

2、患儿，8 岁，血液检查显示：Hb 64g/L；Hct 25%；RBC $3.20 \times 10^{12}/L$

- A. 地中海贫血
- B. 慢性病性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 白血病
- E. 缺铁性贫血

【答案】 A

3、急性心肌梗死（AMI）的早期标志物是

- A. AST
- B. LD
- C. 肌红蛋白

D. CK-MB

E. 肌钙蛋白

【答案】 C

4、患者，男性，34岁。反复咳嗽、咳脓痰、咯血20年，抗感染、止血等治疗后病情可缓解。本次症状加重伴发热1天就诊。

A. 支气管哮喘

B. 高血压、冠心病

C. 肺癌

D. 青光眼

E. 前列腺增生症

【答案】 B

5、鉴别水肿型和出血坏死型急性胰腺炎，下列哪项意义不大

A. 血清淀粉酶增高

B. 血钙降低

C. 血清正铁血蛋白阳性

D. 肋腹部及脐周皮肤出现紫色瘀斑

E. 发病后很快出现休克

【答案】 A

6、男，59岁，慢性阻塞性肺气肿病史，3天前感冒、咳嗽、伴喘息加重。血气分析：pH:7.370， P_{O_2}

A. 肺野透光度增大，膈肌低平

B. 双上肺野纹理增粗

- C. 双侧肋间隙变窄
- D. 肺野多发蜂窝状改变
- E. 心界向左侧明显扩大

【答案】 A

7、男性，50岁，有家族史，双手震颤伴头部不自主摆动2年。查体：表情正常，肌张力正常，病理征阴性。脑CT正常。

- A. 手术治疗
- B. 药物治疗
- C. 细胞移植
- D. 基因治疗
- E. 康复治疗

【答案】 B

8、引起尖锐湿疣的病原体是

- A. HSV- I
- B. HSV- II
- C. HPV
- D. HIV
- E. HBV

【答案】 C

9、第一心音减弱，心尖区舒张早中期隆隆样杂音

- A. 器质性二尖瓣狭窄

- B. 相对性二尖瓣狭窄 (Austin-Flint 杂音)
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 三尖瓣狭窄符合下列听诊特点的瓣膜病是

【答案】 B

10、神经性皮炎的典型皮肤损害是

- A. 片状苔藓样变
- B. 边缘清楚的红斑鳞屑性损害
- C. 浸润性斑块，基底较硬
- D. 边缘清楚的红斑丘疹
- E. 边缘不清楚的色素增加和色素脱失

【答案】 A

11、患者男性，55岁。既往有高血压病病史，反复右侧颈动脉 TIA 发作，阿司匹林治疗后仍反复发作，查右侧颈动脉狭窄 >80%。选择治疗为

- A. 抗血小板治疗
- B. 改善循环治疗
- C. 颈动脉内膜剥脱术 (CEA)
- D. 脑保护治疗
- E. 中药治疗

【答案】 C

12、19岁的男大学生，来到门诊，自诉学习压力大，1年来经常出现无休止地思索：“树上叶子为什么是绿的？”，“1+1为什么等于2”之类的问题，为此苦恼

不已患者明知自己所想的问题没有意义，但控制不住总去想，并为此而苦恼，积极要求诊治。治疗该患者，最有效的药物是

- A. 氯丙嗪
- B. 多虑平
- C. 氯丙米嗪
- D. 丙米嗪
- E. 阿米替林

【答案】 C

13、对脑血管病(卒中)病人康复治疗时，利用病理无能无力模式的方法是

- A. Bobath 方法
- B. Brunnstrom 方法
- C. 运动再学方法
- D. Rood 方法
- E. PNF 方法

【答案】 B

14、患者，女，32岁。下腹部有包块2年多，伴月经量增多，前来某医院就诊。门诊接诊医师检查，初诊为“子宫肌瘤”。入院后，进修医师按“子宫肌瘤”书写了病历。经治医师在没有做宫腔长度及B超等检查的情况下，完全相信了门诊的诊断，自行决定做子宫切除术。术前，未执行上级医师“再详细探宫腔”的指示；术中，发现子宫体较软时，助手提示“需排除妊娠可能”，术者仍未听取，在未行子宫穿刺的情况下，错误地将子宫及双侧卵巢全切。切开子宫，见一胎儿。该患者已生有一男一女，系绝育对象。术后，医务人员对是否向患者家属讲明实情，持赞成和反对两种意见。若不将事故实情告知患者及家属，对这种做法最正确的评价是()

- A. 此系医院的医疗秘密，内部总结教训即可，不必告知患者
- B. 告知患者实情，会降低医院信誉

- C. 剥夺了患者获得医疗信息的权利和监督医疗过程的权利
- D. 手术实际上为患者做了需做的人流手术，不算事故，不告知患者，符合医德
- E. 告知患者实情，会造成不必要的医疗纠纷

【答案】 C

15、科学地安排老年人的一日三餐，哪一项是不科学的

- A. 少量、多餐对老年人的健康有利
- B. 晚餐吃得好一点，中午吃得饱一点，晚上吃得少一点
- C. 在 3 次正餐之间，适当增加 1~2 次
- D. 中午不食
- E. 早餐的饮食量应占全天的 25%，中餐占 40%，晚餐占 35%

【答案】 D

16、男性 18 岁，2 周前曾有上呼吸道感染，现发生牙龈出血、鼻出血。查：神志清，全身皮肤可见瘀斑，肝，脾均未触及。化验血象：WBC 15×10^9

- A. 急性白血病
- B. 急性再生障碍性贫血
- C. 急性溶血性贫血
- D. 特发性血小板减少性紫癜
- E. 过敏性紫癜

【答案】 D

17、患者，男性，65 岁，恶心，腹痛，腹泻 4 次 / 日，伴里急后重感，发热 38.5℃，2 天，大便常规：白细胞 18 个 / HP，红细胞 3~5 个 / HP。

- A. 结肠炎

- B. 急性胃肠炎
- C. 细菌性痢疾
- D. 急性肠炎
- E. 食物中毒

【答案】 C

18、下列哪一种疾病引起头痛，通常不会引起脑疝

- A. 脑梗死
- B. 脑出血
- C. 脑肿瘤
- D. 紧张性头痛
- E. 脑膜炎

【答案】 D

19、患者 32 岁，停经 48 天后，下腹部隐痛半月余，其后阴道持续少量出血 3 天多，右侧附件触及鸡蛋大韧性包块，考虑为

- A. 卵巢囊肿
- B. 子宫肌瘤
- C. 陈旧性宫外孕
- D. 妊娠黄体
- E. 子宫内膜异位症

【答案】 C

20、全科医学的基本原则不包括

- A. 以门诊为主体的服务
- B. 从生到死的全程服务
- C. 为服务对象协调各种医疗资源
- D. 提供以急诊室和家庭病床为主的服务
- E. 提供使社区群众易于利用的服务

【答案】 D

21、患者，男性，32岁。因发热、咽痛、头痛伴腰痛5天、皮疹2天就诊。体温波动在38~39.5℃之间。曾经抗菌药物治疗无效，近2天发现皮肤有出血点瘀点。入院体检：T37.8℃，R30次/分，BP80/55mmHg。面部潮红，颈部、上胸部皮肤潮红，球结膜水肿；软腭有出血点，腋下和胸背部、腹股沟皮肤见出血点、瘀点；颈部可触及一花生粒大小淋巴结；双肺未闻及啰音，心律齐；腹平软，肝脾未触及。化验：血常规 WBC 11×10^9

- A. 发热期
- B. 低血压休克期
- C. 少尿期
- D. 多尿期
- E. 恢复期

【答案】 B

22、完整的全科医疗健康档案一般包括

- A. 以问题为导向的病历记录
- B. 个人健康档案，家庭健康档案，社区健康档案
- C. 病历记录及周期性健康检查
- D. 主要问题目录、问题描述，基本资料
- E. 病历记录、周期性健康检查、会诊转诊单等

【答案】 B

23、属于一级预防的是

- A. 早发现
- B. 社会康复
- C. 健康教育
- D. 康复治疗
- E. 子宫颈癌筛检

【答案】 C

24、老年药物效应动力学特点如下，除了

- A. 肝合成蛋白质能力降低，致结合型药物增多
- B. 对多种药物的敏感性增加
- C. 对少数药物的敏感性降低
- D. 对药物的耐受性降低
- E. 用药依从性差

【答案】 A

25、患者，女性，38岁。患风心病、二尖瓣病变、心房颤动多年。服用地高辛0.25mg，每天1次，共12天，突然心室律变为规整，室率50次/分。

- A. 心衰控制
- B. 洋地黄中毒
- C. 洋地黄剂量不足
- D. 洋地黄剂量合适

E. 未用利尿剂

【答案】 B

26、女性，50岁，近半年排便次数增加，有时伴左下腹隐痛和粪便中混有暗红色血样物质。临床拟诊结肠癌。有关结肠癌的下列描述错误的是

- A. 血行转移多见于肝脏
- B. 结肠癌以淋巴转移为主
- C. 结肠癌早期症状多有便血
- D. 结肠癌大多为腺癌
- E. 结肠癌是胃肠道常见恶性肿瘤

【答案】 C

27、患者，女性，23岁，发热38.5℃，咳嗽，咳黄痰1周，左下肺闻及湿性啰音。

- A. 抗生素
- B. 泰诺林
- C. 沐舒坦
- D. 复方甘草片
- E. 氨茶碱

【答案】 A

28、成年男性患者，体重70kg。因液化气瓶爆炸，导致严重烧伤，烧伤的部位有头面、颈部、双上肢、双下肢和部分躯干前面。其中I度烧伤10%，II度烧伤40%，III度烧伤5%。伤后3小时送来医院，来院前未行任何处理和治疗。初步检查时发现：体温36.5℃，心率130次/分，血压90/65mmHg，患者疼痛呻吟、烦躁不安、口渴，停留尿管引出深黄色尿液100ml。血常规化验：WBC $15 \times 10^9 / L$ ，Hb120g/L。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/347141030144006040>