

2022年初级护师《专业知识》试题及答案解析

[单选题]1. 结核性胸膜炎首发的症状

- A. 低热
- B. (江南博哥). 胸痛
- C. 咯血
- D. 咳痰
- E. 盗汗

参考答案: B

参考解析: 胸痛可为结核性胸膜炎首发或主要症状。

[单选题]2. 哮喘的典型症状是

- A. 反复发作的吸气性呼吸困难
- B. 反复发作的呼气性呼吸困难
- C. 混合性呼吸困难
- D. 逐渐加重的咳嗽、咳痰
- E. 逐渐加重的呼吸困难

参考答案: B

参考解析: 支气管哮喘典型的临床表现是反复发作的伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难。

[单选题]3. 气性坏疽患者用过的敷料最好的灭菌方法是

- A. 高压蒸汽灭菌
- B. 焚毁
- C. 煮沸消毒 1 小时
- D. 3%碘酊浸泡
- E. 3% $H_2O_2$ 浸泡

参考答案: B

参考解析: 燃烧法: 是一种简单、迅速、彻底的灭菌方法。常用于无保留价值的污染物品, 如: 污染纸张, 带脓性分泌物的敷料, 尤其是破伤风、气性坏疽、铜绿假单胞菌等特殊感染污染的敷料。可直接点燃或在焚烧炉中焚烧。

[单选题]4. 对心肌梗死急性期患者的护理哪项不妥

- A. 绝对卧床休息
- B. 预防压疮每小时翻身一次
- C. 持续心电监护
- D. 保持大便通畅
- E. 少食多餐, 不宜过饱

参考答案: B

参考解析: 心肌梗死急性期绝对卧床休息, 保持环境安静, 防止不良刺激, 解除焦虑。

[单选题]5. 急性腹膜炎时预防膈下脓肿的有效措施是

- A. 禁食
- B. 腹腔引流
- C. 半卧位
- D. 补液维持水电平衡
- E. 营养支持

参考答案：C

参考解析：腹腔、盆腔手术后或有炎症的患者采取半坐卧位，可以使渗出液流入盆腔，使感染局限。且盆腔腹膜抗感染性较强，吸收性能差，可以减少炎症的扩散和毒物的吸收，从而既可减轻中毒反应，又可防止感染向上蔓延引起膈下脓肿。

[单选题]6. 糖尿病患者出现强烈饥饿感、心悸、手颤、出汗可能的原因是

- A. 胃溃疡
- B. 糖尿病加重
- C. 高血压
- D. 低血糖
- E. 合并甲亢

参考答案：D

参考解析：糖尿病患者常伴有自主神经功能障碍，影响机体对低血糖的反馈调节能力，增加发生严重低血糖的风险，尤其是老年糖尿病患者。低血糖临床表现呈发作性，发作时间、频率随病因不同而异，与血糖水平以及血糖下降速度有关。可表现为：交感神经兴奋，如饥饿感、流汗、焦虑不安、感觉异常、心悸、震颤、面色苍白、心率加快、脉压增宽、腿软、周身乏力等。

[单选题]7. 急性白血病患者易感染的最主要原因是

- A. 缺乏成熟中性粒细胞
- B. 缺少白蛋白
- C. 缺少红细胞
- D. 缺乏预防接种
- E. 缺乏血小板

参考答案：A

参考解析：急性白血病发热的主要原因是感染，发生感染最主要原因是成熟粒细胞缺乏。

[单选题]8. 硬脊膜外阻滞最严重的并发症是

- A. 低血压
- B. 疼痛
- C. 呕吐
- D. 尿潴留
- E. 全脊椎麻醉

参考答案：E

参考解析：全脊椎麻醉是硬膜外麻醉最危险的并发症。

[单选题]9. 溃疡性结肠炎腹痛的特点是

- A. 腹痛一便意一便后缓解
- B. 腹痛一便意一便后加剧
- C. 腹痛一便意一便后无变化
- D. 腹痛波及全腹
- E. 便后出现腹痛

参考答案：A

参考解析：溃疡性结肠炎临床表现：轻度、中度腹痛，局限于左下腹或下腹部。排便后疼痛可减轻或缓解。

[单选题]10. 儿童正常尿沉渣白细胞每高倍视野应小于

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 5 个
- D. 7 个
- E. 10 个

参考答案：C

参考解析：清洁新鲜尿液离心后沉渣镜检，红细胞 $<3$ 个/HP，白细胞 $<5$ 个/HP，管型一般不出现。

[单选题]11. 患儿，男1岁，发热、喷射性呕吐2天。体检：体温 $39.8^{\circ}\text{C}$ ，嗜睡，面色青灰，前囟隆起，颈强直阳性。引起患儿呕吐最可能的原因是

- A. 胃食管反流
- B. 颅内压增高
- C. 发热
- D. 先天性幽门狭窄
- E. 胃肠功能紊乱

参考答案：B

参考解析：题干中患儿发热、喷射性呕吐，嗜睡，面色青灰，前囟隆起，颈强直阳性，符合化脓性脑膜炎的表现。化脓性脑膜炎的患儿查体可见颅内压增高，所以该患儿呕吐最可能的原因是颅内压增高。

[单选题]12. 原发性肝癌患者行肝叶切除术，切除半肝以上应间歇吸氧多久

- A. 12~24 小时
- B. 2~4 小时
- C. 3~4 天
- D. 10~12 小时
- E. 5~10 小时

参考答案：C

参考解析：原发性肝癌护理：接受半肝以上切除者，间歇给氧3~4日。

[单选题]13. 绒癌患者如果出现胸痛、憋气，可能发生

- A. 肺转移
- B. 肝转移
- C. 脑转移
- D. 肾转移
- E. 脾转移

参考答案：A

参考解析：绒癌患者发生肺转移，则患者可有咯血、胸痛及憋气等。

[单选题]14. 关于肠外营养的护理措施，错误的是

- A. 营养液在无菌环境下配制
- B. 穿刺置管处每日消毒
- C. 需快速输注
- D. 必须 24 小时内输完
- E. 营养液中严禁添加治疗药物

参考答案：C

参考解析：肠外营养的护理：避免输注过快引起并发症和造成营养液的浪费，葡萄糖输注速度应控制在  $5\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{min})$  以下，输注 20% 的脂肪乳剂 250ml 约需 4~5 小时。

[单选题]15. 患者有进食后上腹痛史，每年冬季加剧，近一周出现柏油便提示

- A. 慢性消化不良
- B. 服用铁剂药物
- C. 吃绿色蔬菜过多
- D. 上消化道出血
- E. 胰腺炎症

参考答案：D

参考解析：柏油样便提示上消化道有出血。

[单选题]16. 患者，女，73 岁。因中段食管癌行手术治疗，术后患者胸腔闭式引流管每日引流量约 250ml，呈淡血性，术后第三天引流液逐渐由清亮变浑浊，量较前增多，24 小时 600ml，患者出现胸闷、气急、餐后症状明显。此时可怀疑患者发生的并发症是

- A. 低蛋白血症
- B. 穿孔
- C. 乳糜胸
- D. 吻合口瘘
- E. 伤口感染

参考答案：C

参考解析：食管癌患者的护理：维持胸腔闭式引流通畅，观察引流液量、性状并记录。若引流液量多，由清亮渐转浑浊，则提示有乳糜胸，应及时报告医

师，协助处理。患者术后第三天引流液逐渐由清亮变浑浊，呈淡血性，且患者出现胸闷、气急、餐后症状，考虑为乳糜胸。

[单选题]17. 对低钾血症患者静脉补钾，最重要的参考指标是

- A. 给药速度
- B. 药液浓度
- C. 患者尿量
- D. 用药总量
- E. 患者精神状态

参考答案：C

参考解析：静脉补钾应注意以下事项：尿量要在40ml/h以上；氯化钾浓度一般不超过0.3%；补钾速度不宜超过60滴/min；总量不宜超过3~6g/d。

[单选题]18. 患者，男，38岁。头部外伤后头痛、恶心、呕吐入院，CT检查示颅骨线形骨折，2天后患者头痛加重，呕吐呈喷射状。随之昏迷，查左侧瞳孔散大，对光反射消失，右侧肢体肌张力增高。此时患者的颅内压至少高于

- A. 200mmH<sub>2</sub>O
- B. 50mmH<sub>2</sub>O
- C. 70mmH<sub>2</sub>O
- D. 100mmH<sub>2</sub>O
- E. 180mmH<sub>2</sub>O

参考答案：A

参考解析：患者头痛加重，呕吐呈喷射状，随之昏迷，查左侧瞳孔散大，对光反射消失，右侧肢体肌张力增高，为颅内压增高，此时患者的颅内压至少高于200mmH<sub>2</sub>O。

[单选题]19. 预防产褥感染的措施中，错误的是

- A. 加强孕期教育
- B. 孕晚期禁性交
- C. 及时治疗贫血
- D. 防止产后出血
- E. 产后第二天坐浴

参考答案：E

参考解析：月经期或阴道流血者、孕妇及产后7天内的产妇禁止坐浴。

[单选题]20. 患者，女，60岁。乳腺痛患者。其乳房皮肤出现酒窝征，原因是

- A. 癌瘤堵塞淋巴管
- B. 癌瘤与胸肌粘连
- C. 癌瘤侵犯筋膜
- D. 癌瘤侵犯Cooper韧带
- E. 癌瘤与皮肤粘连

参考答案：D

参考解析：乳腺癌癌肿侵及 Cooper 韧带，可使其缩短而致癌肿表面皮肤凹陷，呈“酒窝征”。

[单选题]21. 关于新生儿坏死性小肠结肠炎粪便性状描述，错误的是

- A. 有腥臭味，带鲜血
- B. 白色陶土便
- C. 红色果酱样便
- D. 赤豆汤样血水便
- E. 黏液稀便

参考答案：B

参考解析：急性坏死性小肠结肠炎患儿腹泻开始为水样或黏液稀便，继而出现赤豆汤样血水便或红色果酱样便，粪便有特殊腥臭味。

[单选题]22. 下列关于成人呼吸窘迫综合征的处理措施中，不正确的是

- A. 采用呼气末正压通气
- B. 控制输液总量
- C. 加快输液速度
- D. 控制感染
- E. 加强营养

参考答案：C

参考解析：呼吸窘迫综合征的处理：①迅速纠正低氧血症。改善肺泡换气功能主要治疗方法是机械通气，选用呼气终末正压通气（PEEP）。②维持有效循环，防止液体过量及肺水肿发生治疗中应准确记录出入量。③治疗感染。④营养支持。

[单选题]23. 关于大量血胸的描述，错误的是

- A. 纵隔向健侧移位
- B. 胸部叩诊浊音
- C. 可出现休克症状
- D. 出血量 1.5~1L
- E. 胸部 X 线片可见胸膜腔大片积液

参考答案：D

参考解析：小量血胸（成人 0.5L 以下）可无明显症状，胸部 X 线检查仅示肋膈角消失。中量（0.5~1L）和大量（1L 以上）血胸：尤其是急性失血，可出现脉搏快弱、四肢冰冷、血压下降、气促等低血容量性休克症状。同时可伴有胸膜腔积液征象，如肋间隙饱满，气管向健侧移位，伤侧胸部叩诊浊音，心界移向健侧，呼吸音减弱或消失。

[单选题]24. 患儿，女性，2 岁，诊断为化脓性胸膜炎，体温 39℃，降温处理后，复测体温的时间是

- A. 60 分钟
- B. 30 分钟

- C. 90 分钟
- D. 120 分钟
- E. 180 分钟

参考答案：B

参考解析：化脓性脑膜炎的患儿。体温大于 38.5℃时，给予物理降温或遵医嘱给予药物降温。每 4 小时测体温一次，并记录。降温后 30 分钟测体温一次，并用降温曲线标明。

[单选题]25. 患者，女，38 岁。甲状腺功能亢进 3 年，拟手术治疗住院，晨测 BP150/90mmHg，P100 次/min，则其基础代谢率是

- A. +59%
- B. +29%
- C. +49%
- D. +69%
- E. +39%

参考答案：C

参考解析： $BMR\% = \text{脉压} + \text{脉率} - 111$ ，患者 BP150/90mmHg，P100 次/min，则其基础代谢率是+49%。

[单选题]26. 长期高血压易导致脏器出现相关并发症，常累及的脏器是

- A. 心、脑、肾
- B. 心、肺、脑
- C. 心、肝、肾
- D. 肝、肾、脑
- E. 肝、肾、肺

参考答案：A

参考解析：高血压并发症：血压持续性升高，造成脑、心、肾、眼底等损伤，出现相应表现。

[单选题]27. 初产妇，从分娩次日起持续 3 天体温在 37.5℃左右，子宫收缩好，无压痛，会阴伤口无红肿、无疼痛，恶露鲜红色，无臭味，双乳肿胀，有硬结。发热的原因最可能是

- A. 上呼吸道感染
- B. 乳头皲裂
- C. 会阴伤口感染
- D. 子宫感染
- E. 乳腺炎

参考答案：E

参考解析：急性乳腺炎：患者患侧乳房胀痛，局部红、肿、发热、压痛。继之出现高热、寒战，脉率加快，常有患侧淋巴结肿大、压痛。患者双乳肿胀，有硬结。考虑有乳腺炎。

[单选题]28. 患者，男，55岁。某晚参加朋友聚会大量饮酒后次晨发现已死亡，检查发现两侧腰腹部有大片青紫斑，床上有少量咖啡渣样液。最可能的死亡原因是

- A. 胃溃疡并出血
- B. 脑梗死
- C. 急性心肌梗死
- D. 脑出血
- E. 急性出血坏死型胰腺炎

参考答案：E

参考解析：重症急性胰腺炎：少数患者可因胰酶、坏死组织、出血沿着腹膜间隙与肌层渗入腹壁下，使两侧肋腹部皮肤呈暗灰蓝色，称之为 Grey-Turner 征。出血坏死型者病情较重，疼痛持续时间较长。当发生腹膜炎时，疼痛可波及全腹。患者大量饮酒后次晨发现已死亡，两侧腰腹部有大片青紫斑，考虑为急性出血坏死型胰腺炎。

[单选题]29. 初产妇，28岁。妊娠39周，臀位。30分钟前阴道流液，量较多。此时急诊护士最恰当的处理是

- A. 立即用 pH 试纸检查是否破膜
- B. 详细询问产妇流液的情况
- C. 立即阴道检查是否破膜
- D. 嘱产妇平卧，抬高臀部，听胎心
- E. 立即行羊膜镜检查

参考答案：D

参考解析：胎膜早破临床表现：孕妇突感有较多液体自阴道流出，增加腹压时阴道流液量增多。结合题干产妇阴道流液，量较多，考虑为胎膜早破。此时应绝对卧床休息，抬高臀部，避免不必要的肛诊与阴道检查。

[单选题]30. 患者，女，59岁。食管癌切除、食管胃吻合术后第5天，出现高热、寒战、呼吸困难、胸痛，白细胞  $20 \times 10^9/L$ 。高度怀疑发生了

- A. 肺炎、肺不张
- B. 吻合口瘘
- C. 吻合口狭窄
- D. 乳糜胸
- E. 出血

参考答案：B

参考解析：胸内吻合口瘘多发生在术后5~10天，主要表现为患者出现呼吸困难、胸痛、胸腔积液和全身中毒症状，如高热、寒战甚至休克等。结合本题患者食管癌切除、食管胃吻合术后第5天，出现高热、寒战、呼吸困难、胸痛，白细胞  $20 \times 10^9/L$ ，故答案选B。

[单选题]31. 新生儿，女，出生时全身皮肤苍白，呼吸微弱，心率30次/min，

四肢略屈曲，弹足底无反应。该患者窒息程度为

- A. 无窒息
- B. 轻度窒息
- C. 中度窒息
- D. 重度窒息
- E. 极重度窒息

参考答案：D

参考解析：重度（苍白）窒息：Apgar 评分 0~3 分。评分项目：新生儿皮肤苍白；口唇暗紫；无呼吸或仅有喘息样微弱呼吸；心跳不规则；心率 $<80$  次/min 且弱；对外界刺激无反应；喉反射消失；肌张力松弛。该患儿呼吸微弱 1 分，心率 30 次/min 1 分，四肢略屈曲 1 分，共 3 分，应为重度窒息，如果不及时抢救可致死亡，且患儿死亡率及日后发生脑部后遗症的机会明显增加。

[单选题]32. 患儿，女，7 个月。感冒后出现全身皮肤、黏膜散在出血点，多为针尖大小，分布不均，以四肢为多，并有鼻出血。血化验：血小板为  $20 \times 10^9$  /L，红细胞及白细胞正常，诊断为特发性血小板减少性紫癜。该患儿护理措施中错误的是

- A. 给予肾上腺皮质激素治疗
- B. 密切观察患儿呼吸、脉搏、神志等
- C. 忌服阿司匹林药物
- D. 鼓励患儿多运动
- E. 禁食尖锐、多刺的食物

参考答案：D

参考解析：特发性血小板减少性紫癜的患者应适当限制活动；血小板 $<50 \times 10^9$  /L，勿做较强体力活动，可适当散步，预防各种外伤；避免使用损伤血小板的药物，如阿司匹林、保泰松、右旋糖酐等；定期门诊复查，坚持治疗。

[单选题]33. 患者，男，38 岁。在工地干活时不慎被钢钉扎伤腿部，伤口深约 2.3cm，来院后使用破伤风抗毒素治疗，该患者伤口处理最适合的溶液是

- A. 0.02%呋喃西林
- B. 0.01%苯扎溴铵
- C. 3%过氧化氢
- D. 0.9%氯化钠
- E. 0.02%洗必泰

参考答案：C

参考解析：该患者伤口应彻底清除坏死组织和异物，用 3%过氧化氢溶液冲洗，敞开伤口，充分引流。

[单选题]34. 患者，男。不慎被开水烫伤双上肢及躯体前面，皮肤水泡壁薄，疼痛敏感，水泡破裂后皮肤呈红色。该患者烫伤面积是

- A. 25%

- B. 31%
- C. 36%
- D. 13%
- E. 45%

参考答案：B

参考解析：中国新九分法：将人体按体表面积划分为11个9%的等份，另加1%，构成100%。适用于较大面积烧伤的评估，可简记为：3.3.3（头、面、颈），5.6.7（双手、双前臂、双上臂），5.7.13.21（双臀、双足、双小腿、双大腿），13.13（躯干），会阴1。根据题干，5+6+7+13=31，因此为B选项。

[单选题]35. 预防肾盂肾炎最简单的措施是给予

- A. 隔天一次抗生素口服
- B. 多饮水
- C. 保持外阴清洁
- D. 每天冲洗膀胱
- E. 每天尿道口消毒

参考答案：B

参考解析：预防肾盂肾炎最简单的措施是多饮水，督促患者2小时排尿1次以冲洗细菌和炎症物质，减少炎症对膀胱和尿道的刺激。

[单选题]36. 护士为一淋巴肉瘤患者静脉注射氮芥（化疗药物），患者感到局部明显疼痛，肿胀，回抽无回血，立即拔出针头，但局部仍痛，下列处理哪项正确

- A. 给止疼药
- B. 给热水袋热敷
- C. 以50%硫酸镁湿热敷
- D. 外敷止痛膏
- E. 局部冷敷以10%硫代硫酸钠局部封闭

参考答案：B

参考解析：本题针头未刺入血管内，可作局部热敷、按摩，待血管充盈后再穿刺。

[单选题]37. 最易发展为结核性脑膜炎的情况是

- A. 肺部粟粒型结核经血行传播
- B. 脑膜结核干酪病变破溃
- C. 结核性胸膜炎
- D. 脑实质结核灶
- E. 干酪性肺炎

参考答案：A

参考解析：结脑的病原菌为人型或牛型结核杆菌。结脑为全身粟粒型结核的一部分，由于小儿血-脑屏障功能差，中枢神经系统发育不成熟，免疫功能不完

善，入侵的结核杆菌易经血行播散，由肺或骨结核等播散而来。

[单选题]38. 急性硬脑膜下血肿的典型临床表现是

- A. 清醒
- B. 昏迷逐渐发生
- C. 伤后持续性昏迷
- D. 伤后昏迷有中间清醒期
- E. 昏迷后没有颅内压增高

参考答案：C

参考解析：急性硬脑膜下血肿：主要由脑实质血管破裂所致。因多数与脑挫裂伤和脑水肿同时存在，故表现为伤后持续昏迷或昏迷进行性加重，少有“中间清醒期”，较早出现颅内压增高和脑疝症状。

[单选题]39. 有机磷农药中毒后患者呼出的气体气味是

- A. 蒜臭味
- B. 烂苹果味
- C. 苦杏仁味
- D. 酒味
- E. 粪臭味

参考答案：A

参考解析：有机磷农药中毒后呼出气体为蒜臭味。恶臭味可见于支气管扩张症或肺脓肿病人。肝腥(肝臭)味可见于肝性脑病(肝昏迷)病人。氨(尿)味可见于尿毒症病人。烂苹果味可见于糖尿病酮症酸中毒病人。

[单选题]40. 患者，男，46岁。因急性梗阻性化脓性胆管炎急诊入院。患者寒战，高热，体温41℃，脉搏116次/min，血压80/60mmHg。其休克类型是

- A. 过敏性休克
- B. 低血容量性休克
- C. 心源性休克
- D. 神经性休克
- E. 感染性休克

参考答案：E

参考解析：急性梗阻性化脓性胆管炎是急性胆管完全梗阻和化脓性感染所致，它是胆道感染疾病中的严重类型，大量细菌、毒素进入胸导管、血循环，可导致脓毒血症和感染性休克，甚至发生多脏器功能障碍或衰竭。

[单选题]41. 关于要素饮食保存的要求正确的是

- A. 常温下保存12小时
- B. 4℃冰箱中保存48小时
- C. 0℃冰箱中保存1周
- D. 4℃冰水箱中保存24小时
- E. 0℃冰箱中保存48小时

参考答案：D

参考解析：要素饮食配制液需要保存在4℃以下冰箱内冷藏，配制好的要素饮食应保证于24小时内用完。

[单选题]42. 患者，女，28岁。乏力，心悸，两颧部发红，口唇发绀。查体：第一心音增强，心尖部可闻及舒张期隆隆期杂音。其杂音产生的原因是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 肺动脉瓣狭窄
- E. 主动脉瓣关闭不全

参考答案：A

参考解析：二尖瓣狭窄的临床表现为乏力，心悸，胸闷，口唇发绀，可闻及舒张期隆隆期杂音。故选A。

[单选题]43. 急腹症最突出的表现是

- A. 腹痛
- B. 败血症
- C. 休克
- D. 恶心、呕吐
- E. 腹泻

参考答案：A

参考解析：急腹症最突出的表现是腹痛。

[单选题]44. 甲状腺功能亢进症最具特征的临床表现是

- A. 易激动
- B. 怕热多汗
- C. 多食易饥
- D. 皮肤温暖
- E. 突眼征

参考答案：E

参考解析：原发性甲亢最常见，占85%~90%，以20~40岁女性多见。患者在出现甲状腺肿大的同时出现功能亢进症状，表现为腺体弥漫性、两侧对称性肿大，常伴有眼球突出，故又称“突眼性甲状腺肿”。

[单选题]45. 肝硬化晚期最严重并发症也是晚期死亡主要原因是

- A. 上消化道出血
- B. 肾病综合征
- C. 肝性脑病
- D. 感染
- E. 肝肾综合征

参考答案：C

参考解析：肝性脑病：是晚期肝硬化最严重的并发症，亦是常见死亡原因。

[单选题]46. 患者，男，36岁。胸腔术后胸膜腔闭式引流管不慎自胸壁伤口脱出，首要的措施是

- A. 急呼医生处理
- B. 将引流管重新插入胸腔
- C. 手指捏紧引流口皮肤，勿使进气
- D. 吸氧
- E. 急送手术室

参考答案：C

参考解析：若引流管从胸腔滑脱，立即用手扞闭伤口处皮肤，消毒处理后，用凡士林纱布封闭伤口，并协助医师做进一步处理。

[单选题]47. 患者，男，65岁。因确诊“胆囊结石”收住入院。既往有吸烟史5年，高血压史7年，规律口服降压药物，血压控制良好。完善各项检查后予行“腹腔镜胆囊切除术”，术前准备不正确的是

- A. 术前脐部清洁
- B. 术前指导进行深呼吸，有效咳嗽
- C. 术前晚清淡饮食
- D. 术前1天晚行清洁灌肠
- E. 胆绞痛发作时，按医嘱给解痉镇静和止痛

参考答案：C

参考解析：术前胃肠道准备：普通消化道手术者，术前1~2天开始进流质饮食；有幽门梗阻的患者，需在术前洗胃；结直肠手术者，根据情况在术前1天及手术当天清晨行清洁灌肠或结肠灌洗，并于术前2~3天开始进流食、口服肠道抑菌药物，以减少术后并发感染的机会。腹部手术者应注意脐部清洁。患者行“腹腔镜胆囊切除术”，术前准备不正确的是“术前晚清淡饮食”。

[单选题]48. 患者发生呼吸困难时，最适宜的体位是

- A. 半坐卧位
- B. 平卧位
- C. 右侧卧位
- D. 左侧卧位
- E. 俯卧位

参考答案：A

参考解析：心肺疾病引起呼吸困难的患者采用半坐卧位，可利用重力作用，使膈肌位置下降，胸腔容积的大，同时也减轻内脏对心肺的压力，使呼吸困难得到改善。

[单选题]49. 患者，男，43岁。劳动中操作割草机不当，导致右手外伤性截肢，行断肢再植术，术后护理错误的是

- A. 专人护理，限制探视

- B. 严禁患肢抬高，以免引起供血不足
- C. 住单间病房
- D. 应用抗菌药物
- E. 采取措施防止血管痉挛

参考答案：B

参考解析：抬高患肢至略高于心脏水平，利于静脉回流，但不宜过高以免影响血供。手术后住单人病房，专人护理，限制探视。防止血管痉挛，以免影响再植肢体血供，并遵医嘱使用抗菌药物，预防感染。

[单选题]50. 门静脉高压症患者术前护理错误的是

- A. 测量腹围和体重
- B. 增加钠盐的摄入
- C. 合理使用利尿剂
- D. 注意休息
- E. 纠正低蛋白血症

参考答案：B

参考解析：门静脉高压症三主征：脾大、脾功能亢进，呕血和黑便，腹水。因为腹水是最突出的体征，要限制钠盐的摄入，不宜增加钠盐摄入，以免加重腹水。

[单选题]51. 患者，男，38岁。因慢性风心病二尖瓣狭窄全心衰竭住院，限制水入量的目的是

- A. 降低基础代谢
- B. 保持大便通畅
- C. 减轻呼吸困难
- D. 减轻胃肠道负担
- E. 减轻心脏负荷

参考答案：E

参考解析：全心衰竭同时出现左心衰和右心衰的症状。表现为急性肺水肿、肝大、水肿、肝颈静脉回流征阳性等症状。为减轻心脏负荷，应限制水钠摄入量。

[单选题]52. 患者，男，78岁。高血压20余年，于上午9时在公园活动后出现剧烈头痛、头晕、呕吐，继而出现意识障碍，测血压200/105mmHg，入院诊断：脑出血。入院后护士为患者抬高头部，其目的是

- A. 增加脑血流
- B. 减轻脑水肿
- C. 保持呼吸道通畅
- D. 防止加重脑出血
- E. 防止窒息

参考答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/358136002057006034>