

2021-2022 年护师类之护师（初级）通关考试题库带 答案解析

单选题（共 90 题）

1、属于脂溶性维生素的是（ ）。

- A. 维生素 K
- B. 维生素 B6
- C. 维生素 B1
- D. 维生素 C
- E. 维生素 PP

【答案】 A

2、下列麻醉药的使用哪项错误

- A. 利多卡因常用浓度为 0.1%~0.2%
- B. 普鲁卡因常用浓度为 0.5%~2%
- C. 罗吡卡因一次用量不超过 150mg
- D. 丁卡因神经阻滞一次用量不超过 80mg
- E. 盐酸布比卡因极量一次 200mg

【答案】 A

3、植皮术中应用最广的皮片是

- A. 刃厚皮片
- B. 断层皮片
- C. 点状皮片
- D. 全厚皮片

E. 保留真皮下血管的皮片

【答案】 B

4、周围静脉给予胃肠外营养的时间一般不超过

A. 1 周

B. 2 周

C. 3 周

D. 4 周

E. 5 周

【答案】 B

5、下列对胎盘的描述，错误的是

A. 妊娠 12 周基本形成

B. 胎盘重 600~1000g

C. 母面暗红而粗糙

D. 子面光滑，呈灰白色，表面为羊膜

E. 由羊膜、叶状绒毛膜和底蜕膜组成

【答案】 B

6、消化性溃疡的表现

A. 进行性吞咽困难

B. 慢性、周期性、节律性上腹疼痛

C. 大量呕吐隔夜食物

D. 进食污染食物后急性呕吐，上腹不适伴腹痛

E. 右下腹痛，常在进食后诱发，大便后缓解

【答案】 B

7、各型糖尿病病人最基本的治疗护理措施是

A. 控制饮食

B. 口服降糖药

C. 胰岛素治疗

D. 运动疗法

E. 心理疗法

【答案】 A

8、会阴、阴道手术后，会阴擦洗常用药液为

A. 1:5000 高锰酸钾溶液

B. 0.2%~0.5%碘伏溶液

C. 1%乳酸溶液

D. 0.5%醋酸溶液

E. 2%~4%碳酸氢钠溶液

【答案】 A

9、类风湿关节炎是

A. 病变累及骨、关节及肌脏、滑囊、筋膜等周围软组织的一组疾病

B. 主要表现为周围对称性的多关节慢性炎症的自身免疫性疾病

C. 因血管壁炎症和坏死而导致多系统损害的自身免疫性疾病

D. 多见于青少年，以中轴关节慢性炎症为主的疾病

E. 病变累及全身多个系统，血清中存在多种致病性自身抗体，有明显的免疫紊乱的自身免疫性结缔组织疾病，育龄女性多见

【答案】 B

10、75%乙醇浸泡金属器械消毒需要

- A. 5 分钟
- B. 10 分钟
- C. 20 分钟
- D. 30 分钟
- E. 60 分钟

【答案】 D

11、患儿女，15 个月，发热、腹泻 1 天，尿少半天，院外补液治疗，护士对患儿家长的用药指导正确的是服用

- A. 温开水
- B. 生理盐水
- C. 葡萄糖溶液
- D. 口服补液盐
- E. 2: 1 等张含钠液

【答案】 D

12、肺癌最基本和常用的检查手段是

- A. CT 检查
- B. 支气管镜检查
- C. 胸部 X 线检查

D. 经胸壁穿刺活检

E. 痰细胞学检查

【答案】 C

13、患者，女性，57岁，胃溃疡数年，经内科系统治疗无效，近日入院手术治疗。

A. 禁食6小时、禁水3~4小时

B. 禁食8小时、禁水2~3小时

C. 禁食8小时、禁水4~6小时

D. 禁食12小时、禁水4~6小时

E. 禁食12小时、禁水6~8小时

【答案】 D

14、接触黏膜的医疗用品细菌菌落总数应不超过

A. 10cfu/g 或 10cfu / 100cm

B. 20cfu/g 或 20cfu/100cm

C. 15cfu/g 或 15cfu/100cm

D. 8cfu/g 或 8cfu / 100cm

E. 30cfu/g 或 30cfu/100cm

【答案】 B

15、患者，女性，64岁。主诉阴道口有一肿物脱出3年。查体发现：子宫颈已脱至阴道口外，子宫体在阴道内。该患者诊断为子宫脱垂，其程度应属于

A. I度轻

B. I度重

C. II度轻

D. II度重

E. III度

【答案】 C

16、急性骨髓炎开窗引流冲洗术后3天内最主要的护理是

A. 鼓励患者早期活动

B. 保持引流通畅、连续冲洗与吸引

C. 观察体温变化

D. 加强饮食护理

E. 患肢制动

【答案】 B

17、心肺复苏初期，首先恢复的是（ ）。

A. 体温

B. 血压

C. 呼吸

D. 心搏

E. 皮肤

【答案】 D

18、患者，女性，65岁，门静脉高压症入院，拟行手术治疗，患者术前一般不放胃管，是为了

A. 以免影响进食

- B. 以免引起胃穿孔
- C. 防止出血
- D. 减少插管的痛苦
- E. 防止胃液丢失

【答案】 C

19、类风湿关节炎是

- A. 病变累及骨、关节及肌脏、滑囊、筋膜等周围软组织的一组疾病
- B. 主要表现为周围对称性的多关节慢性炎症的自身免疫性疾病
- C. 因血管壁炎症和坏死而导致多系统损害的自身免疫性疾病
- D. 多见于青少年，以中轴关节慢性炎症为主的疾病
- E. 病变累及全身多个系统，血清中存在多种致病性自身抗体，有明显的免疫紊乱的自身免疫性结缔组织疾病，育龄女性多见

【答案】 B

20、患者，男性，43岁。因颈部肿块来院就诊，经检查后确诊为晚期鼻咽癌。患者对该诊断难以相信，多次去其他医院检查确认。该患者此时的心理反应期属于

- A. 否认期
- B. 愤怒期
- C. 协议期
- D. 抑郁期
- E. 接受期

【答案】 A

21、门静脉高压症患者，脾大、脾功能亢进，其外周血象改变是

- A. 白细胞升高，血小板升高
- B. 白细胞升高，血小板降低
- C. 白细胞降低，血小板升高
- D. 血小板降低，白细胞降低
- E. 白细胞升高，血小板无改变

【答案】 D

22、年长儿首选的止惊药是

- A. 地西洋
- B. 苯妥英钠
- C. 苯巴比妥钠
- D. 复方氯丙嗪
- E. 10%水合氯醛

【答案】 A

23、妊娠期母体变化，下列不正确的是

- A. 妊娠 32 周血容量增加达高峰
- B. 妊娠晚期易发生外阴及下肢静脉曲张
- C. 子宫峡部在妊娠后期形成子宫下段
- D. 妊娠末期孕妇血液处于低凝状态
- E. 妊娠后卵巢不排卵

【答案】 D

24、手足搐搦症患儿最危险的症状是

- A. 惊厥
- B. 手足搐搦
- C. 喉痉挛
- D. 夜惊
- E. 烦躁

【答案】 C

25、在肝性脑病的治疗中，禁止使用的药物是

- A. 西咪替丁
- B. 地西洋
- C. 谷氨酸钾
- D. 精氨酸
- E. 硫酸镁

【答案】 B

26、属于肿瘤二级预防的措施是（ ）。

- A. 环境保护
- B. 积极治疗癌前病变
- C. 手术
- D. 放疗
- E. 化疗

【答案】 B

27、与风湿热的发病有关的病原体是（ ）。

- A. 白色念珠菌
- B. 绿脓杆菌
- C. 大肠杆菌
- D. 溶血性链球菌
- E. 葡萄球菌

【答案】 D

28、系统性红斑狼疮症发病中可能起作用的（ ）。

- A. 雄激素
- B. 雌激素
- C. 生长激素
- D. 肾素
- E. 黑色素

【答案】 B

29、患者男，22岁，腰背部肌肉拉伤，给予冷疗，护士想病人介绍如需反复使用冷疗，中间要间隔

- A. 20分钟
- B. 30分钟
- C. 50分钟
- D. 1小时
- E. 1.5小时

【答案】 D

30、初产妇，27岁，妊娠高血压。剖宫产术后硫酸镁静脉滴注，最先出现的毒性反应是

- A. 血压过低
- B. 尿量过少
- C. 心率减慢
- D. 膝腱反射减弱或消失
- E. 呼吸减慢

【答案】 D

31、急性支气管炎，胸部X线片表现为

- A. 大小不等的片状阴影
- B. 常伴有肺气肿和支气管周围炎
- C. 有均匀的大片状密实影
- D. 肺纹理增粗，肺门阴影加深
- E. 肺透明度增加或肺不张

【答案】 D

32、下列关于脑脊液漏患者的护理措施正确的是

- A. 干棉球严堵外耳道
- B. 脑脊液鼻漏者，应经鼻腔吸痰
- C. 可进行腰椎穿刺
- D. 应积极使用抗生素和破伤风抗毒素
- E. 脑脊液耳漏者，应进行外耳道滴药

【答案】 D

33、下列关于急性感染性喉炎的护理措施，描述错误的是

- A. 保持室内空气清新，温湿度适宜
- B. 随时做好气管切开的准备
- C. 补充足量的水分和营养
- D. 烦躁时使用氯丙嗪
- E. 用 1%~3%麻黄碱和肾上腺皮质激素超声雾化吸入

【答案】 D

34、初乳中含量较多的免疫因子是

- A. IgG
- B. IgD
- C. sIgA
- D. IgM
- E. IgE

【答案】 C

35、胃癌主要的转移途径是（ ）。

- A. 淋巴
- B. 血运
- C. 直接蔓延
- D. 脱落细胞种植
- E. 多途径转移

【答案】 A

36、患者，女性，27岁，确诊SLE1年，下肢及面部水肿2周。检查：尿中有蛋白(++)，管型(+)，血压124/80mmHg，脉搏88/min。

- A. 症状改善可间歇停药
- B. 育龄女性可用雌激素避孕
- C. 避免预防接种
- D. 多晒太阳增加维生素吸收
- E. 可使用化妆品

【答案】 C

37、早孕时，孕妇典型的体征是

- A. 尿频
- B. 早孕反应
- C. 胎心音
- D. 停经
- E. 子宫出现黑加征

【答案】 D

38、患儿，女，1岁。多汗，睡眠不安，方颅及肋骨串珠，X线检查骨骺端临时钙化带消失，呈毛刷样，杯口状改变，骨骺软骨带明显增宽，骨密度减低。此患儿最可能的临床诊断是维生素D缺乏佝偻病激期。针对此期该患儿的健康指导，正确的是

- A. 多练走
- B. 多练站

- C. 多练坐
- D. 避免久站
- E. 用矫正器

【答案】 D

39、胎龄 33 周早产儿，生后 3 天，表现为拒乳，反应差，哭声低，心音低钝，心率减慢，尿少，体温 34℃，小腿及大腿皮肤发凉、硬肿，该患儿不适宜的处理措施是

- A. 快速复温
- B. 供给足够的热量
- C. 控制感染
- D. 支持疗法
- E. 对症处理

【答案】 A

40、患者，女性，18 岁，链霉素皮肤过敏试验时发生休克，护士给予盐酸肾上腺素的浓度和剂量为

- A. 1%, 0.5~1.0ml
- B. 0.1%, 0.5~1.0ml
- C. 2%, 0.5~1.0ml
- D. 0.2%, 0.5~1.0ml
- E. 0.5%, 0.5~1.0ml

【答案】 B

41、患者，女性，69岁。诊断为慢性阻塞性肺疾病，经治疗后，病情好转予以出院，出院时，护理人员指导患者进行缩唇腹式呼吸训练，正确的是

- A. 深呼缓吸
- B. 取俯卧屈膝位
- C. 用鼻吸气用口呼气
- D. 吸气时尽力收腹
- E. 呼气时尽力挺腹

【答案】 C

42、股骨干上1/3段骨折，近端出现

- A. 患肢内收、缩短、外旋畸形
- B. 枪刺刀畸形
- C. 屈曲、外旋、外展移位
- D. 骨筋膜室综合征
- E. 复位、固定、功能锻炼

【答案】 C

43、患者男性，17岁。确诊为1型糖尿病2年，一直坚持胰岛素治疗，近期出现显著乏力，口渴严重，尿量增加并伴有头痛。此时应警惕发生

- A. 脑血管意外
- B. 糖尿病酮症酸中毒
- C. 乳酸性酸中毒
- D. 糖尿病高渗性昏迷
- E. 低血糖性昏迷

【答案】 B

44、患者女，38岁。体重50kg，肠梗阻，血压107/70mmHg，P90次/分，面部潮红，呼吸深快，患者宜先补充

- A. 输血 400ml
- B. 等渗盐水 1000ml
- C. 5%碳酸氢钠 250ml
- D. 5%葡萄糖溶液 1000ml
- E. 1.12%乳酸钠 200ml

【答案】 C

45、全身麻醉中最严重的并发症是（ ）。

- A. 心搏停止
- B. 肺不张
- C. 肺梗死
- D. 低血压
- E. 室性心律失常

【答案】 A

46、患儿男，1岁。发热2天伴抽搐入院。入院T39℃，前囟紧张，治疗2天效果不明显，今日出现烦躁、易激惹，呼吸急促，60次/分，血气分析异常，pH下降，诊断为呼吸衰竭，最有效的治疗措施是

- A. 物理降温
- B. 给呼吸兴奋剂及血管活性药物
- C. 注射镇静剂，防止惊厥
- D. 密切监测生命体征

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/365333103334011102>