

## 血液透析专科知识模拟题库含答案

1、采用局部枸橼酸钠抗凝时，不需要监测哪些项目（ ）

- A、电解质
- B、血糖
- C、血气
- D、凝血功能 ACT
- E、APTT

答案：B

2、血液透析患者并发肾性骨营养不良的护理对策不包括（ ）

- A、限制饮食中的磷 < 600-1200mg/d
- B、进食高磷食物
- C、减少蛋白质摄入
- D、加强护患沟通，做好心理疏导
- E、药物的应用

答案：E

3、患者蛛网膜下腔麻醉术后持续头痛，抬头或坐起时加重，一般止痛药无效，该患者头痛的原因可能是（ ）

- A、脑脊液外漏
- B、颅内压增高
- C、脑血管痉挛
- D、血压低
- E、血压高

答案：A

4、（ ）部门应当建立血液透析室工作人员规范化培训和考核制度，加强继续教育，提高血液透析室工作人员的业务技术水平。

- A、县级卫生行政
- B、市级卫生行政
- C、省级卫生行政
- D、省级疾病控制
- E、市级疾病控制

答案：C

5、患者咳铁锈色痰应考虑为（ ）

- A、支气管扩张
- B、肺结核
- C、肺炎球菌肺炎

- D、肺脓肿
- E、急性肺水肿

答案：C

6、低磷食物不包括（ ）

- A、奶制品
- B、冬瓜
- C、苹果
- D、猪排骨
- E、桔子

答案：A

7、血浆置换疗法中抗凝剂肝素用量大约为常规血透的（ ）

- A、同样
- B、2倍
- C、3倍
- D、4倍
- E、5倍

答案：B

8、纠正代谢性酸中毒首选（ ）

- A、11.2%乳酸钠
- B、5%碳酸氢钠
- C、3.6%三羟甲基氨基甲烷
- D、0.9%氯化钠
- E、葡萄糖酸钙

答案：B

9、腹膜透析患者腹膜炎治愈后（ ）个月行腹膜平衡试验一次

- A、1个月
- B、2个月
- C、3个月
- D、4个月
- E、5个月

答案：A

10、危重透析患者转运中的注意事项包括（ ）

- A、转运工作主要由经验丰富的血液透析中心医生、护士及工勤人员共同完成
- B、转运过程中根据病情备齐相应的药品和器材

- C、事前联系相关科室，楼层转运电梯专候，避免长时间等候增加转运风险
- D、转运中密切观察生命体征变化
- E、以上都对

答案：E

11、血液透析患者在血液透析（ ）后可以游泳

- A、4h
- B、6h
- C、8h
- D、12h
- E、16h

答案：D

12、《血液透析及其相关治疗用水》YY0572-2015 标准中，透析用水中内毒素含量为（ ），干预标准为（ ）

- A、 $<2\text{EU/ml}$ ,  $1\text{EU/ml}$
- B、 $<1\text{EU/ml}$ ,  $0.5\text{EU/ml}$
- C、 $<0.5\text{EU/ml}$ ,  $0.25\text{EU/ml}$
- D、 $<0.25\text{EU/ml}$ ,  $0.125\text{EU/ml}$
- E、 $<0.125\text{EU/ml}$ ,  $0.03\text{EU/ml}$

答案：D

13、血液透析低磷血症患者血磷持续小于（ ）不利于骨重建，并会出现骨痛

- A、 $0.5\text{mmol/L}$
- B、 $0.6\text{mmol/L}$
- C、 $0.7\text{mmol/L}$
- D、 $0.8\text{mmol/L}$
- E、 $0.9\text{mmol/L}$

答案：D

14、透析治疗过程中机器不是静脉压低报警的原因（ ）

- A、静脉管与针头连接松脱或静脉针滑脱
- B、静脉压测定口连接不当
- C、患者侧卧体位，静脉受压
- D、血流量减少
- E、透析器严重凝血

答案：C

15、肠梗阻患者的治疗原则是（ ）

- A、禁食、补液
- B、灌肠、促进肠蠕动恢复
- C、输液、纠正全身生理紊乱
- D、解除肠道梗阻和矫正全身生理紊乱
- E、手术治疗

答案：D

16、引起肝硬化的病因不包括（ ）

- A、甲型肝炎
- B、酒精中毒
- C、胆汁淤积
- D、营养障碍
- E、血吸虫病

答案：A

17、下列哪种药物中毒后可以用血液透析清除（ ）

- A、乙醇
- B、有机磷农药
- C、非水溶性的药物
- D、与蛋白结合的药物
- E、以上都不对

答案：A

18、血液透析患者临时血管通路的适应症（ ）

- A、有明显出血倾向者
- B、高钾血症
- C、不能耐受穿刺疼痛者
- D、神志不清、躁动者
- E、置管部位存在解剖变异

答案：B

19、以下关于高血压非药物治疗中正确的是（ ）

- A、每人每天平均食盐量降至 8g
- B、减轻精神压力，保持平衡心理
- C、多注意卧床休息，保持体力
- D、高热量、高蛋白、高维生素饮食
- E、严格戒烟戒酒

答案：B

20、留置导管最常见的并发症（ ）

- A、导管脱落
- B、导管功能障碍
- C、渗血
- D、血栓
- E、出血

答案：D

21、根据 Fick 定律，溶质的弥散量与（ ）无关

- A、溶质运动的距离
- B、溶质弥散系数
- C、浓度梯度差
- D、溶质弥散面积
- E、超滤量

答案：E

22、急性肾衰少尿或无尿期易引起高钾血症，其危害是（ ）

- A、全身水肿
- B、体重增加
- C、高血压
- D、低血压
- E、抑制心肌细胞易致严重心律失常

答案：E

23、下列提示休克患者进入微循环衰竭期的是（ ）

- A、代谢性酸中毒
- B、血压低，脉搏细数
- C、神志淡漠
- D、末梢血运差
- E、皮肤出现瘀斑、瘀点

答案：E

24、透析患者发生相关性低血压时应立即（ ）

- A、减慢血流量、停止超滤
- B、注射 50%葡萄糖
- C、降低温度
- D、给予升压药
- E、以上都对

答案：A

25、下列属于浸润性突眼特征的是（ ）

- A、瞬目减少
- B、上眼睑挛缩
- C、常有异物感
- D、眼裂增宽
- E、双眼视近物时，辐凑不良

答案：C

26、血浆分离速度与跨膜压（TMP）大小呈正相关，临床中将 TMP 控制在（ ）

- A、50-100mmHg 左右
- B、20-50mmHg 左右
- C、150-180mmHg 左右
- D、180-200mmHg 左右
- E、250mmHg 以上

答案：A

27、GRF 下降到 70ml / min，血醛固酮增加几倍（ ）

- A、1 倍
- B、2 倍
- C、3 倍
- D、4 倍
- E、5 倍

答案：C

28、心力衰竭最常见的诱发因素是（ ）

- A、心律失常
- B、心理压力过大
- C、感染
- D、血容量增加
- E、药物作用

答案：C

29、记录透析器凝血情况作为下次透析肝素用量调整的参考，可通过估计凝血纤维所占比例来进行凝血程度分类，一般多于（ ）的纤维凝血为III 级凝血

- A、0.1
- B、0.2
- C、0.3
- D、0.4

E、0.5

答案：E

30、肝性脑病患者的护理措施中，最重要的环节是（ ）

- A、加强安全措施
- B、去除和避免一切诱发因素
- C、注意休息
- D、合理饮食
- E、密切观察病情变化

答案：B

31、常用于医院透析用水处理的反渗透膜是（ ）

- A、平板式
- B、卷式
- C、管式
- D、中空纤维式
- E、以上都不对

答案：B

32、肾移植排斥反应主要有（ ）

- A、超急性排斥反应
- B、急性排斥反应
- C、移植物抗宿主反应
- D、慢性排斥反应
- E、以上都是

答案：E

33、血浆置换疗法的时间间隔（ ）

- A、1-2d
- B、2-3d
- C、3-4d
- D、4-5d
- E、5-6d

答案：A

34、动静脉内瘘血流量不足的原因（ ）

- A、穿刺方法不当
- B、穿刺失败
- C、血肿形成
- D、内瘘护理不当

E、以上都对

答案：E

35、MARS FLUX 是仿生物膜，膜的厚度只有普通透析膜的（ ），膜总面积为 2.4m<sup>2</sup>。

A、1/50~1/100

B、1/500~1/100

C、1/50~1/10

D、1/1000~1/500

E、1/5~1/10

答案：B

36、人工血管动静脉内瘘的优点（ ）

A、生物相容性好

B、血流量大

C、能反复穿刺

D、长期通畅率高

E、以上都正确

答案：E

37、急性肺水肿的护理措施不正确的是（ ）

A、按医嘱静脉注射西地兰

B、取坐位，两腿下垂

C、持续低流量吸氧

D、遵医嘱吗啡皮下注射

E、利尿

答案：C

38、慢性肾盂肾炎最重要的诊断依据是（ ）

A、发热等全身症状

B、尿频尿急尿痛等

C、腰痛脊肋角压痛

D、影像检查示肾盂肾盏变形、扩张

E、尿细菌培养阳性

答案：D

39、甲状旁腺激素的分子量（ ）

A、10000D

B、9500D

C、9000D



D、8500D

E、8000D

答案：B

40、与单纯的血液透析和血液滤过相比，血液透析滤过（HDF）的优点有（ ）

A、血流动力学不稳定

B、易发生低血压

C、单位时间内溶质清除效率高

D、抗凝剂的用量少

E、对中大分子的清除少

答案：C

41、患者男性，30岁。车祸致左肋部伤并脾破裂，急诊入院，血压75/55mmHg，神志清楚，但表情淡漠，脉率120次/分，口渴，面色苍白，估计出血量达（ ）

A、400~500ml

B、600~700ml

C、800~1600ml

D、1700~2400ml

E、>2400ml

答案：C

42、急性心肌梗死时发生室颤尽快应用（ ）

A、同步直流电复律

B、非同步直流电复律

C、体外反搏术

D、起搏器临时起搏

E、胸外心脏按压

答案：B

43、以下对吸痰法叙述不正确的是（ ）

A、是指经口、鼻腔、人工气道将呼吸道分泌物吸出

B、吸痰法是一种侵入性操作

C、主要用于各种原因引起的不能有效咳嗽的患者

D、吸痰装置利用虹吸原理

E、每次吸痰时间不超过15s

答案：D

44、透析液监测参数包括（ ）

- A、压力
- B、流量
- C、温度
- D、浓度（电导率）
- E、以上都对

答案：E

45、透析治疗过程中对患者进行健康宣教，描述正确的是（ ）

- A、避免进食过烫、过硬的食物
- B、肌肉注射后应局部按压 20-30min
- C、创伤性的检查和治疗应在透析结束后 4-6h 进行
- D、观察穿刺处有无出血
- D、保持大便通畅
- E、以上都正确

答案：E

46、下列哪项不是血液透析中肌肉痉挛的防治（ ）

- A、防止透析中高血压
- B、准确设定超滤量
- C、积极纠正低镁血症
- D、鼓励患者加强肌肉锻炼
- E、纠正低钾血症

答案：A

47、高磷食物不包括（ ）

- A、奶制品
- B、土豆
- C、菠菜
- D、冬瓜
- E、香蕉

答案：D

48、意识障碍常见的临床表现不包括（ ）

- A、肌肉痉挛
- B、神志不清
- C、血压下降
- D、鼾声呼吸
- E、生理反射消失

答案：A

49、血液透析机体内出血的原因是（ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/387026065165006036>