

## 护士临床“三基”实践指南测试题集

1. 盆腔内感染后期若发现明显中毒症状，但无消化道症状、体征应考虑有()

[单选题] \*

A. 盆腔脓肿 (正确答案)

B. 膈下脓肿

C. 肠壁脓肿

D. 髂窝脓肿

E. 粘连

2. 胃、十二直肠溃疡穿孔非手术治疗护理中，最为重要的是() [单选题] \*

A. 赋予半卧位

B. 禁食禁饮

C. 保持有效胃肠减压 (正确答案)

D. 输液维持水电解质平衡

E. 严密观察病情

3. 胃癌的好发部位是() [单选题] \*

A. 贲门

B. 胃底

C. 胃体小弯侧

D. 胃体大弯侧

E. 胃窦 (正确答案)

4. 胃癌最主要的转移途径是() [单选题] \*

A. 直接蔓延

B. 淋巴转移 (正确答案)

C. 血行转移

D. 腹腔内种植

E. 消化道转移

5. 瘢痕性幽门梗阻最突出的临床表现是() [单选题] \*

A. 大量呕吐 (正确答案)

B. 上腹胀痛

C. 消瘦

D. 上腹膨隆

E. 胃型及蠕动波

6. 对倾倒综合征的认识正确的是() [单选题] \*

A. 表现为进食甜食后上腹不适、心慌、恶心等 (正确答案)

B. 可浮现休克大出血

C. 长期不愈者, 可将毕氏 I 式改为毕氏 II 式手术

D. 为胃肠吻合过小而引起

E. 治疗应先禁食并赋予胃肠减压、消炎等

7. 极易发生穿孔的阑尾炎是() [单选题] \*

A. 化脓性阑尾炎

B. 单纯性阑尾炎

C. 妊娠并发阑尾炎

D. 坏疽性阑尾炎 (正确答案)

E. 慢性阑尾炎

8. 急性阑尾炎最重要的症状是() [单选题] \*

A. 转移性右下腹痛(正确答案)

B. 胃寒、发热

C. 恶心、呕吐

D. 食欲下降

E. 腹泻或者便秘

9. 急性阑尾炎最重要的原因是() [单选题] \*

A. 暴饮暴食

B. 阑尾腔梗阻(正确答案)

C. 细菌感染

D. 精神紧张

E. 饭后剧烈运动

10. 急性阑尾炎腹痛起始于上腹或者脐周的原因是() [单选题] \*

A. 胃肠功能紊乱

B. 消化道反射性痉挛

C. 阑尾肌放射性痉挛

D. 壁腹膜刺激

E. 内脏神经反射(正确答案)

11. 结肠癌中最应重视的早期症状为() [单选题] \*

A. 腹痛

B. 贫血

C. 排便习惯改变(正确答案)

D. 粪便带脓血或者黏液

E. 肿块

12. 结肠癌中最为多见() [单选题] \*

A. 腺癌(正确答案)

B. 未分化癌

C. 类癌

D. 鳞状细胞癌

E. 印戒细胞癌

13. 急性阑尾炎容易发生坏死穿孔的主要原因是() [单选题] \*

A. 阑尾与盲肠相通处的开口狭小

B. 阑尾壁内有丰富的淋巴结组织, 易化脓

C. 阑尾动脉是终末动脉(正确答案)

D. 阑尾蠕动缓而弱, 易被残渣粪便阻塞, 造成梗阻

E. 阑尾系膜很短容易扭折

14. 阑尾炎腰大肌试验阳性, 提示() [单选题] \*

A. 盲肠内侧位阑尾

B. 盆腔位阑尾

C. 盲肠后位阑尾(正确答案)

D. 并发盆腔脓肿

E. 脊髓段腰神经根受累

15. 急性肠梗阻的早期体征是() [单选题] \*

A. 腹胀(正确答案)

B. 绞痛时伴肠鸣音亢进

C. 肠型蠕动波

D. 腹部包块

E. 腹膜刺激征

16. 最常见的机械性肠梗阻是() [单选题] \*

A. 粘连性肠梗阻 (正确答案)

B. 肿瘤引起的肠梗阻

C. 嵌顿疝引起的肠梗阻

D. 肠套叠

E. 蛔虫引起的肠梗阻

17. 直肠癌血行播散最常见侵犯的脏器为() [单选题] \*

A. 肺

B. 肝 (正确答案)

C. 骨骼

D. 子宫

E. 前列腺

18. 能较早发现大肠癌术后复发的检查是() [单选题] \*

A. 纤维结肠镜

B. 钡灌肠造影

C. 癌胚抗原检查 (正确答案)

D. 直肠指检

E. 大便隐血试验

19. 内痔的早期症状为() [单选题] \*

A. 痔核脱出

B. 大便出血 (正确答案)

C. 大便疼痛

D. 里急后重

E. 肛门周围瘙痒

20. 肛门裂的主要特点是() [单选题] \*

- A. 无痛性便血
- B. 肛门部下坠感
- C. 疼痛性便血 (正确答案)
- D. 肛门有脓性分泌物
- E. 时常有稀便

21. 混合痔是指 () [单选题] \*

- A. 环形内痔
- B. 痔与肛瘘同时存在
- C. 瘻与肛门旁脓肿同时存在
- D. 内痔在不同位置同时存在 (正确答案)
- E. 直肠上、下静脉从吻合处形成的内外痔

22. 门静脉高压症并发食管静脉曲张手术治疗最主要的目的是 () [单选题] \*

- A. 提高抵抗力
- B. 防止肝癌发生
- C. 减少腹水
- D. 预防上消化道出血 (正确答案)
- E. 防止肝衰竭

23. 肝癌术前护理哪项是错误的 () [单选题] \*

- A. 高蛋白、高脂肪、高维生素饮食 (正确答案)
- B. 适量输血浆或者白蛋白
- C. 术前 2 天口服肠道不吸收抗生素
- D. 术前晚、术晨清洁灌肠
- E. 配血宜鲜血与库血各半

24. 诊断门静脉高压症最故意义的是 () [单选题] \*

- A. 功能亢进
- B. 呕血黑便
- C. 腹水
- D. 肝功能障碍
- E. 胃底、食管下端静脉曲张(正确答案)

25. 肝脏手术后最严重的并发症是() [单选题] \*

- A. 出血(正确答案)
- B. 肺部感染
- C. 腹腔感染
- D. 胆汁性腹膜炎
- E. 腹水

26. 门静脉高压的交通支中, 下列哪支是错误的() [单选题] \*

- A. 胃底、食管下端交通支
- B. 直肠下端交通支
- C. 腹壁交通支
- D. 肠系膜血管交通支(正确答案)
- E. 腹膜后交通支

27. 分流术后患者, 绝对卧床休息时间应是() [单选题] \*

- A. 1~2 天
- B. 3~5 天
- C. 1 周(正确答案)
- D. 2 周
- E. 1 个月

28. 门静脉高压症最危(wei)险的并发症是() [单选题] \*

A. 食管胃底静脉曲张、破裂(正确答案)

B. 肝性脑病

C. 脾功能亢进

D. 严重顽固性腹水

E. 肝衰竭

29. 细菌性肝脓肿，细菌进入肝脏引起脓肿的主要途径是() [单选题] \*

A. 细菌沿胆道上行入肝(正确答案)

B. 经肝动脉入肝

C. 经门静脉系统

D. 直接经开放性肝损伤之伤口

E. 膈下感染时细菌侵入肝包膜所致

30. 与原发性肝癌的发生关系最密切的是() [单选题] \*

A. 胆道感染

B. 肝炎后硬化(正确答案)

C. 血吸虫性肝硬化

D. 酒精中毒性肝硬化

E. 肝脏良性肿瘤

31. T 形管普通留置多长期即可拔管() [单选题] \*

A. 3 天

B. 7 天

C. 10 天

D. 14 天(正确答案)

E. 28 天

32. 胆石症患者浮现绞痛时禁用() [单选题] \*



- A. 阿托品
- B. 吗啡(正确答案)
- C. 哌替啶
- D. 硝酸甘油
- E. 3%硫酸镁溶液

33. 急性胆囊炎最严重的并发症是() [单选题] \*

- A. 细菌性肝脓肿
- B. 胆囊积脓
- C. 胆囊坏疽穿孔引起胆汁腹膜炎(正确答案)
- D. 并发急性胰腺炎
- E. 胆囊、十二指肠内瘘

34. Murphy 征阳性多见于() [单选题] \*

- A. 细菌性肝脓肿(正确答案)
- B. 急性胰腺炎
- C. 胃、十二指肠溃疡穿孔
- D. 胆总管结石
- E. 胆道蛔虫病

35. 胆道疾病首选的诊断方法是() [单选题] \*

- A. 口服胆囊造影
- B. 静脉胆道造影
- C. B 超(正确答案)
- D. 经皮肝穿刺胆道造影
- E. 内窥镜逆行性胰胆管造影

36. 脑水肿普通术后何时到达高峰() [单选题] \*

- A. 12 小时内
- B. 24 小时内
- C. 1~2 天
- D. 2~4 天 (正确答案)
- E. 一周内

37. 术后发生脑水肿，床头抬高() [单选题] \*

- A.  $0^{\circ} \sim 5^{\circ}$
- B.  $5^{\circ} \sim 15^{\circ}$
- C.  $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$  (正确答案)
- D.  $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$
- E.  $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$

38. 幕下血肿首先表现为() [单选题] \*

- A. 意识障碍 (正确答案)
- B. 头晕
- C. 头痛
- D. 呕吐
- E. 呼吸减慢

39. 神经外科手术后，下列各项中不会增加颅内压的是() [单选题] \*

- A. 体温过高 (正确答案)
- B. 咳嗽
- C. 大量饮水
- D. 呃逆
- E. 便秘

40. 中枢性发热最常见的原因() [单选题] \*

- A. 脑干损伤
- B. 肿瘤
- C. 手术
- D. 炎症反应
- E. 血性脑脊液刺激(正确答案)

41. 颅内低压综合症腰穿测压, 压力低于多少属于重型() [单选题] \*

- A. 35 mmH2O
- B. 40 mmH2O
- C. 45 mmH2O
- D. 50 mmH2O(正确答案)
- E. 55 mmH2O

42. 脑挫裂伤治疗中, 亚低温治疗患者的体温宜维持在() [单选题] \*

- A. 31~32℃
- B. 32~34℃(正确答案)
- C. 33~35℃
- D. 34~36℃
- E. 35~36℃

43. 急性脊髓损伤现场急救正确的方法不包括() [单选题] \*

- A. 携带简单支具
- B. 将患者平移
- C. 使用硬质担架
- D. 躯干尽量伸展(正确答案)
- E. 避免加重脊髓的损伤

44. 自发性蛛网膜下腔出血最常见的病因是() [单选题] \*

- A. 脑血管畸形
- B. 脑动脉瘤 (正确答案)
- C. 高血压动脉硬化
- D. 肿瘤
- E. 烟雾病

45. 颅内转移瘤的临床特点不正确的是() [单选题] \*

- A. 女性多于男性 (正确答案)
- B. 常有肿瘤病史
- C. 发病迅速, 发展快
- D. 颅内压增高
- E. 脑膜刺激征状

46. 颈内动脉海绵窦瘘最重要的检查手段是() [单选题] \*

- A. 体格检查
- B. 实验室检查
- C. 头颅 CT
- D. MRI
- E. 脑血管造影 (正确答案)

47. 关于脑结核瘤的临床特点, 不正确的说法是() [单选题] \*

- A. 多为继发性
- B. 老年人多见 (正确答案)
- C. 病灶单发多见
- D. 慢性感染症状
- E. 结核病史或者结核接触病史

48. 寰枕部畸形最好的检查手段是() [单选题] \*

- A. 体格检查
- B. 实验室检查
- C. X 线
- D. CT
- E. MRI (正确答案)

49. 三叉神经痛最突出的特点是() [单选题] \*

- A. 中年后起病
- B. 食欲下降
- C. 疼痛 (正确答案)
- D. 睡眠紊乱
- E. 生活质量下降

50. 癫痫持续状态紧急处理中, 错误的是() [单选题] \*

- A. 吸氧
- B. 静脉推注安定
- C. 四肢约束
- D. 气管插管 (正确答案)
- E. 运用抗癫痫药物

51. 神经外科术后发生尿崩症最常见的病因是() [单选题] \*

- A. 垂体瘤切除 (正确答案)
- B. 颅脑损伤
- C. 鞍区手术
- D. 第三脑室手术
- E. 下丘脑手术

52. 下列关于神经外科手术后并发肺栓塞的说法, 错误的是() [单选题] \*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/405203303342011102>