

2022 年江苏省常州市全科医学（中级）专业 知识

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(30 题)

1.抑制尿酸生成的药物是

A.糖皮质激素 B.秋水仙碱 C.别嘌醇 D.丙磺舒 E.消炎痛

2.急性胃黏膜病变发生在()

A.各种应急状态情况下 B.静脉内膜炎 C.静脉内血栓形成 D.肝外静脉
梗阻

3.不要给不准备手术的甲亢病人服用碘剂，主要因为

A.一旦停药，甲亢症状重现，甚至更严重
B.碘剂对减轻甲亢症状的疗效不显著
C.碘剂不能降低甲亢病人的基础代谢率
D.碘剂效果不如普萘洛尔
E.病人经常不能耐受碘剂治疗

4.哪项肝脏体征对肝癌的诊断最有价值

A.大小 B.质地 C.表面是否有结节 D.压痛程度 E.肝表面可听到血管杂
音

5.男，46岁，发现左上腹包块1个月。查体：胸骨压痛，脾肋缘下8cm。查血象：血红蛋白125g/L，白细胞 $140.5 \times 10^9/L$ ，血小板 $232 \times 10^9/L$ 。骨髓穿刺诊断为慢性粒细胞白血病慢性期。治愈慢性粒细胞白血病的方法是

A.异基因骨髓移植 B.联合化疗 C.加强支持治疗 D.放射治疗 E.脾切除

6.患者，男性，34岁，5天来发热、咳嗽、咳脓痰，量多，有腥臭味，胸片示：右肺下叶后基底段大片阴影，有空洞和液平，血常规：

WBC $18 \times 10^9/L$ ，以下哪种疾病最有可能

A.肺脓肿 B.肺囊肿 C.肺癌 D.真菌性肺炎 E.肺结核空洞

7.中枢神经系统白血病的临床特点是

A.头痛、呕吐，脑脊液可检出白血病细胞

B.寒战、高热、出血并迅速衰竭

C.低热、贫血、巨脾

D.低热、乏力、颈部淋巴结肿大，切口不愈合

E.贫血、发热、无痛性淋巴结进行性肿大

8.我国对平原地区成年男性贫血的诊断标准是

- A.血红蛋白低于 100g / L
- B.血红蛋白低于 110g / L
- C.血红蛋白低于 120g / L
- D.血红蛋白低于 130g / L
- E.血红蛋白低于 140g / L

9.中央型肺癌胸部 X 线的直接征象

- A.肺不张
- B.阻塞性肺炎
- C.局限性肺气肿
- D.肺门类圆形阴影
- E.胸腔积液

10.男，52 岁，便血 3 个月，为鲜红色，不伴肛门及下腹疼痛，无大便习惯改变接诊首选检查是

- A.A.便常规及大便隐血
- B.肛门镜检查
- C.乙状结肠镜检查
- D.钡灌肠
- E.纤维结肠镜检查

11.关于便血下列叙述哪一项是正确的

- A.粪便颜色为黄色可断定无便血
- B.下消化道出血时，血便多为黯红色
- C.上消化道出血时，血便均为柏油样便
- D.服用铋剂、铁剂后粪便潜血试验阳性

E.急性出血坏死性肠炎粪便呈果酱样脓血便

12.鼻出血时以下哪项处理合适

A.有休克时取坐位或半坐位

B.无休克时应取平卧头低位

C.嘱患者将流入口中之血液尽量吐出，以免咽下刺激胃部引起呕吐

D.不应予镇静剂

E.不管有无休克，均应取坐位或半卧位

13.高温环境下，气温超过 35°C时，人体主要通过哪种方式进行散热

A.辐射 B.蒸发 C.对流 D.传导 E.呼出

14.急性胰腺炎解痉镇痛不宜应用

A.吗啡 B.异丙嗪 C.度冷丁 D.阿托品 E.普鲁卡因

15.风湿性心脏病二尖瓣狭窄随右心衰竭加重，下列哪项表现会减轻

A.肝脏肿大 B.心率增快 C.心尖区舒张期隆隆样杂音 D.急性肺水肿发作 E.胃肠道淤血症状

16.男性患者，76岁，高血压病10年，血压波动在(150~170)/(70~80)mmHg。有关这类高血压患者的临床特点，以下哪个是不正确的

A.脉压差小 B.易发生体位性低血压 C.常见为收缩期高血压 D.血压波动大 E.选用主要降低收缩压为主的降压药

17.引起上消化道上出血的原因不包括

A.胃十二指肠溃疡 B.慢性胃炎 C.门静脉高压症 D.出血性胃炎 E.胃癌

18.作用于壁细胞 H₂ 受体，抑制胃酸和胃蛋白酶的分泌

A.A.甲氰咪胍 B.阿托品 C.前列腺素 D.吗丁啉 E.奥美拉唑

19.慢性肾炎尿毒症的常见改变为

A.A.高血钾 B.高血钙 C.低血镁 D.低血磷 E.代谢性酸中毒

20.心肺复苏的治疗药物中，多巴胺的适应证为()

A.严重心力衰竭患者 B.低血压患者 C.严重酸中毒患者 D.快速型室性心律失常

21.女，33岁，近2个月来低热，双手、腕关节对称性肿痛，屈伸不利，伴晨僵。查血沉 (ESR)26mm/1h，类风湿因子(RF)1:40。首选的治疗药物是

A.A.肾上腺皮质激素 B.甲氨蝶呤 C.非甾体抗炎药 D.柳氮磺胺吡啶 E.秋水仙碱

22.引起同侧动眼神经麻痹、对侧肢体瘫痪的病变部位是

A.皮质 B.内囊 C.中脑 D.脑桥 E.延髓

23.上消化道出血部位一般是指

A.食管 B.贲门 C.幽门 D.十二指肠球部 E.屈氏韧带以上的消化器官

24.如病理检查发现腺癌细胞，下列哪项检查最有助于肿瘤分期

A.A.上消化道钡餐 B.超声内镜 C.上腹 CT D.腹部 B 超 E.血管造影

25.下列哪项不是胸壁疾病引起的胸痛

A.胸膜肿瘤 B.肋间神经炎 C.肋骨骨折 D.带状疱疹 E.非化脓性肋软骨炎

26.老年男性患者，胸骨后疼痛伴有消瘦及痰中带血，应考虑哪种疾病

A.急性心肌梗死 B.肺癌 C.食管炎 D.肺梗死 E.纵隔肿瘤

27.男性患者，42岁。因肝硬化合并食管胃底静脉曲张破裂出血，经社区医生进行急救处理后，患者生命体征仍不稳定，血压低，仍有出血倾向，这时如何处理才是正确的？

A.出血部位明确，内科保守治疗无效者，应积极转到上级医院手术治疗

B.注意患者体位，防止发生误吸窒息

- C.对转运途中呕血和黑便不止者，如无禁忌可服用去甲肾上腺素盐水
- D.支持治疗及对症处理
- E.以上都是

28.患者，女，44岁。主因腰痛、发热、尿频来诊，尿沉渣白细胞10~20个/HP，可见白细胞管型 **WBC 11×10^9 /L**，中性粒细胞0.85，诊断为

- A.急性肾盂肾炎
- B.慢性肾盂肾炎
- C.无症状性菌尿
- D.慢性肾小球肾炎
- E.急性膀胱炎

29. **β 海洋性贫血的诊断要点是**

- A.酸溶血试验阳性
- B.抗人球蛋白试验阳性
- C.血红蛋白电泳 HbA₂ 及 HbF 增高
- D.高铁血红蛋白还原试验异常
- E.小球形红细胞增多

30.女，20岁，系统性红斑狼疮患者，狼疮肾，尿蛋白持续(++)，足量糖皮质激素治疗4周无效，应

- A.加大激素用量
- B.雷公藤
- C.加抗疟药
- D.加用免疫抑制剂
- E.加利尿剂

二、专业知识(10 题)

31.在风湿性心脏病中，下列哪种瓣膜病变最常见

- A.单纯二尖瓣狭窄 B.二尖瓣关闭不全 C.二尖瓣狭窄合并关闭不全 D.主动脉瓣狭窄 E.主动脉瓣关闭不全

32.以上哪项为 Crohn 病较常见的镜下表现

- A.肠黏膜多发浅溃疡伴充血、水肿
B.肠腔内多处息肉，形态不规则
C.肠黏膜充血、水肿、环形溃疡，其边缘鼠咬状
D.肠黏膜裂隙样深溃疡
E.回盲部溃疡伴息肉

33.血栓闭塞性脉管炎的临床表现包括

- A.主要侵犯下肢的中小动静脉
B.病理特点为血管全层非化脓性炎症，管腔被血栓闭塞
C.发病与酒精中毒有关
D.患者多数为女性青壮年
E.发病与吸烟及寒冷有关

34.消除 Hp

- A.PPI 类 B.枸橼酸铋剂 C.阿莫西林和甲硝唑 D.前列腺素 E₂ E.吗丁啉

35.抢救最关键的措施是

- A.立即鼻导管给氧，注射呼吸兴奋剂
- B.立即输血、输液、注射止血剂
- C.立即进行人工呼吸
- D.立即胸穿抽气
- E.立即采取体位引流，气管切开或抽吸

36.风湿性心脏瓣膜病主动脉瓣狭窄最主要的特征是

- A.心脏显著向左下扩大
- B.主动脉瓣区喷射性杂音伴第二心音减弱或消失
- C.胸骨左缘第3·4肋间有舒张期高调递减型杂音
- D.周围血管征
- E.Austin—Flint 杂音

37.腹股沟直疝环的底边为

- A.腹股沟韧带 B.耻骨梳韧带 C.陷窝韧带 D.腹壁下动脉 E.腹直肌外侧缘

38.风心病最常侵犯的瓣膜是

- A.二尖瓣及主动脉瓣 B.二尖瓣及三尖瓣 C.二尖瓣及肺动脉瓣 D.主动脉瓣及肺动脉瓣 E.三尖瓣及肺动脉瓣

39.右心衰竭的体征不包括下述哪一种表现

A.双肺满布中小湿啰音 B.颈静脉怒张 C.胸腔积液和腹腔积液 D.肝大

E.下肢凹陷性水肿

40.腹部叩诊移动性浊音阳性，腹水量至少为

A.150ml B.500ml C.800ml D.1 000ml E.1 200ml

三、共用题干单选题(5 题)

41.(题干)患者，男性，34岁。1周前左足底被铁钉刺伤，自行包扎，昨夜突感胸闷、紧缩感，晨起张口困难和抽搐，诊断为破伤风。破伤风是破伤风杆菌所致的

A.菌血症 B.败血症 C.脓血症 D.毒血症 E.脓毒败血症

42.最可能的诊断是

A.感染中毒性休克 B.急性机械性肠梗阻 C.急性中毒，心肌损害 D.中毒性巨结肠 E.急性肺栓塞

43.关于该患者的下列叙述正确的是

A.Ham 试验阳性 B.血块收缩正常 C.骨髓巨核细胞减少 D.血小板生存时间明显缩短 E.骨髓增生低下

44.(题干)患者，女，30岁。近2个月中度发热，全身肌痛，四肢关节肿痛，口腔溃疡。尿常规显示红细胞(+)，蛋白(++)。免疫学检查最可能出现的抗体是

A.抗核抗体 B.抗JO-1抗体 C.抗Scl-70抗体 D.类风湿因子 E.抗中性粒细胞浆抗体

45. 溃疡性结肠炎腹痛与腹泻明显时应用较大剂量阿托品治疗，可能引起下列哪项并发症

A. 机械性肠梗阻 B. 肠穿孔 C. 结肠大出血 D. 假息肉形成 E. 中毒性巨结肠

参考答案

1.C

C。别嘌呤醇可抑制尿酸生成。

2.A

3.A

4.E

5.A

A。异基因骨髓移植是当前唯一能治愈慢性粒细胞白血病的方法。故选

A。

6.A

肺脓肿是多种病因所引起的肺组织化脓性改变。早起为化脓性炎症，继而坏死形成脓肿。临床特征为高热、咳嗽、咳大量脓痰。血常规白细胞、中性粒细胞升高。多发生于壮年，男性多于女性。

7.A

中枢神经系统白血病的主要表现有头痛、呕吐、颈项强直等脑膜炎或中枢神经系统症状，脑脊液可检出白血病细胞。

8.C

C。我国对平原地区成年男性贫血的诊断标准是血红蛋白低于 120g/L。

9.D 中央型肺癌的 X 线直接征象为一侧肺门类圆形阴影。肺不张、阻塞性肺炎、局限性肺气肿，是由于肿瘤对气管完全阻塞或部分阻塞引起的间接征象。胸腔积液可有肺癌转移引起。

10.A

A。以便血为主要表现的患者，接诊首选的检查是便常规及大便隐血。

11.B

12.C 鼻出血时，尽量不要让它流入胃部，以免刺激胃黏膜，有休克时应平卧头低位，以保持大脑供血，必要时应予镇静剂，以免心情过度紧张。

13.B 此状态下，除蒸发之外，其余各项作用很小。

14.A 吗啡可引起 Oddi 括约肌收缩，不宜应用。

15.D 右心衰竭时，右心排血量明显减少，肺循环血量减少，左心房压相对下降，发生急性肺水肿的危险减少。

16.A 老年高血压以单纯收缩期高血压多见，老年人动脉硬化，动脉弹性减退，出现脉压差增大。无论是收缩压还是舒张压，以及脉压，均比年轻患者有较大的波动。血压的波动、血压的高度与老年人压力感受器调节血压的敏感性减退密切相关。

17.B

18.A

甲氰咪胍为 H₂ 受体拮抗剂，能抑制胃酸和胃蛋白酶的分泌。

19.E

尿毒症时代谢产物如磷酸、硫酸等酸性物质因肾排泄障碍而潴留，故易发生代谢性酸中毒。

20.B

21.C

C。根据典型的临床表现及化验检查诊断为类风湿关节炎，非甾体抗炎药是治疗的一线首选药物。故选 C。

22.C 皮质病变一般引起单瘫。内囊是上下行纤维最集中的地方，此处病变会出现“三偏”征。交叉瘫是脑干病变的特征性表现，动眼神经、面神经、舌下神经分别从中脑、脑桥、延髓发出，可根据不同的脑神经与肢体的交叉瘫确定脑干的病变部位。

23.E

消化道以屈氏韧带为界，其上的消化道出血称上消化道出血，其下的消化道出血称为下消化道出血。

24.B

超声内镜能准确判断癌的壁内浸润深度、异常肿大的淋巴结以及明确肿瘤对周围器官的浸润情况，对肿瘤分期、治疗方案选择及预后判断有重要意义。

25.A 胸壁胸廓疾病引起的胸痛包括急性皮炎、肌炎、皮下蜂窝织炎、带状疱疹、流行性胸痛、肋间神经炎、肋软骨炎、肋骨骨折、创伤、颈胸椎结核、多发性骨髓瘤等。

26.B 胸痛伴咳嗽、咯血，提示肺部疾病，如肺炎、肺结核、原发性支气管肺癌等。患者为老年男性，胸骨后疼痛伴有消瘦，应考虑肺癌。

27.E

患者因肝硬化合并食管胃底静脉曲张破裂出血，经社区医生进行急救处理后，患者生命体征仍不稳定，血压低，出血部位明确，应积极转到上级医院手术治疗。

28.A

患者以上尿路症状为主，伴发热，血白细胞增加，故考虑急性肾盂肾炎的可能性大。

29.C

β 海洋性贫血的血红蛋白电泳特点 HbA₂ 及 HbF 增高。

30.D 免疫抑制剂主要用于单用糖皮质激素效果欠佳、激素减量后容易复发或长期大量使用激素有严重副作用的病人，常用的有环磷酰胺及硫唑嘌呤等。

31.C

单纯二尖瓣狭窄占风心病的 25%，二尖瓣狭窄伴有二尖瓣关闭不全占 40%。

32.D Crohn 病较常见的镜下表现有病变呈节段性分布，见纵行裂隙样溃疡，溃疡周围黏膜正常或增生呈鹅卵石样，肠腔狭窄，炎性息肉，病变肠段之间黏膜外观正常。

33.ABE

34.C 目前抗 Hp 多采用阿莫西林、甲硝唑、克拉霉素三种抗生素中的两种联合 PPI 或胶体铋。

35.E 抢救窒息最关键的措施是立即体位引流、气管切开或抽吸，以畅通呼吸道。

36.B 主动脉瓣狭窄听诊特征性体征为胸骨右缘第 2 肋间收缩期喷射性杂音，粗糙而响亮，主动脉瓣区第二心音减弱，第二心音反常分裂。

37.A 直疝三角由腹壁下动脉构成外侧边，腹直肌外缘构成内侧边，腹股沟韧带构成底边。

38.A

39.A 右心衰竭的体征包括水肿、颈静脉征、肝脏肿大。双肺满布中小湿啰音是左心衰竭的体征。

40.A

41.D

42.D 溃疡型结肠炎可由于钡剂灌肠、低钾或应用抗胆碱能药物或麻醉剂而诱发中毒性巨结肠，也可能自发发生。

43.DITP 患者由于存在血小板抗体，血小板破坏增多，导致血小板生存时间明显缩短。

44.A 四肢关节肿痛，口腔溃疡，尿检异常，应考虑为系统性红斑狼疮。抗核抗体是系统性红斑狼疮的筛查实验，见于几乎所有的 SLE 患者。

45.E 溃疡性结肠炎内镜下表现为：黏膜粗糙呈细颗粒状，弥漫性充血、水肿，血管纹理模糊，质脆、出血，可附有脓性分泌物;病变明显处可见弥漫性糜烂或多发浅溃疡;慢性病变可见假息肉及桥状黏膜，结肠袋往往变钝或消失。2.中毒性巨结肠多发生在爆发型或重症溃疡性结肠炎患者，常因低钾、钡剂灌肠、使用抗胆碱能药物或阿片类制剂而

诱发。2022 年江苏省常州市全科医学（中级）专业知识

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(30 题)

1.抑制尿酸生成的药物是

A.糖皮质激素 B.秋水仙碱 C.别嘌呤醇 D.丙磺舒 E.消炎痛

2.急性胃黏膜病变发生在()

A.各种应急状态情况下 B.静脉内膜炎 C.静脉内血栓形成 D.肝外静脉
梗阻

3.不要给不准备手术的甲亢病人服用碘剂，主要因为

A.一旦停药，甲亢症状重现，甚至更严重
B.碘剂对减轻甲亢症状的疗效不显著
C.碘剂不能降低甲亢病人的基础代谢率
D.碘剂效果不如普萘洛尔
E.病人经常不能耐受碘剂治疗

4.哪项肝脏体征对肝癌的诊断最有价值

A.大小 B.质地 C.表面是否有结节 D.压痛程度 E.肝表面可听到血管杂
音

5.男，46岁，发现左上腹包块1个月。查体：胸骨压痛，脾肋缘下8cm。查血象：血红蛋白125g/L，白细胞 $140.5 \times 10^9/L$ ，血小板 $232 \times 10^9/L$ 。骨髓穿刺诊断为慢性粒细胞白血病慢性期。治愈慢性粒细胞白血病的方法是

A.异基因骨髓移植 B.联合化疗 C.加强支持治疗 D.放射治疗 E.脾切除

6.患者，男性，34岁，5天来发热、咳嗽、咳脓痰，量多，有腥臭味，胸片示：右肺下叶后基底段大片阴影，有空洞和液平，血常规：

WBC $18 \times 10^9/L$ ，以下哪种疾病最有可能

A.肺脓肿 B.肺囊肿 C.肺癌 D.真菌性肺炎 E.肺结核空洞

7.中枢神经系统白血病的临床特点是

A.头痛、呕吐，脑脊液可检出白血病细胞

B.寒战、高热、出血并迅速衰竭

C.低热、贫血、巨脾

D.低热、乏力、颈部淋巴结肿大，切口不愈合

E.贫血、发热、无痛性淋巴结进行性肿大

8.我国对平原地区成年男性贫血的诊断标准是

- A.血红蛋白低于 100g / L
- B.血红蛋白低于 110g / L
- C.血红蛋白低于 120g / L
- D.血红蛋白低于 130g / L
- E.血红蛋白低于 140g / L

9.中央型肺癌胸部 X 线的直接征象

- A.肺不张 B.阻塞性肺炎 C.局限性肺气肿 D.肺门类圆形阴影 E.胸腔积液

10.男，52 岁，便血 3 个月，为鲜红色，不伴肛门及下腹疼痛，无大便习惯改变接诊首选检查是

- A.A.便常规及大便隐血 B.肛门镜检查 C.乙状结肠镜检查 D.钡灌肠 E.纤维结肠镜检查

11.关于便血下列叙述哪一项是正确的

- A.粪便颜色为黄色可断定无便血
- B.下消化道出血时，血便多为黯红色
- C.上消化道出血时，血便均为柏油样便
- D.服用铋剂、铁剂后粪便潜血试验阳性
- E.急性出血坏死性肠炎粪便呈果酱样脓血便

12.鼻出血时以下哪项处理合适

- A.有休克时取坐位或半坐位
- B.无休克时应取平卧头低位
- C.嘱患者将流入口中之血液尽量吐出，以免咽下刺激胃部引起呕吐
- D.不应予镇静剂
- E.不管有无休克，均应取坐位或半卧位

13.高温环境下，气温超过 35°C时，人体主要通过哪种方式进行散热

- A.辐射 B.蒸发 C.对流 D.传导 E.呼出

14.急性胰腺炎解痉镇痛不宜应用

- A.吗啡 B.异丙嗪 C.度冷丁 D.阿托品 E.普鲁卡因

15.风湿性心脏病二尖瓣狭窄随右心衰竭加重，下列哪项表现会减轻

- A.肝脏肿大 B.心率增快 C.心尖区舒张期隆隆样杂音 D.急性肺水肿发作 E.胃肠道淤血症状

16.男性患者，76岁，高血压病10年，血压波动在(150~170)/(70~80)mmHg。有关这类高血压患者的临床特点，以下哪个是不正确的

- A.脉压差小 B.易发生体位性低血压 C.常见为收缩期高血压 D.血压波动大 E.选用主要降低收缩压为主的降压药

17.引起上消化道上出血的原因不包括

A.胃十二指肠溃疡 B.慢性胃炎 C.门静脉高压症 D.出血性胃炎 E.胃癌

18.作用于壁细胞 H₂ 受体，抑制胃酸和胃蛋白酶的分泌

A.A.甲氰咪胍 B.阿托品 C.前列腺素 D.吗丁啉 E.奥美拉唑

19.慢性肾炎尿毒症的常见改变为

A.A.高血钾 B.高血钙 C.低血镁 D.低血磷 E.代谢性酸中毒

20.心肺复苏的治疗药物中，多巴胺的适应证为()

A.严重心力衰竭患者 B.低血压患者 C.严重酸中毒患者 D.快速型室性心律失常

21.女，33 岁，近 2 个月来低热，双手、腕关节对称性肿痛，屈伸不利，伴晨僵。查血沉 (ESR)26mm/1h，类风湿因子(RF)1:40。首选的治疗药物是

A.A.肾上腺皮质激素 B.甲氨蝶呤 C.非甾体抗炎药 D.柳氮磺胺吡啶 E.秋水仙碱

A.A.肾上腺皮质激素 B.甲氨蝶呤 C.非甾体抗炎药 D.柳氮磺胺吡啶 E.秋水仙碱

22.引起同侧动眼神经麻痹、对侧肢体瘫痪的病变部位是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/408000021011006067>