

上消化道出血(医学必看试题带详细解析 答案)

上消化道出血是指消化道上段(食管、胃、十二指肠)出血,常见症状包括呕血、黑便等。以下是关于上消化道出血的一些常见问题及答案:

1.黑便的出现一般说明出血量应大于 50ml。

2.消化性大出血是指几小时内出血量多于 1000ml。

3.关于上消化道出血的描述,正确的是大量出血后可出现肠源性氮质血症、白细胞可有明显升高,不正确的是通过对呕血与黑便的定量测定,可准确判断出血量。

4.上消化道大量出血伴有呕血,提示胃内储血量为 > 250ml。

5.早期胃镜检查是诊断消化性溃疡出血最可靠的方法。

6.消化性溃疡最易发生出血的类型是十二指肠球后溃疡。

7.消化道大出血是指短时期内出血量多于 1000ml。

8.确诊消化性溃疡出血最可靠的方法是早期胃镜检查。

9.粪便隐血试验阳性，提示每天出血量为 5ml 以上。

10.消化性溃疡并上消化道大出血的特点包括定有黑便、呕血常为咖啡色、出血后疼痛减轻、出血后可有发热和氮质血症，不正确的是定有呕血。

11.消化性溃疡并上消化道大出血的特点包括定有黑便、呕血常为咖啡色、出血后疼痛减轻、出血后可有发热和氮质血症，不正确的是定有呕血。

12.消化性溃疡是上消化道出血最常见的病因之一，其他常见病因包括胆道疾病、急性糜烂性胃炎、贲门粘膜撕裂症等。

13.十二指肠球后溃疡最易并发出血。

14.Mallory-Weiss 综合征不是上消化道出血的常见原因。

15.关于肝硬化食管静脉曲张破裂出血内科治疗，错误的是吗啡镇静。

16.消化性溃疡是上消化道出血最常见的病因。

17.消化性溃疡最常见的并发症是出血。

1.根据病史和表现，男性 25 岁，晚睡前突然头昏、出冷汗，继呕血约 100ml，2 小时后排黑便 1 次，约 300ml，最可能患有消化性溃疡。

2.男性 28 岁，2 天来排柏油样便 8 次，今晨昏倒送医院，以往无上腹痛及肝病史，近期无服药史。查：BP8.0/5.3kPa，脉搏 130 次/分，首选的措施是补充血容量。

3.男性 32 岁，饮白酒 300g 后，胃部不适，频繁呕吐十余次，开始呕吐物为进餐食品，以后出现呕血，约 400ml，色鲜红，最可能的诊断是食管贲门粘膜撕裂症。

4.男性 45 岁，呕血不止，烦躁，面色苍白，出冷汗，此时应首先做快速输血处理。

5.这是一位 28 岁男性患者，最近两天解便 6 次，便便呈柏油样，今天早上突然昏倒，被紧急送入医院。患者以往没有上腹部疼痛或肝病史，最近也没有服用任何药物。体检结果显

示：血压 60/40mmHg（8.0/5.3kPa），脉搏 130 次/分。应该首先采取的措施是补充血容量。

6.这是一位 23 岁男性患者，因晕车剧烈呕吐，之后呕出 50ml 鲜血，没有腹痛或发热的症状。患者以往身体健康。体检结果显示：轻度贫血，血压 96/60mmHg（13.8/8.0kPa），神志清醒，肝脾未触及。最可能的诊断是贲门黏膜撕裂症。

7.这是一位 30 岁男性患者，过去 3 年间断性出现上腹痛，主要在春秋季节发作。最近 10 天又出现上腹痛，今天早上呕出了 400ml 的血，解便呈柏油样，感到头晕和心悸。血压为 13/8kPa（98/68mmHg），心率为 108 次/分，肝脾未触及，HBsAg 阳性。可能的诊断是消化性溃疡出血。

8.这是一位 41 岁男性患者，过去一周反复呕血 3 次，每天排出 3-5 次黑便。哪项指标可以判断上消化道出血已基本停止？选项包括：输血后血压和脉搏恢复正常又恶化、细胞计数和血红蛋白继续下降、鲜红色血便变成黑便、血尿素氮持续升高、中心静脉压不稳定。正确答案是鲜红色血便变成黑便。

9.这是一位 42 岁男性患者，因呕血 200ml 和 3 次黑便伴随昏厥入院。患者平时有不规则的上腹部疼痛，有饮酒和吸烟的惯，本次发病前大量饮酒。如果怀疑该患者患有食管静脉曲张破裂出血，那么反映门静脉高压的体征是脾肿大。

10.这是一位 32 岁男性患者，今天中午突然呕出 150ml 血液，之后排出 2 次黑便，共约 400ml。医生检查发现：剑下轻压痛，肝脾未触及。上消化道出血的原因可能是消化性溃疡。

11.这是一位 40 岁男性患者，患有胃溃疡 6 年，最近半年病情加重，尤其在进食后明显。最近两天呕出了 2 次血液和 4 次黑便。以下哪项不是治疗的正确选择？选项包括：口服去甲肾上腺素止血、三腔双囊管压迫止血、输血补液、禁食、肌注立止血。正确答案是三腔双囊管压迫止血。

一、单选题：

男性，38 岁，半月来出现上腹不适疼痛和反酸，2 小时前疼痛加重并呕血约 150ml。呕血后疼痛稍有缓解。最可能的疾病是：

- A. 胰腺炎并出血
- B. 慢性胃炎
- C. 胆囊炎
- D. 消化性溃疡
- E. 胃癌

正确答案：D

二、A3型题：

1~3题共用题干) 女，24岁，口服吲哚美辛数片后感到胃部疼痛，6小时前排出黑色成形便约100g。既往无胃病史。血压90/60mmHg，心率86次/分，血红蛋白100g/L，粪便隐血(+++)。

1.最可能的诊断是：

- A. 消化性溃疡
- B. 胃黏膜脱垂
- C. 胃黏膜脱垂

D. 食管贲门黏膜撕裂综合征

E. 急性糜烂出血性胃炎

正确答案：E

2.应首选的检查是：

A. 内镜

B. 腹部B超

C. 超选择性动脉造影

D. 放射性核素

E. X线钡餐

正确答案：A

3.应首选的治疗是：

A. 紧急输血

B. 氨甲苯酸

C. 6-氨基己酸

D. 质子泵抑制剂

E. 血管加压素

正确答案：D

4~7 题共用题干) 男, 35 岁, 反复出现上腹部疼痛 6 年, 多在每年秋季发生, 疼痛多出现于餐前, 进餐后可缓解, 近 2 日疼痛再次发作, 伴有反酸。体检发现剑突下有压痛, 血红蛋白 10g/L, 粪便隐血 (++)。

4. 该患者首先应考虑的诊断是:

A. 消化性溃疡

B. 急性胃黏膜损害

C. 食管贲门黏膜撕裂综合征

D. 胃癌

E. 胃黏膜脱垂

正确答案：A

5.进一步应先作哪项检查：

- A. 胃肠钡餐透视
- B. 胃液分析
- C. 内镜
- D. 腹部 B 超
- E. 幽门螺杆菌检测

正确答案：C

6.应首先采取哪项治疗：

- A. 紧急输血
- B. 6-氨基己酸静脉滴注
- C. 质子泵抑制静脉滴注
- D. 生长抑素静脉滴注
- E. 血管升压素静脉滴注

正确答案：C

7.如幽门螺杆菌阳性应采用哪种治疗:

- A. 质子泵抑制剂+克拉霉素
- B. 阿莫西林+克拉霉素+甲硝唑
- C. 质子泵抑制剂+阿莫西林+克拉霉素
- D. 胶体铋+阿莫西林
- E. 胶体铋+质子泵抑制剂+甲硝唑

正确答案: C

8~9题共用题干) 男, 46岁, 主诉出现成形黑便2天, 上腹部隐痛伴反酸。体检发现心率86次/分, 血压正常, 腹部无明显压痛, 无腹部包块扪及, 疑诊溃疡病出血。

8.经胃镜检查发现十二指肠球部出血, 此时应给予哪种治疗最合适?

- A. 饮食控制
- B. 应用止血药
- C. 应用抗酸剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/418044013117006027>