

重症医学科护理资质再认证理论考核

一、选择题

1.同时具有镇静与镇痛作用的药物是:() [单选题] *

A.咪达唑仑

B.劳拉西洋

C.地西洋

D.丙泊酚

E.右美托咪啶*

2.丙泊酚起效时间是多少:() [单选题] *

A.1-2 分钟*

B.2-3 分钟

C.3-4 分钟

D.4-5 分钟

3.镇痛药物的治疗不包括:() [单选题] *

A.苯二氮卓类*

B.阿片类镇痛药

C.非阿片类中枢镇痛药

D.非甾体抗炎药

E.局麻药

4.在 ICU 治疗过程中,对疼痛程度和意识状态的评估是进行镇痛镇静的基础,下列哪项疼痛评估是临

床推荐使用的评分方法：() [单选题] *

- A.语言评分法
- B.视觉模拟法
- C.数字评分法*
- D.面部表情评分法
- E.术后疼痛评分法

5.下列关于危重病人的镇痛镇静治疗说法不正确的是：() [单选题] *

- A.在充分祛除可逆诱因的前提下，躁动的病人才考虑镇静镇痛*
- B.为改善机械通气病人的舒适度和人机同步性，可给予镇静镇痛治疗
- C.为提高诊疗和治疗操作的安全性和依从性，可预防性采取镇静镇痛
- D.对焦虑病人应在去除各种诱因的基础上采取镇静镇痛
- E.应该采取适当措施提高 ICU 病人睡眠质量，包括改善环境，非药物治疗缓解紧张情绪

6.急性肾功能衰竭死亡的常见原因是 () [单选题] *

- A.低血钾
- B.高血钾*
- C.低血钠
- D.高血钠
- E.低血镁

7.急性肾功能衰竭少尿期最重要的电解质失调是 () [单选题] *

- A.低血钾
- B.高血钾*
- C.低血钠

D.高血钠

E.低血镁

8.反映肾小管功能的指标是() [单选题] *

A.尿量

B.尿素氮

C.内生肌酐清除率

D.尿钠*

E.尿蛋白

9.急性肾功能衰竭少尿期治疗原则不包括() [单选题] *

A.控制感染

B.补液原则应量出为入

C.调节电解质平衡

D.必要时采用透析治疗

E.采用低蛋白、低热量、高纤维素饮食*

10.尿毒症患者护理措施不包括() [单选题] *

A.饮食清淡、易消化、优质低蛋白

B.皮肤瘙痒时用酒精擦洗*

C.准确记录 24h 出入液量

D.避免劳累，预防感染

E.给予心理支持，增强治疗信心.

11. 压疮形成的主要原因:() [单选题] *

A.全身营养不良

B.年老体弱

C.理化刺激

D.局部长期受压*

12.预防压疮的关键在于() [单选题] *

A.消除诱因*

B.合理安排治疗

C.高热量饮食

D.合理使用气垫床

13.血清蛋白每下降 1g , 压疮发生率增加() 倍 [单选题] *

A.2

B.3*

C.4

D.5

14.失禁性皮炎发生的主要因素是() [单选题] *

A.压力摩擦力和剪切力

B.大便尿液次数多*

C.皮肤潮湿

D.肥胖

15.24h 内出现 3 次以上无控制水样便的排泄 ,皮肤无红斑或局部不高于周围皮肤属于失禁性皮炎的()

[单选题] *

A.高危*

B.轻度

C.中度

D.重度

E.真菌感染

16.急性心肌梗死的患者第一周必须() [单选题] *

A、绝对卧床*

B、床上四肢活动

C、由人搀扶室内行走

D、日常生活自行料理

17、缓解急性心肌梗死剧烈疼痛效果最好的是() [单选题] *

A、吗啡*

B、硝苯地平

C、消心痛

D、杜冷丁

18、心肌梗死 24h 内应避免使用(c) [单选题] *

A、吗啡*

B、杜冷丁

C、洋地黄

D、血管紧张素转氨酶抑制剂

E、速尿

19.急性心肌梗死合并休克禁用() [单选题] *

A、糖皮质激素

B、洋地黄

C、去甲肾上腺素

D、多巴胺

E、异丙肾上腺素*

20、急性心肌梗死最突出的症状() [单选题] *

A、休克

B、心前区疼痛*

C、心律失常

D、充血性心力衰竭

E、胃肠道症状

21.关于谵妄的概念，以下说法正确的是:(c) [单选题] *

A.谵妄是指由多种原因引起的急性不可逆性脑器质性精神障碍。

B.谵妄是指由多种原因引起的急性不可逆性非器质性精神障碍。

C.谵妄是指由多种原因引起的急性可逆性非器质性精神障碍。

D.谵妄是指由多种原因引起的急性可逆性脑器质性精神障碍。

22.《ICU 成人疼痛、躁动和谵妄临床治疗指南》推荐对 ICU 成年患者监测谵妄最有效和可靠的工具是?

() [单选题] *

A.CAM-ICU

B.ICDSC

C.CAM-ICU 和 ICDSC*

23.患者 RASS 评分多少分时，需进行谵妄评估？（ ） [单选题] *

A.RASS-3 分

B.RASS-2 分*

C.RASS-1 分

24.关于减少 ICU 谵妄的措施错误的是（ ） [单选题] *

A.医护人员晚间降低讲话音量

B.加大镇静药物剂量促进睡眠*

C.操作前加用镇痛药物

D.集中护理

25.谵妄的临床特征包括以下哪些（ ） [单选题] *

A.注意力不能集中

B.思维与语言障碍

C.错觉、幻觉

D.睡眠周期障碍

E.以上所有*

26、颅内压增高的病人床头抬高 15。~30。 , 其目的是为了:（ ） [单选题] *

A 有利于改善心脏功能

B 有利于改善呼吸功能

C 有利于颅内静脉回流*

D 有利于鼻饲

E 防止呕吐物误入呼吸道

27、颅脑手术后留置脑室引流管，通常情况下每日引流量不超过: (D) [单选题] *

A .200ml*

B .300ml

C .400ml

D.500ml

28、为维持正常的颅内压，通常情况下留置的脑室引流管，其管口需高于侧脑室平面（ ） [单选题] *

A.5~8cm

B.10~15cm*

C.20~25cm

D.25~30cm

E.30~35cm

29、患者因颅内压升高，按医嘱给予输注 20%甘露醇 250ml，请问应在多长时间内输完:（ ） [单选题] *

A.40 分钟

B.30 分钟*

C.60 分钟

D.90 分钟

E.120 分钟

30、护士判断脑室引流管是否通畅最简单的方法是（ ） [单选题] *

A.检查引流管是否扭曲

B.看引流管是否有液体引出

C.检查引流瓶(袋)中是否有引流液

D.观察管内的液面是否随病人呼吸、脉搏上下波动*

E.检查引流管是否折叠

中线导管穿刺题目

31.中线导管穿刺时首选的静脉是（ ） [单选题] *

A 贵要静脉*

B 肘正中静脉

C 头静脉

D 锁骨静脉

32.成人需用肝素盐水进行封管的浓度是（ ） [单选题] *

A.0U/ml

B.1~10U/ml

C.10U/ml

D.10-100U/ml*

E.1000U/ml

33.中长线测量臂围的位置是（ ） [单选题] *

A.肘正中下 10cm

B.肘正中上 10cm*

C.肘部

D.肘正中上 5cm

E.肘正中下 5cm

34.中线导管穿刺的步骤如下 ,1 术前准备 2 回撤插管鞘 3 插入并推进导管 4 撤出针芯 5 皮肤消毒 6 修剪导管长度 7 扎止血带铺手术巾 8 选血管及测量 9 撤出插管鞘 10 建立无菌区 11 静脉穿刺 12 预冲导管 13

撤出支撑导丝 14 安装连接器 15 固定并按压 16 记录。正确的顺序是 () [单选题] *

A1-8-10-12-5-7-11-4-3-2-13-9-6-14-15-16*

B1-8-10_12-5-7-11-3-4-2-13-14-9-6-15-16

C1-8-10-12-7-5-11-4-3-2-13-9-6-14-15-16

D1-8-10-7-12-5-4-3-2-6-9-11-13-14-15-16

35.中长线静脉导管的消毒范围：以穿刺点为中心半径(?)cm，左右至臂缘，大于敷贴面积。() [单选题] *

A.5

B.10*

C.15

D.8

36.慢性阻塞性肺疾病的预防方面，首先应强调 () [单选题] *

A.戒烟、*

B.改善环境卫生

C.预防感冒

D.避免受凉

E.加强锻炼

37.慢性支气管炎诊断标准下列哪项正确？ () [单选题] *

A.咳嗽、咳痰、每年发病持续 3 个月，连续 2 年以上。

B.咳嗽、咳痰，每年发病持续 3 个月，连续 1 年以上。

C.咳嗽、咳痰，每年发病持续 3 个月，连续 2 年以上，并排除其他心肺疾病。*

D.咳嗽、咳痰，每年发病持续 2 个月，连续 3 年以上，并排除其他心肺疾病。

E.咳嗽、咳痰 2 年，每年 1 个月。

38.慢性阻塞性肺病患者，当频咳后出现一侧剧烈胸疼，张口呼吸，紫绀，大汗淋漓，呼吸 32 次/分，血压 90/60mmHg,你认为下列哪项检查对诊断最重要？（ ） [单选题] *

A.血压气体分析。

B.心电图检查。

C.胸片。*

D.胸部超声波检查。

E.支气管镜检查。

39.评价肺氧合功能的指标中目前临床最常用的是（ ） [单选题] *

A.P(A-a)O₂

B.Q_s/Q_t

C.P(A-a)O₂/PaO₂

D.P(A-a)CO₂

E.PaO₂/FiO₂*

40.男，56 岁，咳嗽咳痰 20 多年，剧咳时气喘不能平卧。查体，双肺肺气肿征，两下肺有湿性啰音及散在哮鸣音。使用氨茶碱及抗生素效果欠佳。最可能的诊断是（ ） [单选题] *

A.支气管哮喘

B.支气管肺炎

C.心源性哮喘

D.慢性阻塞性肺病*

E.支气管扩张

41.CVP 反映的是（ ） [单选题] *

A.左心的充盈压

B.右心的充盈压*

C.上腔静脉的充盈压

D.肺动脉的充盈压

42.CVP 在 5cmH₂O 以下，血压低，提示（ ） [单选题] *

A.心功能不全

B.血容量已补足

C.急性肾衰

D.血容量不足*

43.关于中心静脉压(CVP) 哪项是错误的（ ） [单选题] *

A.正常值 6-12cmH₂O

B.低于 6cmH₂O 时表示血容量不足、高于 15cmH₂O 时提示心功能不全

C.高于 20cmH₂O 时表示充血性心力衰竭

D.颈静脉充盈、怒张，证明补液恰当*

44.BP 于 CVP 同时上升的处理原则（ ） [单选题] *

A.补充血容量

B.使用血管扩张剂或利尿剂*

C.使用强心利尿剂

D.使用强心升压药

45.下列关于 CVP 的描述，错误的是 g（ ） [单选题] *

A.CVP 的高低主要反映右心室前负荷和血容量

B.CVP 监测是反映左心功能的间接指标*

C.CVP 连续监测比单次检测更有意义

D.当患者有左心功能不全时，单纯检测 CVP 没有意义

E.CVP > 1.47-1.96KPa(15-20cmH₂O),表示右心功能不良

46、ICU 需要重点预防的医院感染类型是哪些 () [单选题] *

A.导管相关血流感染

B.呼吸机相关肺炎

C.导尿管相关尿路感染

D.以上均是*

47、医院获得性泌尿道感染中，最常见危险因素为哪项 ()? [单选题] *

A.留置导尿管*

B.使用广谱抗菌药物

C.泌尿道手术及检查

D.长期卧床

48、为预防导管相关血流感染(CLABSI)，国内外指南推荐置管时穿刺部位的皮肤消毒剂是哪种()? [单选题] *

A.75%乙醇

B.0.5%碘伏

C.0.5%-2%氯己定-乙醇*

D.2%碘伏

49、当前，下列哪项不属于推荐预防呼吸机相关性肺炎的措施 ()? [单选题] *

A.机械通气期间，常规使用镇静剂*

B.每日评估插管必要性，尽早脱机或拔管

C.抬高床头 30~45 度

D.使用复方氯己定含漱液口腔护理

50、世界卫生组织(WHO)提出的医务人员手卫生“五个重要时刻”不包括以下哪项()? [单选题] *

A.接触患者前

B.接触患者后

C.接触患者周围环境前*

D.接触患者体液、血液后

51 . A/C 模式的中文全称是() [单选题] *

A.辅助控制模式*

B.控制辅助模式

C.同步间歇指令通气

D.间歇指令通气

52.在 A/C PC 模式的设置参数中下列哪项参数不存在() [单选题] *

A.控制压力

B.支持压力*

C.吸气时间

D.呼气末正压

53.PEEPi 的中文全称是() [单选题] *

A.内源性呼气末正压*

B.外源性呼气末正压

C.生理性呼气末正压

C.控制性呼气末正压

54.在某项通气模式中，设置背景呼吸频率为 20 次/min，吸气时间为 1s，那呼气时间是（ ） [单选题]

*

A.3s

B.2s*

C.1s

D.1.9s

55.我们应当转变观念将 VAP 的名称认作以下哪种才更加合适？（ ） [单选题] *

A.呼吸机相关性肺炎

B.人工气道相关性肺炎*

C.医院获得性肺炎

D.控制通气相关性肺炎

56.患者，男性，身高 170CM，体重 90KG，无基础疾病，因术后麻醉未醒进行机械通气，给予 SIMV+PS+PEEP 模式通气，根据公式计算患者 VT 设置的合理范围为（ ） [单选题] *

A.720-900ml

B.520-650ml*

C.450-500ml

D.400-520ml

57.患者，男性，身高 170CM，体重 90KG，既往身体健康，因车祸伤术后，转入我科。今晨血气分析提示患者 PaO₂60mmHg，PaCO₂54mmHg，呼吸机模式为 PSIMV+PS+PEEP，f：14bpm、VT：500ml，PS：14cmH₂O、FIO₂：80%。双肺可见对称性广泛性渗出性改变，CVP、BP，暂无异常表现。根据公式计算，请问应将 VT 调解至何种水平？（ ） [单选题] *

A.260-390ml*

B.520-600

C.390-520ml

D.720-900ml

58.患者使用 PSIMV+PS+PEEP 通气过程中，应重点观察患者的（ ） [单选题] *

A.VT*

B.PaO₂

C.PaCO₂

D.气道压力

59.患者使用 SIMV+PS+PEEP 通气过程中，应重点观察患者的（ ） [单选题] *

A.VT

B.PaO₂

C.PaCO₂

D.气道压力*

60.FIO₂ 的调节原则是（ ） [单选题] *

A.越高越好

B.越低越好

C.保证氧合的基础上，尽量低。*

D.保证氧合的基础上，尽量高。

61.无涤纶套导管只能用于？且留置期不超过？（ ） [单选题] *

A 住院病人 不超过两周

B 住院病人 不超过一周*

C 门诊病人 不超过两周

D 门诊病人 不超过一周

62.早期导管功能不良的原因 () [单选题] *

A 导管尖端位置不佳或贴壁

B 导管扭转或打折

C 患者体位

D 以上都是*

63.短期使用的 cvc 若使用纱布敷料，需每？更换一次，透明敷料每？更换一次 () [单选题] *

A 三天 四—七天

B 两天 四—六天

C 五天 三—五天

D 两天 五—七天*

64.导管的固定，应 () [单选题] *

A 依赖敷料、弹性或非弹性绷带作为导管固定的方法。

B 使用无缝线固定装置，减少中心静脉导管感染的风险。*

C 使用胶布、缝合线固定中心静脉导管。

D 以上都是。

65.低分子肝素封管液浓度 () [单选题] *

A 900-1000U/ml

B 700-900U/ml

C 1000-1250U/ml*

D 1250-1500U/ml

66、肠内营养的最常见并发症是 () [单选题] *

A 恶心

B 呕吐

C 腹胀

D 腹泻*

E 吸入性肺炎

67.肠内营养最严重并发症（ ） [单选题] *

A 恶心

B 呕吐

C 腹胀

D 腹泻

E 吸入性肺炎*

68、肠内营养小于6周，有高度肺吸入风险应选择哪种管喂途径（ ） [单选题] *

A 鼻胃管

B 鼻肠管*

C 胃造口术

D 空肠造口术

69、鼻饲前抽取胃残余量，大于多少应减量或暂停鼻饲（ ） [单选题] *

A 50ml

B 100ml

C 150ml

D 200ml*

70、肠内营养时应将床头摇高？灌完后？h可放平（ ） [单选题] *

A.15° , 1/2

B.20°,1/2

C.30°,1/2

D.30° , 1*

71.除颤最适用的情况为？（ ） [单选题] *

A 室颤*

B 停搏

C 无脉性电活动

D 心动过速

72.口咽通气道可以保证哪部分气道通畅？（ ） [单选题] *

A 口腔至气管

B 喉腔至气管

C 口腔至咽腔*

D 咽腔至气管

73.留置在锁骨中线第二肋间的胸腔闭式引流管，主要是为了引流（ ） [单选题] *

A 液体

B 气体*

C 血液

D 脓液

74.SBP 的主要作用为（ ） [单选题] *

A.保障心脏自身的血液供应

B.保障颅脑血液供应

C.维持血压

D.保障外周脏器血液供应*

75.休克的概念为() [单选题] *

A 微循环障碍*

B 血压降低

C 心脏搏血量不足

D 血管功能异常

76.休克早期的主要变化为() [单选题] *

A 血压降低、尿量增多、皮肤高热出汗、情绪激动紧张。

B 血压基本正常、心率增快、四肢湿冷、脉搏细速。*

C 神志恍惚、血压先高后低、尿量增加

D 指甲充血实验正常，但患者心率增快，血压有一定降低。

77.指端充血实验阳性是指() [单选题] *

A 按压后指甲变白，5秒钟之内变红。

B 按压后指甲变白，3秒钟之内变红。*

C 按压后指甲变白，2秒钟之内变红。

D 按压后指甲变白，1秒钟之内变红。

78.指端充血实验阳性说明() [单选题] *

A 外周循环灌注不足、供血障碍。*

B 心脏供血不足

C 心脏射血不足

D 血压降低

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/418117067013006032>