

# 急诊科执业医师理论知识考核试题

## A1 型选择题

1. 肾病综合征的诊断标准不包括 ( ) [单选题] \*

A. 血清白蛋白  $< 30 \text{ g/L}$

B. 高血压 ✓

C. 水肿

D. 高脂血症

E. 尿蛋白  $> 3.5 \text{ g/d}$

2. 流行性脑脊髓膜炎病原体的特点是 ( ) [单选题] \*

A. 革兰氏染色阳性双球菌

B. 革兰氏染色阴性双球菌 ✓

C. 革兰氏染色阳性杆菌

D. 革兰氏染色阴性弧菌

E. 革兰氏染色阴性杆菌

3. 阵发性室上性心动过速的根治措施 ( ) [单选题] \*

A. 直流电复律

B. 经食管超速起搏

C. 口服长效  $\beta$  受体拮抗剂

D. 口服长效维拉帕米

E. 射频消融术 ✓

4.与胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤(胃 MALT 淋巴瘤)发病有关的感染是 ( ) [单选题] \*

A.Hp 感染✓

B. HPV 感染

C.HIV 感染

D.EBV 感染

E.HTIV-I 感染

5.常规血液透析的禁忌证是 ( ) [单选题] \*

A.肺部感染

B 新发脑出血✓

C.急性左心衰竭

D.糖尿病

E.高血压

6.甲状腺激素不足可引起 ( ) [单选题] \*

A.巨人症

B.单纯性甲状腺肿

C.肢端肥大症

D.黏液性水肿✓

E.侏儒症

7.抗利尿激素来源于 ( ) [单选题] \*

A.腺垂体

B.下丘脑的视上核和室旁核✓

C.垂体柄中间部

D.神经垂体

E.漏斗部

8.颈静脉过度充盈并于深呼气时更明显，最可能的原因是（ ）[单选题] \*

A.全心衰竭

B.左心衰竭

C.上腔静脉血栓形成

D.梗阻性肥厚型心肌病

E.心包积液✓

9.隐睾最严重的后果是（ ）[单选题] \*

A.睾丸扭转

B.睾丸炎

C.不育

D.睾丸恶变✓

E.睾丸萎缩

10.成人股骨头最主要的血供来源是（ ）[单选题] \*

A.干骺端上侧动脉

B.股骨干滋养动脉升支

C.髂外侧动脉✓

D.圆韧带内的小凹动脉

E.干骺端下侧动脉

11.下列引起白细胞减少的疾病，发病机制不属于粒细胞破坏或消耗的是（ ）[单选题] \*

A.脾功能亢进

B.类风湿关节炎

C.系统性红斑狼疮

D.巨幼细胞贫血✓

E.败血症

12.孟氏(Monteggia ) 骨折的×射线 ( ) [单选题] \*

A.桡骨干下 1/3 骨折合并尺骨

B.尺骨干上 1/3 骨折合并下尺骨

C.尺骨干上 1/3 骨折合并桡骨✓

D.尺骨干下 1/3 骨折合并桡骨

E.桡骨干上 1/3 骨折合并尺骨

13.下列不属于缺铁性贫血患者组织缺铁表现的是 ( ) [单选题] \*

A.口角炎、舌炎

B.毛发干枯、脱落

C.匙状甲

D.心悸 、气短✓

E.异食癖

14.男性外伤所致骨盆骨折易发生 ( ) [单选题] \*

A.精囊损伤

B.膀胱损伤

C.尿道球部损伤

D.输尿管损伤

E.后尿道损伤✓

15.单纯二尖瓣狭窄患者发生活动后心悸，呼吸困难的主要机制是（ ）[单选题] \*

- A.左心室射血阻力增大
- B.左心房排血受阻✓
- C.左心室收缩力降低
- D.左心室容量负荷过重
- E.血容量增多

16.发现有人晕倒时，确认所处环境安全后应立即采取的措施是（ ）[单选题] \*

- A.进行胸外心脏按压
- B.行人工呼吸
- C.报警
- D.大声呼叫救援
- E.判断意识是否清楚✓

17.治疗不稳定型心绞痛不恰当的措施是（ ）[单选题] \*

- A.静脉滴注尿激酶✓
- B.皮下注射低分子肝素
- C.口服阿司匹林
- D.口服阿托伐他汀
- E.静脉滴注硝酸异山梨酯

18.髌关节后脱位的常见体征（ ）[单选题] \*

- A.髌关节外旋
- B.髌关节伸直
- C.髌关节外展

D.患肢延长

E.大转子上移✓

19.β 肾上腺素受体阻断药的药理作用是 ( ) [单选题] \*

A.加快房室传导

B.减慢心率✓

C.松弛支气管平滑肌

D.迅速增强心肌收缩力

E.增加脂肪分解

20.易逆性抗胆碱酯酶药的作用为 ( ) [单选题] \*

A.与 AchE 形成二甲氨基甲酰化复合物✓

B.生成更为稳定的单烷氧基磷酯 AchE

C.与 AchE 形成磷酰化复合物

D.药物可引起 AchE 明显“老化”

E.形成磷酰化复合物不能自行水解

21.口服药物被肠壁和肝脏代谢后进入体循环的药量明显减少的现象称为 ( ) [单选题] \*

A.重吸收

B.首过消除✓

C.首剂效应

D.生物转化

E.肠肝循环

22.溢出性蛋白尿的主要成分为 ( ) [单选题] \*

A.IgG

B.单克隆轻链蛋白✓

C.白蛋白

D.β<sub>2</sub> 微球蛋白

E.Tamm-Horsfall 蛋白

23.下列不属于急性一氧化碳中度中毒表现的是 ( ) [单选题] \*

A.判断力降低

B.腹痛✓

C.运动失调

D.视物模糊

E.全身乏力

24.下列疾病导致左心室前负荷增加的是 ( ) [单选题] \*

A.肺动脉高压

B.二尖瓣狭窄

C.高血压

D.肺动脉瓣狭窄

E.主动脉瓣关闭不全✓

25.下列表现最能提示非肾小球源性血尿的是 ( ) [单选题] \*

A.尿红细胞呈多形性

B.红细胞形态均一✓

C.尿沉渣见红细胞管型

D.没有血凝块

E.没有肉眼血尿

26.脊髓型颈椎最常见的临床表现 ( ) [单选题] \*

- A.恶心、呕吐
- B.四肢无力，行走及持物不稳✓
- C.眩晕,头痛
- D.颈肩痛，压头试验阳性
- E.猝倒,视觉障碍

27.下列最符合心脏压塞诊断的是 ( ) [单选题] \*

- A.心浊音界向两侧扩大
- B.胸闷、气短症状
- C.胸骨左缘第 3 、 4 肋间闻及刮擦样音
- D. Ewart 征
- E.心音遥远、脉压小、颈静脉怒张、低血压✓

28.最容易出现缺血性骨坏死的骨折是 ( ) [单选题] \*

- A.股骨颈骨折✓
- B.股骨转子间骨折
- C.胫骨干骨折
- D.桡骨远端骨折
- E.肱骨外科颈骨折

29.肾挫伤的急诊处理是 ( ) [单选题] \*

- A.肾修补
- B.留置导尿
- C.手术探查



D.肾穿刺引流

E.严密观察，暂保守治疗✓

30.下列属于冠状动脉粥样硬化性心脏病主要危险因素的是（ ）[单选题] \*

A.脑力劳动者

B.生活节奏感

C.肥胖✓

D.进取心强

E.长期饮酒

31.对诊断甲状腺破坏所致甲状腺毒症有重要意义的表现是（ ）[单选题] \*

A.甲状腺肿大

B.血 FT3、FT4↑,甲状腺摄<sup>131</sup>I率明显↓✓

C.血 FT3、FT4↑,甲状腺摄<sup>131</sup>I率明显↑

D.TgAb 与 TOAb 常明显↑

E. TSH 明显↓

32.单纯肩关节前脱位手法复位后应立即采取的措施是（ ）[单选题] \*

A.持续牵引

B.三角巾悬吊✓

C.肩关节功能锻炼

D.石膏外固定

E.夹板外固定

33.目前我国发生肝衰竭的最重要的病因是（ ）[单选题] \*

A.遗传

B.酒精

C.病毒✓

D.药物

E.免疫

34.胫骨中段闭合性骨折发生骨筋膜室综合征，处理不当常造成的严重后果为（ ）[单选题] \*

A.创伤性关节炎

B.损伤性骨化

C.缺血性骨坏死

D.急性骨萎缩

E.缺血性肌挛缩✓

35.慢性肺心病最常见的酸碱失衡类型是（ ）[单选题] \*

A.呼吸性碱中毒合并代谢性酸中毒

B.代谢性碱中毒

C.代谢性酸中毒

D.呼吸性碱中毒

E.呼吸性酸中毒✓

36.主动脉瓣狭窄的杂音特点是（ ）[单选题] \*

A.递增型

B.递减型✓

C.一贯型

D.先增强后减弱

E.先减弱后增强

37.我国 75 岁以下人群心力衰竭的主要病因是 ( ) [单选题] \*

- A.高血压
- B.心房颤动
- C.冠心病✓
- D.心脏瓣膜病
- E.心肌病

38.治疗右心室梗死所致低血压的最关键措施是 ( ) [单选题] \*

- A.扩张冠状动脉
- B.利尿治疗
- C.补充血容量✓
- D.控制心室率
- E.强心治疗

39.肾小球疾病最主要的发病机制是 ( ) [单选题] \*

- A.肾小球高灌注
- B.高血压
- C.过敏反应
- D.血脂异常
- E.免疫异常✓

40.关于急性乳腺炎的预防,下列正确的是 ( ) [单选题] \*

- A.局部冷敷
- B.切开引流
- C.避免乳汁淤积✓

D.使用抗生素

E.婴儿含乳头睡觉

41.B 系急性淋巴细胞白血病(B-ALL) 最常出现的免疫分子标志是 ( ) [单选题] \*

A.CD2

B.CD34

C.CD19✓

D.CD38

E.CD7

42.贫血性梗死常见于 ( ) [单选题] \*

A.肺、脾

B.脑 肺

C.肾、肝

D.肠、肺

E.心 肾、脑和脾✓

43.下列哪一个脏器通常不发生凝固性坏死 ( ) [单选题] \*

A.肝

B.脾

C.肾

D.脑✓

E.肺

44.支气管哮喘患者发作时禁用的药物是 ( ) [单选题] \*

A.吗啡✓

- B.氨茶碱
- C.泼尼松
- D.沙丁胺醇
- E.肾上腺素

45.中年男性，胃癌术后7天。术后出现左下肢肿胀，骨伤痛明显，最有可能发生（ ）[单选题] \*

- A.深静脉瓣膜功能不全
- B.大隐静脉曲张
- C.血栓性脉管炎
- D.下肢动脉硬化
- E.深静脉血栓形成✓

46.停药后血浆中药物浓度虽已降至阈浓度以下时仍显现的药理作用称为（ ）[单选题] \*

- A.耐受性
- B.后遗效应✓
- C.特异质反应
- D.副作用
- E.停药反应

47.慢性阻塞性肺疾病最主要的病理生理特征是（ ）[单选题] \*

- A.气道结构重塑
- B.肺泡通气量下降
- C.持续性气流受限✓
- D.肺泡弹性回缩力减退
- E.明显的肺外效应

48.药物副作用是指( ) [单选题] \*

- A.在剂量过大或药物在体内蓄积过多时发生的不良反应
- B.停药后血药浓度已降至阈浓度以下时残存的药理效应
- C.反应性质与药物原有效应无关用药理拮抗药解救无效
- D.药物除治疗目的之外的其他作用✓
- E.先天遗传异常所致的反应

49.COPD 气道炎症最主要的效应细胞是( ) [单选题] \*

- A.肥大细胞
- B.嗜酸性粒细胞
- C.中性粒细胞✓
- D.巨噬细胞
- E.淋巴细胞

50.下列疾病所致的肺动脉高压中主要由低氧血症所致的是( ) [单选题] \*

- A.COPD✓
- B.结缔组织病
- C.肺血栓栓塞
- D.特发性肺动脉高压
- E.心源性肺水肿

51.激活糜蛋白酶原的是( ) [单选题] \*

- A.肠致活酶
- B.胰蛋白酶✓
- C.盐酸

D.组胺

E.辅酯酶

52.激活胰液中胰蛋白酶原的是 ( ) [单选题] \*

A.脂肪酸

B.胆盐

C.蛋白水解产物

D.肠激酶✓

E.糜蛋白酶

53.下列哪项不是精神分裂症的临床表现 ( ) [单选题] \*

A.被控制感

B.强制性思维

C.幻觉

D.意识障碍✓

E.影响妄想

## A2 型选择题

54.女,65岁。多关节肿痛2年,晨僵约1小时,查体:双手掌指关节对称性肿胀,压痛,双手X射线示双侧第

2、3掌指关节骨破坏,该疾病主要治疗药物不包括 ( ) [单选题] \*

A.羟氯喹

B.来氟米特

C.柳氮磺吡啶

D.甲氨蝶呤

E.别嘌醇✓

55.女,31岁。甲状腺次全切术后6小时,憋气烦躁迅速加重。查体:P110次/分 BP120/90mmHg,神志清楚,颈部肿胀,口唇发绀,无声音嘶哑,呼吸急促,双肺呼吸音粗,未闻及啰音,此时应给予的紧急处理措施是( ) [单选题] \*

A.立即面罩高流量吸氧

B.开放伤口,根据情况行气管切开✓

C.立即注射呼吸兴奋剂

D.保持呼吸通畅

E.半坐位,充分观察

56.男,50岁。呕血黑便4小时,发病前曾食硬质食物,发现HBsAg(+)30年,查体:P108次/分 BP90/60mmHg,烦躁,面色苍白,皮肤湿冷。应考虑出血的原因是( ) [单选题] \*

A.食管胃底静脉曲张破裂✓

B.食管肿瘤

C.胃溃疡

D.十二指肠溃疡

E.急性胃黏膜病变

57.女,40岁。2天前体检超声提示胆囊内3cm强回声团,后伴声影,胆囊壁厚6mm,平素无不适。糖尿病病史5年,目前血糖控制良好。无腹部手术史。其他检查未见异常,最适合患者的治疗方案是( ) [单选题] \*

A.腹腔镜胆囊切除术✓

B.保守治疗

C.ERCP取石

D.开腹胆囊切除术



E.胆囊造瘘术

58.男,60岁。上腹胀隐痛伴有皮肤黄染,食欲不振,厌油腻饮食1个月,症状进行性加重,体重减轻5kg,10天前开始出现大便颜色变浅,近2天大便呈陶土样,查体:巩膜明显黄染,肝脾肋下未触及,右肋下缘可触及肿大的胆囊底部,无压痛,实验室检查:血总胆红素 $340\mu\text{mol/L}$ ,血AFP $5\mu\text{g/L}$ ,最可能的诊断为( ) [单选题] \*

A.胆囊结石

B.肝门部胆管癌

C.肝癌

D.胆总管下段癌 ✓

E.胆总管结石

59.男,45岁。突发咳鲜血2小时,约400ml。发现HBsAg(+)20年。查体:T $36.5^{\circ}\text{C}$ ,P80次/分 R18次/分, BP 120/80mmHg。巩膜无黄染,双肺呼吸音清,未闻及干、湿啰音,心律齐。腹膨隆,无压痛、反跳痛、肌紧张,肝脏肋下未触及,脾脏肋下4cm 移动性浊音(+).准备急诊手术治疗,术前检查中不包括( ) [单选题] \*

A.腹水常规检查 ✓

B.肾功能测定

C.凝血功能测定

D.血清电解质测定

E.肝功能测定

60.女,45岁。突发右上腹疼痛6小时。发病前曾进食油腻食物,伴发热,无寒战。查体:T  $39.6^{\circ}\text{C}$  P130次/分, BP86/60mmHg。神志淡漠,巩膜黄染。心肺未见明显异常。右上腹压痛、反跳痛,肌紧张阳性。实验室检查:WBC $20\times 10^9/\text{L}$ ,总胆红素 $110\mu\text{mol/L}$ ,直接胆红素 $78\mu\text{mol/L}$ ,腹部B型超声提示肝内外胆管扩张。该病人治疗的首要措施是( ) [单选题] \*

A.胆道引流✓

B.应用抗生素

C.保护肝功能

D.抗休克治疗

E.解痉镇痛

61.男,50岁。头晕、乏力伴腰痛3个月。血常规: Hb 72 g/L,WBC  $6.4 \times 10^9/L$ ,Plt  $125 \times 10^9/L$ ,ESR 106 mm/h,血清蛋白电泳见M蛋白尿。尿蛋白(+),骨髓细胞学检查:幼稚浆细胞占0.42。腰椎X射线检查见第23椎体压缩性骨折。最可能的诊断是( ) [单选题] \*

A.反应性浆细胞增多症

B.多发性骨髓瘤✓

C.骨转移癌

D.慢性肾小球肾炎

E.霍奇金淋巴瘤

62.男,31岁。反酸伴上腹胀2个月,胸骨后烧灼样痛3天。最适当的处理措施是( ) [单选题] \*

A.口服阿司匹林,胸痛时舌下含硝酸甘油

B.冠状动脉造影

C.食管24小时pH值监测

D.多潘立酮及枸橼酸铋钾口服

E.口服奥美拉唑✓

63.女,40岁。确诊为急性胰腺炎,内科正规治疗2周后上腹部压痛明显。体温仍在 $38 \sim 39^\circ\text{C}$ ,血淀粉酶256 U/L,WBC  $16 \times 10^9/L$ 。可能性最大的是( ) [单选题] \*

A.败血症

- B.病情迁延未愈
- C.合并急性胆囊炎
- D.并发胰腺假性囊肿
- E.并发胰腺脓肿✓

64.男,40岁。乏力、反复牙龈出血及皮肤出血点1年。乙型肝炎病史10余年。查体:左肋下可触及包块,边界清,质地韧,有切迹。随呼吸移动,无压痛。该包块可能是( ) [单选题] \*

- A.左肾
- B.胰腺癌
- C.脾脏✓
- D.胃癌
- E.肝脏左叶

65.女.31岁。口服有机磷农药300ml后口吐白沫、呼吸困难立即入院,经洗胃、碘解磷定及阿托品治疗后症状有所缓解,但24小时后再次出现呼吸困难。查体:R16~18次/分, BP112/65mmHg,昏迷,呼吸浅慢,皮肤湿冷,瞳孔针尖样,双肺可闻及湿啰音,心率50~60次/分。急诊处理正确的是( ) [单选题] \*

- A.立即气管插管机械通气治疗,然后给予解毒剂治疗✓
- B.立即解毒治疗,导泻,必要时气管插管
- C.立即解毒治疗,重复洗胃,必要时气管插管
- D.立即气管插管机械通气,强心、利尿治疗
- E.立即给予呼吸兴奋剂+解毒治疗

66.男,56岁。皮肤黄染1个月,逐渐加重,伴有皮肤瘙痒,大便灰白色,无发热,查体:T36.8℃, P 85次/分 R18次/分, BP130/80mmHg,巩膜皮肤黄染,双肺呼吸音清,未闻及干、湿啰音,心律齐,腹软,肝肋下4cm,未触及胆囊,墨菲征(-),腹部CT:肝总管上段2~1.5cm占位病变。最适宜的术式是( ) [单选题] \*

A.肝门胆管、胆囊、部分肝外胆管及部分肝门区的肝组织切除✓

B.全胰腺切除术

C.ERCP 取石术

D.胰头十二指肠切除术

E.左三叶肝切除

67.女,31岁。发热伴乏力、牙龈出血1周,化验血常规:Hb 100g/L,WBC  $2.1 \times 10^9/L$ ,骨髓细胞学检查:骨髓增生极度活跃,可见 Auer 小体, MPO 染色(+), PAS 染色(-)NSE 染色(+),且不被氟化钠抑制,流式细胞术免疫表型:CD34(+), CD33(+),最可能诊断为( ) [单选题] \*

A.AML-M1

B.AML-M5

C.AML-M4

D.AML-M2

E.AML-M3✓

68.男,56岁。上腹不适,进食后饱胀2个月,时有恶心、呕吐,上腹部隐痛,无胃灼热、反酸,查体:T 36.5 °C P80次/分, R18次/分, BP120/80mmHg, 身高170cm 体重52kg, 心肺查体未见异常,上腹部轻压痛,紧张反跳痛。胃镜在胃体小弯侧见直径2.5cm 溃疡。上有污秽苔,质脆易出血,其转移灶最常见的部位是( )

[单选题] \*

A.骨

B.胰

C.肺

D.肝✓

E.脑

69.男,40 岁。干农活时刺伤右足 10 天,伤后未就医,张口困难 2 天,颈项紧,频繁抽搐,呼吸道分泌物较多,有窒息的危险,为保持呼吸道的通畅。最有效的措施是 ( ) [单选题] \*

A.气管切开✓

B.协助叩背咳痰

C.环甲膜穿刺

D.气管插管

E.吸痰

70.女,28 岁。发现左颈前包块 1 个月。无多食、易饥、怕热、消瘦。查体:T 36.5°C, P80 次/分, R18 次/分 BP 120/80mmHg,甲状腺左叶可触及直径约 1cm 质硬肿物,表面不光滑,颈部未触及肿大淋巴结。肺呼吸音清,未闻及干、湿啰音,心律齐,腹软,无压痛。最有助于确诊的检查是 ( ) [单选题] \*

A.颈部增强 CT

B.甲状腺核素静态显像

C.颈部彩色多普勒超声

D.细针穿刺细胞学检查✓

E.血清甲状腺素水平

71.男,22 岁。咳嗽伴发热 3 天,给予青霉素静脉滴注抗感染治疗,用药后患者突然出现气急、胸闷、烦躁不安。查体:T38.5°C, P140 次/分, R32 次/分, BP75/40mmHg 面色苍白,大汗淋漓,两肺可闻及哮鸣音,身体多部位红色皮疹。最可能的原因是 ( ) [单选题] \*

A.感染性休克

B.哮喘急性发作

C.急性呼吸窘迫综合征

D.过敏性休克✓

E.急性左心衰竭

72.男,35岁。反复上腹痛3年,疼痛向背部放射,多在空腹及夜间出现。既往体健。平常工作紧张。查体:T36.5°C, P80次/分, R18次/分 BP120/80mmHg。双肺呼吸清,未闻及干、湿啰音,心律齐。腹软,无压痛。最可能的诊断是( ) [单选题] \*

A.胃癌

B.十二指肠溃疡✓

C.胰腺癌

D.胃溃疡

E.食管溃疡

73.男,35岁。被倒塌的房屋压伤左下肢6小时入院。查体:T37°C, P108次/分, R28次/分,左小腿大片肌肉撕脱,伤口处留有大量污物。急诊行清创处理。术后3天。患者体温逐步上升,烦躁不安,大量出汗,尿量明显减少。观察伤口,左下肢明显肿胀,见大量恶臭浆液性血性渗出物,皮下可触及捻发音。下面处理措施不正确的是( ) [单选题] \*

A.整块切除受累肌肉

B.术后勤换敷料

C.应用高压氧治疗

D.首选氨基糖苷类抗生素✓

E.病变区多处切开

74.男,35岁。10天前淋雨后出现发热,按“感冒”治疗效果不佳。1天前突发寒战、右上腹痛。查体:T39°C, BP120/80mmHg, 双肺未闻及干、湿啰音,心律齐。肝肋下可触及,压痛明显,右腋前线第8肋间有叩痛。为明确诊断,应首选的检查是( ) [单选题] \*

A.肝功能

B.胸部 X 射线片

C.肝炎病毒标志物检测

D.腹部 B 型超声✓

E.血甲胎蛋白

75.女,22 岁。左额部被刀划伤 12 小时就诊。查体:左额部有 3cm 长伤口,深及骨膜,有血痂,伤口周边有红肿。宜采取的处理方法是( ) [单选题] \*

A.清创后二期缝合

B.清创后一期缝合✓

C.清创后旋转橡胶片引流

D.伤口敷料覆盖

E.局部应用抗生素

76.女,40 岁。突发上腹痛、恶心 8 小时。疼痛由局部逐渐波及全腹,伴发热。既往十二指肠溃疡病史 20 年。查体:T38.4°C, P104 次/分, R26 次/分, BP 110/70mmHg 双肺呼吸音清,未闻及干、湿啰音,心律齐。全腹肌紧张,压痛和反跳痛阳性,肠鸣音消失。对这种疾病的描述中错误的是( ) [单选题] \*

A.保守治疗无效后需剖腹探查

B.若诊断和治疗延误易致中毒性休克

C.常常伴有代谢性碱中毒✓

D.继发性腹膜炎较原发性腹膜炎多见

E.大多数合并麻痹性肠梗阻

77.男 28 岁。在气温 34°C 时,负重跑步 5km 后突发意识不清伴痉挛、抽搐 2 小时。查体:T41.5°C, P166 次/分, R28 次/分, BP100/42mmHg,瞳孔等大等圆,心尖部第一心音低钝。四肢肌张力高。最关键的治疗措施是( ) [单选题] \*

A.应用抗癫痫药物

B.应用镇静药

C.降温治疗✓

D.氧疗

E.应用甘露醇

78.男,50岁。吃海鲜后夜间突发左足第一跖趾关节剧烈疼痛1天。查体:关节局部红肿,压痛明显。既往无类似发作。化验:血尿酸 602 μmol/L。目前最主要的治疗药物是( ) [单选题] \*

A.苯溴马隆

B.别嘌醇

C.抗生素

D.非甾体抗炎药✓

E.甲氨蝶呤

79.男,35岁,农民。发热5天,尿少1天,查体:T37.5°C,面部潮红,结膜充血水肿,腋下见数个出血点。实验室检查:血 WBC $19 \times 10^9/L$ ,有异型淋巴细胞,尿蛋白(+++)。最可能的诊断是( ) [单选题] \*

A.肾综合征出血热✓

B.地方性斑疹伤寒

C.钩端螺旋体病

D.败血症

E.急性肾盂肾炎

80.男 50岁。烦躁、昼睡夜醒2天。肝炎、肝硬化病史5年。对明确意识障碍病因最有意义的实验室检查是( ) [单选题] \*

A.血糖



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/426221223213010044>