

## 内科护理学（专）练习题A

### 一、选择题

1. 糖尿病为何多尿（ ）。  
A. 肾小管浓缩力减少 B. 肾小球排水多 C. 醛固酮增加 D. 因饮水多
2. 慢性支气管炎的主要并发症是（ ）。  
A. 阻塞性肺气肿 B. 急性肺部感染 C. 支气管扩张 D. 自发性气胸 E. 呼吸衰竭
3. 大咯血患者最关键的护理措施是（ ）。  
A. 消除心理不良因素 B. 保持呼吸道通畅 C. 减少活动，保持安静  
D. 准备好急救药品和器械 E. 作镇静、镇咳等对症处理
4. 肺结核化学治疗原则是（ ）。  
A. 早期、联合、适量、规律、全程 B. 仅早期使用抗结核药 C. 间断使用抗结核药  
D. 只用一种杀菌剂 E. 药物剂量应偏大
5. 心源性呼吸困难最先出现的是（ ）。  
A. 端坐呼吸 B. 阵发性夜间呼吸困难 C. 劳力性呼吸困难  
D. 心源性哮喘 E. 急性肺水肿
6. 肾性水肿表现为（ ）。  
A. 有胸水 B. 眼睑及面部水肿 C. 双下肢水肿 D. 下垂部位水肿 E. 心包积液
7. 进展期胃癌最早出现的症状是（ ）。  
A. 畏食、纳差 B. 呕血和黑便 C. 体重减轻 D. 上腹痛 E. 上腹饱胀不适
8. 纠正尿毒症高血磷选用（ ）。  
A. 静脉注射钙剂 B. 口服氢氧化铝 C. 口服 VC  
D. 静脉注射碳酸氢钠 E. 口服活化维生素 D3
9. 肺炎球菌肺炎剧烈胸痛者宜取（ ）。  
A. 平卧位 B. 半卧位 C. 坐位 D. 健侧卧位 E. 患侧卧位
10. 贫血时病人的贫血体征，检查较为可靠的部位是（ ）。  
A. 手掌皮肤及眼睑结膜 B. 面颊皮肤及上颌黏膜 C. 手背皮肤及甲床  
D. 颈部皮肤 E. 耳廓皮肤及口腔牙龈
11. 缩唇呼吸的重要性是（ ）。  
A. 减少胸痛 B. 避免小气道塌陷 C. 加强呼吸运动  
D. 减少呼吸困难 E. 减少呼吸肌劳累
12. 甲亢病人，休息的环境要求是（ ）。  
A. 安静 B. 光线充足 C. 空调房间 D. 室温宜高 E. 双人房间

13. 甲状腺危象的先兆表现是 ( )。
- A. T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub> 升高      B. 体温 37.5℃      C. 严重呕吐、腹泻  
D. 脉率 110 次/分      E. 烦躁或嗜睡
14. 糖尿病病人失明的主要原因是 ( )。
- A. 白内障      B. 角膜感染      C. 视网膜病变      D. 视神经炎症      E. 视盘水肿
15. 瘫痪病人一般不会发生的并发症 ( )。
- A. 肾衰竭      B. 泌尿道感染      C. 压疮      D. 大小便失禁      E. 呼吸道感染
16. 结核菌素实验阳性表示 ( )。
- A. 患有结核病      B. 具有传染性      C. 对结核菌敏感  
D. 曾受过结核菌感染      E. 免疫力强
17. 慢支并发肺气肿时, 其主要症状是 ( )。
- A. 突然出现呼吸困难      B. 逐渐加重的呼吸困难      C. 喘息      D. 咳嗽      E. 咳痰
18. 一般留置导尿管 3-4 天后, 细菌尿的发生率达 ( )。
- A. 50%以上      B. 60%以上      C. 70%以上      D. 80%以上      E. 90%以上
19. 甲状腺功能亢进症高代谢综合症的表现是 ( )。
- A. 神经兴奋性增高      B. 心动过速      C. 突眼  
D. 怕热多汗、食欲亢进      E. 甲状腺肿大
20. 肾病综合征无下列哪种症状 ( )。
- A. 尿钙排出多      B. 蛋白尿      C. 低蛋白血症      D. 高脂血症      E. 凹陷性水肿
21. 肝硬化病人容易发生凝血障碍的主要原因是 ( )。
- A. 血小板减少      B. 维生素 K 缺乏      C. 凝血因子 III 缺乏  
D. 某些凝血因子缺乏      E. 血液中抗凝物质增加
22. 白血病患者突然出现剧烈头疼、呕吐、视物模糊, 考虑出现下列哪种情况 ( )。
- A. 脑膜白血病      B. 颅内出血      C. 感冒      D. 进食了不洁食物      E. 高血压
23. 急性心肌梗死患者止痛治疗, 遇到下列哪种情况下不能用吗啡 ( )。
- A. 呼吸抑制      B. 频发室性期前收缩      C. 心力衰竭      D. 神志欠清      E. 高龄患者
24. 铁的吸收部位 ( )。
- A. 胃和十二指肠      B. 十二指肠及空肠      C. 空肠及回肠  
D. 空肠和结肠      E. 以上都不是
25. 下列哪项不属于高血压的并发症 ( )。

- A. 肾衰竭                      B. 心绞痛                      C. 短暂性脑缺血发作  
D. 下肢动脉供血不足    E. 视网膜动脉狭窄
26. 消化性溃疡发生与何种病原菌感染有关 (     ) 。
- A. 链球菌    B. 肺炎球菌    C. 幽门螺杆菌    D. 金黄色葡萄球菌    E. 大肠杆菌
27. 肾病综合征无下列哪种症状 (     ) 。
- A. 尿钙排出多    B. 蛋白尿    C. 低蛋白血症    D. 高脂血症    E. 凹陷性水肿
28. 出血坏死性胰腺炎的特点是 (     ) 。
- A. 恶心、呕吐                      B. 腹上区疼痛                      C. 发热、白细胞升高  
D. 血、尿淀粉酶升高    E. 血钙减低
29. 上消化道大量出血是指数小时内失血量超过 (     ) 。
- A. 400 毫升    B. 500 毫升    C. 800 毫升    D. 1000 毫升    E. 1500 毫升
30. 右心功能不全时常见 (     ) 。
- A. 胸痛    B. 咳痰    C. 咳泡沫血痰                      D. 咳嗽    E. 颈静脉怒张
31. 患者，女，38 岁。慢性肾衰竭 5 年。2 周前出现进餐后恶心、呕吐，加重 2 天入院。查体：每天尿量 500ml，内生肌酐清除率 20ml/分，以下错误的饮食方案是 (     ) 。
- A. 低钠饮食  
B. 低钾饮食  
C. 高热量饮食  
D. 高蛋白饮食
32. 按病因学分类，临床上最常见的肺炎是 (     ) 。
- A. 细菌性肺炎  
B. 病毒性肺炎  
C. 支原体肺炎  
D. 真菌性肺炎
33. 哮喘急性发作常见的诱因是 (     ) 。
- A. 花粉  
B. 尘螨  
C. 感染  
D. 阿司匹林
34. 纠正缺 O<sub>2</sub> 和 CO<sub>2</sub> 潴留最重要的措施是 (     ) 。
- A. 氧气疗法  
B. 保持气道的通畅  
C. 增加通气量  
D. 纠正酸碱平衡失调
35. 处理支气管扩张大咯血重要措施是 (     ) 。
- A. 保持呼吸道通畅  
B. 输血  
C. 抗生素  
D. 镇静剂
36. 某支气管扩张患者。胸片提示病变位于左肺下叶外底段。体位引流选择的合适体位是 (     ) 。

- A. 左侧卧位
  - B. 右侧卧位
  - C. 左侧卧位, 床脚抬高 30 ~ 50cm
  - D. 右侧卧位, 床脚抬高 30 ~ 50cm
37. 支气管哮喘最主要的激发因素是 ( )。
- A. 过敏原吸入
  - B. 感染
  - C. 食物
  - D. 气候变化
38. 大量咳痰是指 ( )。
- A. 24 小时咳痰量大于 50ml
  - B. 24 小时咳痰量大于 100ml
  - C. 24 小时咳痰量大于 150ml
  - D. 24 小时咳痰量大于 200ml
39. 医院获得性肺炎最常见的病原菌为 ( )。
- A. 肺炎链球菌
  - B. 流感嗜血杆菌
  - C. 革兰阴性杆菌
  - D. 支原体
40. 减轻心脏负担的主要措施是 ( )。
- A. 卧床休息
  - B. 预防风湿复发
  - C. 防止栓塞发生
  - D. 防寒保暖
41. 鼓励长期卧床的心力衰竭患者在床上活动下肢, 其主要目的是 ( )。
- A. 防止肌肉功能退行性减退
  - B. 改善末梢循环
  - C. 预防下肢静脉血栓
  - D. 减少回心血量
42. 张力性气胸主要的病理生理变化是 ( )。
- A. 纵隔向健侧移位
  - B. 纵隔扑动
  - C. 胸壁反常呼吸运动
  - D. 肺内气体对流
43. 不符合心源性水肿是 ( )。
- A. 水肿从眼睑开始
  - B. 水肿呈凹陷性
  - C. 体循环淤血导致水肿
  - D. 摄取钠盐过多可加重水肿
44. 护理高血压的患者, 下列哪项措施不正确 ( )。
- A. 协助用药尽快将血压降至较低水平
  - B. 改变体位时动作宜缓慢
  - C. 淋浴时水温不宜过高
  - D. 头晕、恶心时协助其平卧并抬高下肢
45. 癫痫大发作最典型的特点是 ( )。
- A. 口吐白沫
  - B. 意识丧失、全身抽搐
  - C. 大小便失禁
  - D. 全身肌肉强直性收缩

## 二、填空

1. ( ) 和 ( ) 是糖尿病的急性并发症。
2. 肠道中血液的蛋白质消化产物被吸收, 引起血中尿素氮浓度增高, 称为 ( )。
3. 消化道溃疡的患者应避免食用 ( ) 的食物和 ( ) 的食物。
4. ( ) 是肾性高血压的常见原因。
5. 左心衰以 ( ) 淤血和心排血量降低为主。
6. 痰液性状随病因不同而异, 黄脓痰多为 ( ), 铁锈色痰见于 ( )。
7. 呼气性呼吸困难是指呼气费力, 呼气时间 ( ), 常伴有哮鸣音, 多见于 ( )、( ) 和喘息型慢性支气管炎。
8. 胸外心脏按压部位为 ( ), 按压频率为 ( )。
9. 带有三(四)腔气囊管患者出血停止后, 放松牵引, 放出囊内气体, 保留管道观察 ( ), 未再出血考虑拔管。
10. 导致甲状腺危象的原因有 ( )、( )、( )、( )、( )。

## 三、名词解释

1. 心悸
2. 哮喘持续状态
3. 慢性肾衰竭
4. 心肌梗死

## 四、简答题

1. 请列出阻塞性肺气肿常用的4个护理诊断?
2. 促进病人有效排痰的有效措施有哪些?
3. 简述心房颤动的心电图特点?
4. 脑血栓的治疗原则有哪些?

## 五、论述题

患者男性, 50岁, 32岁时因多食、多饮、多尿、血糖高诊断为糖尿病, 长期口服二甲双胍2片/次, 一日3次, 同时皮下注射正规胰岛素24u/d, 1个月前因血糖正常, 尿糖阴性, 自行停止注射胰岛素, 最近1周来食欲明显减退, 极度口渴、恶心呕吐, 今晨起四肢厥冷, 呼吸加快, 来院急诊。查B S : 21mmol/L, 尿糖(++++) , 尿酮(+++1) , P H : 7.29, 白细胞 $1.6 \times 10^9/L$ , 立即给予抢救入院, 护理体检: T : 36.9C° , P : 120次/分, B P : 100/75mmHg, R : 30次/分, 倦睡、形体消瘦, 呼吸有烂苹果味, 皮肤干燥,

---

眼球下陷，瞳孔等大同圆、对称、光反射存在，其他查体无异常发现。请问：

1. 该患目前应诊断什么病？
2. 列出该患目前存在的护理诊断？
3. 对该患者应给予哪些急救护理？

## 内科护理学（专科）练习题 A 答案

### 一、选择

1.D 2.A 3.B 4.A 5.C 6.B 7.D 8.A 9.E 10.A 11.B 12.A 13.E 14.C 15.A 16.D 17.B  
18.E 19.D 20.A 21.D 22.B 23.A 24.B 25.D 26.C 27.A 28.E 29.C 30. E  
31.D 32.A 33.C 34.B 35.A 36.D 37.A 38.B 39.C 40.A 41.C 42.A 43.A 44.A  
45.B

### 二、填空

1. 酮症酸中毒 非酮症糖尿病昏迷
2. 肠性氮质血症
3. 机械性刺激强、化学性刺激强
4. 肾实质性高血压
5. 肺循环
6. 化脓性感染 肺炎球菌性肺炎
7. 延长 支气管哮喘 慢性阻塞性肺气肿
8. 胸骨中下 1/3 交界处 100 次/分
9. 24h
10. 应激状态 严重躯体疾病 口服过量 TH 制剂 严重精神创伤 手术中过度挤压甲状腺

### 三、名词解释

1. **心悸**：是指人自觉心跳或心慌伴心前区不适感。
2. **哮喘持续状态**：指哮喘发作严重，经一般的内科治疗 24 小时不能缓解者。
3. **慢性肾衰竭**：是由各种原发和继发性慢性肾脏疾病持续发展，最终出现以代谢产物潴留，水、电解质、酸碱平衡失调和全身各系统症状为主要表现的临床综合征。

4. **心肌梗死**：是指因冠状动脉供血急剧减少或中断，使相应的心肌严重而持久地缺血导致心肌坏死。

#### 四、简答题

1. 请列出阻塞性肺气肿常用的 4 个护理诊断？

答：①气体交换受损 ②清理呼吸道无效 ③营养失调 ④焦虑

2. 促进病人有效排痰的有效措施有哪些？

答：①深呼吸和有效咳嗽②湿化和雾化疗法③胸部叩击与胸壁震荡④体位引流⑤机械吸痰

3. 简述心房颤动的心电图特点？

答：①P 波消失，代之以 350-600 次/分、间隔不均匀、形状、大小不同的 f 波；

②QRS 波群间隔绝对不规则，心室率通常在 100-160 次/分；

③QRS 波形态一般正常，伴有室内差异性传导或原有束支传导阻滞者 QRS 波群可增宽，变形。

4. 脑血栓的治疗原则有哪些？

答：①早期溶栓：发病后 6 小时内

②控制脑水肿、降低颅内压

③调整血压

④防治脑水肿

⑤抗凝治疗

⑥血液稀释疗法、抗血小板聚集、钙通道阻滞、高压氧、中医药、手术

#### 五、论述题



1. 1 型糖尿病合并酮症酸中毒。

2. 该患目前存在的护理诊断有：

1) 酮症酸中毒：与胰岛素治疗中断有关。

2) 营养失调低于机体需要：与糖尿病引起的糖、脂肪、蛋白质代谢紊乱有关。

3) 知识缺乏：缺乏糖尿病的有关知识。

4) 有感染的危险：与高血糖引起机体抵抗力下降有关。

5) 体液不足：与大量失水、呕吐有关。

3. 应给予下列急救护理：

1) 立即建立两条静脉通路，准确执行医嘱，确保液体和胰岛素的输入。

2) 病人绝对卧床休息，注意保暖，预防压疮和继发感染。

## 内科护理学（专）练习题B

### 一、选择

1. 心肌梗死的发热很少超过（ ）。  
A. 37.5C°      B. 38C°      C. 38.5C°      D. 39C°      E. 39.5C°
2. 高血压急症的处理原则最主要的是（ ）。  
A. 吸氧      B. 心电监护      C. 肌注安定      D. 立即降低血压      E. 以上都不是
3. 患者，男性，69岁，高血压心脏病10年，近1年来病人明显感觉体力活动受限，洗脸、刷牙即可引起呼吸困难、心悸，此病人目前心功能处于（ ）。  
A. 代偿期      B. I级      C. II级      D. III级      E. IV级
4. 在我国急性胰腺炎最常见的病因是（ ）。  
A. 胆石症与胆道疾病      B. 手术与创伤      C. 暴饮暴食  
D. 大量饮酒      E. 胰管阻塞
5. 消化性溃疡的主要症状是（ ）。  
A. 上腹痛      B. 恶心、呕吐      C. 营养不良      D. 贫血      E. 便血
6. 贫血时病人的贫血体征，检查较为可靠的部位是（ ）。  
A. 手掌皮肤及眼睑结膜  
B. 面颊皮肤及上颌黏膜  
C. 手背皮肤及甲床  
D. 颈部皮肤  
E. 耳廓皮肤及口腔牙龈
7. 肝硬化病人容易发生凝血障碍的主要原因是（ ）。  
A. 血小板减少      B. 维生素K缺乏      C. 凝血因子III缺乏  
D. 某些凝血因子缺乏      E. 血液中抗凝物质增加
8. 右心功能不全时常见（ ）。  
A. 胸痛      B. 咳痰      C. 咳泡沫血痰      D. 咳嗽      E. 颈静脉怒张

9. 肝性脑病病人暂停蛋白质饮食是为了（ ）。
- A. 减少氨的形成      B. 减少氨的吸收      C. 促使氨的转化  
D. 降低肠道内 PH 值      E 降低血尿素氮.
10. 下列心力衰竭治疗措施中，不能减轻心脏负担的是（ ）。
- A. 身心休息      B. 低盐饮食      C. 利尿剂      D. 洋地黄类药物      E. 扩血管药物
11. 肺气肿患者的胸廓呈（ ）
- A. 鸡胸      B. 扁平胸      C. 桶状胸      D. 局部胸廓内陷      E. 胸廓呈局限性膨胀
12. 口服铁剂的护理，健康教育错误的是（ ）。
- A. 若为水剂或冲剂，用吸管吸      B. 空腹时服用      C. 口服剂使大便呈黑色  
D. 禁饮浓茶      E. 与维生素 C 同服
13. 慢支并发肺气肿时，其主要症状是（ ）。
- A. 突然出现呼吸困难      B. 逐渐加重的呼吸困难      C. 喘息      D. 咳嗽      E. 咳痰
14. 大咯血患者最关键的护理措施是（ ）。
- A. 消除心理不良因素  
B. 保持呼吸道通畅  
C. 减少活动，保持安静  
D. 准备好急救药品和器械  
E. 作镇静、镇咳等对症处理
15. 慢性支气管炎的主要并发症是（ ）。
- A. 阻塞性肺气肿      B. 急性肺部感染      C. 支气管扩张  
D. 自发性气胸      E. 呼吸衰竭
16. 下列治疗上呼吸道感染的措施，哪项不妥（ ）
- A. 适当休息，多饮水      B. 半流质饮食      C. 作必要的对症处理

- D. 中医中药治疗                      E. 常规应用抗生素
17. 引起呼吸系统疾病最常见的病因是 (     ) 。
- A. 吸烟              B. 肿瘤              C. 感染              D. 理化因素              E. 变态反应
18. 一般留置导尿管 3-4 天后, 细菌尿的发生率达 (     ) 。
- A. 50%以上              B. 60%以上              C. 70%以上              D. 80%以上              E. 90%以上
19. 甲状腺功能亢进症高代谢综合症的表现是 (     ) 。
- A. 神经兴奋性增高              B. 心动过速              C. 突眼
- D. 怕热多汗、食欲亢进              E. 甲状腺肿大
20. 肾病综合征无下列哪种症状 (     ) 。
- A. 尿钙排出多              B. 蛋白尿              C. 低蛋白血症              D. 高脂血症              E. 凹陷性水肿
21. 缩唇呼吸的重要性是 (     ) 。
- A. 减少胸痛              B. 避免小气道塌陷              C. 加强呼吸运动
- D. 减少呼吸困难              E. 减少呼吸肌劳累
22. 脑栓塞患者应何时进行功能锻炼 (     ) 。
- A. 2 个月后              B. 1 周后              C. 2 周后              D. 3 周后              E. 4 周后
23. 肾性水肿表现为 (     ) 。
- A. 有胸水              B. 眼睑及面部水肿              C. 双下肢水肿              D. 下垂部位水肿              E. 心包积液
24. 糖尿病性微血管病变, 以下列哪项最为重要 (     ) 。
- A. 急性肾小球肾炎              B. 慢性肾小球肾炎              C. 肾小球硬化症
- D. 肾病综合症              E. 慢性肾功能不全
25. 下列护理诊断, 属神经系统疾病病人不常见的是 (     ) 。
- A. 情感障碍              B. 语言沟通障碍              C. 感知觉障碍              D. 躯体移动障碍              E. 意识障碍

26. 心源性呼吸困难最先出现的是 ( )。
- A. 端坐呼吸  
B. 阵发性夜间呼吸困难  
C. 劳力性呼吸困难  
D. 心源性哮喘  
E. 急性肺水肿
27. 贫血最常见的临床表现是 ( )。
- A. 皮肤和黏膜苍白 B. 窦性心动过速 C. 反甲征 D. 食欲不振、腹胀 E. 心脏扩大
28. 脑血栓形成的临床表现不应出现 ( )。
- A. 抽搐 B. 脑脊液正常 C. 肢体瘫痪 D. 意识障碍 E. 脑膜刺激征
29. 某男性患者，因急性脑出血入院两天，连续睡眠 19 小时，期间呼之能醒，可进行简单对话，过后又很快入睡，此时病人处于 ( )。
- A. 浅昏迷状态 B. 嗜睡状态 C. 清醒状态 D. 昏睡状态 E. 深昏迷状态
30. 急性心肌梗死患者止痛治疗，遇到下列哪种情况下不能用吗啡 ( )。
- A. 呼吸抑制 B. 频发室性期前收缩 C. 心力衰竭 D. 神志欠清 E. 高龄患癫痫强直症
31. 癫痫强直痉挛发作时护理措施错误的是 ( )。
- A. 让病人平卧位  
B. 松解领扣和腰带  
C. 牙垫塞入上下磨牙之间  
D. 不能强力按压肢体
32. 脑出血最常见的病因是 ( )。
- A. 脑血管畸形  
B. 脑动脉炎  
C. 脑动脉瘤  
D. 高血压伴动脉硬化
33. 心前区疼痛常见于 ( )。
- A. 心血管神经官能症  
B. 急性心包炎  
C. 结核性干性胸膜炎  
D. 心绞痛、心肌梗死

31. 治疗风心病的根本方法是 ( )。
- 保护心功能
  - 改善心功能
  - 手术如二尖瓣分离术
  - 积极预防风湿活动
35. 十二指肠的好发部位是 ( )。
- 十二指肠降部
  - 十二指肠球部
  - 十二指肠水平部
  - 十二指肠升部
36. 最能提示急性出血坏死型胰腺炎的指标是 ( )。
- 低血脂
  - 血清淀粉酶显著提
  - 低血磷
  - 白细胞计数显著提高
37. 用三腔气囊管压迫止血过程中需定时放气, 一般间隔时间是 ( )。
- 每 8 小时
  - 每 12 小时
  - 每 24 小时
  - 每 36 小时
38. 治疗胃癌的首选方法 ( )。
- 化疗
  - 放疗
  - 手术治疗
  - 激光治疗
39. 肝硬化失代偿期最突出的临床表现是: ( )。
- 肝功能异常
  - 肝掌和蜘蛛痣
  - 腹水
  - 肝脾肿大
40. 急性出血坏死性胰腺炎的配合抢救措施错误的是: ( )。
- 快速静脉输液
  - 必要时测中心静脉压
  - 遵医嘱给升压药和地塞米松
  - 患者采取半坐卧位
41. 下列哪项是慢性肾炎患者必有的改变 ( )。
- 水肿
  - 高血压
  - 尿液改变
  - 血浆蛋白
42. 肾小球肾病的饮食治疗应给予 ( )。
- 高钠、低蛋白、高糖、高维生素饮食
  - 低钠、高蛋白、低糖、低维生素饮食
  - 低钠、高蛋白、高糖、高维生素饮食
  - 高脂肪、高蛋白、低糖、高维生素饮食
43. 护理少尿与无尿病人, 下列措施中最重要的是 ( )。
- 严格控制水、钾摄入
  - 卧床休息

- C. 保证饮食总热量
  - D. 预防感染
44. 护理尿路刺激征病人，错误的一项是（ ）。
- A. 多饮水，多进饮料
  - B. 卧床休息
  - C. 随时清洁尿道口
  - D. 避免应用阿托品类药物
45. 正常人一天的尿比重为（ ）。
- A. 1.010~1.020
  - B. 1.015~1.025
  - C. 1.020~1.030
  - D. 1.025~1.035

## 二、填空

1. 上消化道大量出血一般指数小时内失血量超过（ ）或循环血容量的（ ）。
2. 脑血栓的形成最常见的病因是（ ）。
3. 上消化道出血的特征性表现是（ ）和（ ）。
4. 心肺脑复苏包括（ ），（ ）和（ ）。
5. 采集动脉血作血气分析时须注意采血量不得少于（ ）ml，采集后将注射器来回搓滚（ ）秒，以防凝血，（ ）送检，须按压穿刺点（ ）分钟以上。
6. 痰液性状随病因不同而异，黄脓痰多为（ ），铁锈色痰见于（ ）。
7. 呼气性呼吸困难是指呼气费力，呼气时间（ ），常伴有哮鸣音，多见于（ ）、（ ）和喘息型慢性支气管炎。
8. （ ）是贫血最突出的体征。
9. 淡漠型甲亢多见于（ ）。

10. 成人窦性心律的频率低于（ ），称为窦性心动过缓。

### 三、名词解释

1. 心律失常

2. 呼吸衰竭

3. 少尿：

4. COPD：

5. 尿路刺激征：

### 四、简答题

1. 简述左心衰竭最常见临床表现？

2. 胃溃疡和十二指肠溃疡腹痛有什么不同？

3. 传染病流行过程的 3 个基本条件是什么？

4. 癫痫持续状态的治疗处理原则是什么？

5. 呼吸衰竭氧疗遵循哪些原则？

6. 脑出血的护理要点是什么？

### 五、论述题

论述题试述心律失常的常用护理诊断及护理措施？



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/437030002123006041>