

内科护理模拟题库含答案

1、心力衰竭病人输液时滴速应控制在多少为宜

- A、15-30 滴/分钟
- B、30-40 滴/分钟
- C、40-50 滴/分钟
- D、60 滴/分钟
- E、80 滴/分钟

答案：A

2、患者，男性，60岁，双下肢水肿、肝大，颈静脉怒张、肝颈静脉回流征阳性，应考虑

- A、心肌炎
- B、慢性肾炎
- C、慢性肝炎
- D、左心功能不全
- E、右心功能不全

答案：E

3、不属于胃癌癌前疾病的是

- A、慢性萎缩性胃炎
- B、胃息肉
- C、残胃炎
- D、胃溃疡
- E、异型增生

答案：E

4、患者男，70岁。2年前诊断为慢性胃炎，由于病情反复，病程迁延。自述常因疾病造成心情焦虑，“常为小事发脾气”，对此，不恰当的回答是

- A、您认为是胃炎引起了您的焦虑吗？
- B、您不必为胃炎过于焦虑不安。
- C、您是因为胃炎可能癌变才觉得焦虑的吗？
- D、我们可以想办法避免那些让您生气的小事。
- E、我们可以想一些办法来缓解身心的不适

答案：C

5、张先生，45岁，上消化道出血，烦躁、尿少、面然苍白、四肢湿冷，血压 10.6/8.0kPa，出血量约在 700ml。上消化道出血多的病人应先用“生理盐水”快速静脉输入，其作用为

- A、维持胶体渗透压

- B、扩充血容量
- C、纠正酸中毒
- D、补充热量
- E、为输血做准备

答案：B

6、心衰病人的护理，下列哪项是错误的

- A、根据心功能情况决定休息时间和方式
- B、给予低盐易消化饮食
- C、保持大便通畅，嘱患者勿用力大便
- D、严重左心衰竭者，应立即取平卧位休息
- E、控制静脉补液速度

答案：D

7、肺癌远处转移引起的症状是

- A、肝大、黄疸、腹水
- B、肥大性骨关节病
- C、肺上沟癌
- D、库欣综合症
- E、上腔静脉阻塞综合症

答案：A

8、护士对于心力衰竭控制后扩张型心肌病病人的健康教育不正确的是

- A、注意观察病情变化，症状加重时及时就医
- B、长期休息，适当限制体力活动
- C、加强锻炼和体力活动，增加活动耐力
- D、避免诱发因素
- E、坚持药物治疗

答案：C

9、诊断主动脉瓣关闭不全最重要的体征是

- A、心界扩大呈靴形
- B、主动脉瓣区第二音减弱
- C、心前区抬举性搏动
- D、周围血管征
- E、主动脉瓣第二听诊区闻及舒张期杂音

答案：E

10、肝性脑病患者前驱期的突出和主要表现为

- A、精神异常

- B、定向力减退
- C、性格和行为异常
- D、时空概念紊乱
- E、扑翼样震颤

答案：C

11、静脉注射氨茶碱速度要慢，否则可出现

- A、皮肤潮红、头痛、恶心
- B、心律失常、血压下降
- C、四肢麻木、腰酸背痛
- D、支气管痉挛，喉头水肿
- E、耳鸣和高血压

答案：B

12、急性心包炎早期表现中具有诊断价值的是

- A、发热
- B、血压下降，脉压减小
- C、心包摩擦音
- D、呼吸深大
- E、胸痛

答案：C

13、患者男，59岁。患高血压12年，去年因急性下壁心肌梗死住院治疗20天。近一年来血压常为180/115mmHg左右。高血压患者的非药物治疗方法中，不包括的是

- A、根据自身情况适当运动
- B、合理膳食：限制钠盐摄入，减少膳食脂肪，限制饮酒
- C、减少精神压力
- D、减少摄入含钾食物
- E、减轻体重

答案：D

14、患者女性，35岁。风心病，二尖瓣狭窄并关闭不全，心功能II~III级，心房颤动，口服地高辛控制心室率。今早突然心慌、心悸，心跳加快，选用利尿剂时宜选

- A、氨苯蝶啶
- B、速尿
- C、氢氯噻嗪
- D、丁脲胺

E、环戊甲噻嗪

答案：B

15、患者女性，50岁，以突然寒战，高热、咳嗽咳痰入院，诊断为肺炎球菌肺炎，请问肺炎球菌肺炎实变期患者的痰液呈

A、粉红色乳状痰

B、脓性泡沫痰

C、脓臭痰

D、红棕色黏稠胶冻状痰

E、铁锈色

答案：E

16、根本性解决风湿性心脏瓣膜病的手段是

A、人工瓣膜置换术

B、抗风湿治疗

C、并发症治疗

D、介入治疗

E、抗凝治疗

答案：A

17、患者男性，34岁，常常在晨起及晚间躺下时咳大量脓痰，伴少量咯血。临床确诊为支气管扩张症，对此病人的治疗不包括

A、积极控制感染

B、体位引流排痰

C、利尿治疗

D、大咯血时给予垂体后叶素止血

E、痰黏稠不易咳出时可雾化吸入

答案：C

18、患者，女性，53岁，患高血压病8年，近半个月来间断发生胸骨后或心前区疼痛，持续3~5分钟，休息后可缓解。经入院检查确诊为心绞痛，责任护士讲解硝酸甘油的用药知识，以下不妥的是

A、首次应卧位或坐位服药，以防发生体位性低血压

B、该药应舌下含服，不可吞服或嚼服

C、该药可扩张外周血管，减轻心脏负荷

D、常见不良反应有头面部皮肤潮红、搏动性头痛等

E、出现不良反应需立即停药

答案：E

19、与消化性溃疡发生关系密切的细菌是

- A、链球菌
- B、霍乱弧菌
- C、幽门螺杆菌
- D、痢疾杆菌
- E、大肠埃希菌

答案：C

20、慢性呼吸衰竭时临床上不可见

- A、呼吸困难
- B、发绀
- C、脑出血
- D、精神、神经症状
- E、心率加快

答案：C

21、急性左心衰发生时，病人需采取的体位是

- A、平卧位
- B、头高脚位低
- C、头高脚高位
- D、半卧位
- E、坐位，两腿下垂

答案：E

22、下列药物中均为幽门螺杆菌的治疗方案药物的是

- A、奥美拉唑+克拉霉素+阿莫西林+枸橼酸铋钾
- B、红霉素+奥美拉唑+阿莫西林+枸橼酸铋钾
- C、硫酸镁+奥美拉唑+克拉霉素+枸橼酸铋钾
- D、多潘立酮+奥美拉唑+克拉霉素+枸橼酸铋钾
- E、青霉素+克拉霉素+甲硝唑+枸橼酸铋钾

答案：A

23、扩张型心肌病病人心脏结构最基本的改变是

- A、室间隔肥厚
- B、心室容积变少
- C、单侧或双侧心腔扩大
- D、左心室肥厚
- E、右心室流出道梗阻

答案：C

24、病人，男性，14岁。自幼有哮喘史，白天因参加学校组织的游园活动，回家后感胸闷、呼吸困难逐渐加重，自服氨茶碱不见缓解。到医院急诊拟诊为支气管哮喘。根据病情目前应采取的首要护理措施为

- A、遵医嘱使用支气管扩张剂和湿化吸氧
- B、卧床休息
- C、解释病情，消除紧张情绪
- D、观察并发症
- E、鼓励多进食

答案：A

25、肺心病急性加重期的治疗关键是

- A、低流量吸氧
- B、利用呼吸机改善呼吸功能
- C、强心、利尿
- D、纠正电解质紊乱
- E、极控制感染、解除支气管痉挛、改善通气功能

答案：E

26、消化性溃疡的主要症状是

- A、腹痛
- B、恶心、呕吐
- C、营养不良
- D、贫血
- E、便血

答案：A

27、男，78岁，吸烟患者。反复咳嗽、咳痰、气喘40年，近1周来咳黄痰，且黏稠不易咳出，白天嗜睡。夜间不眠，今晨被发现唤之不醒而急诊。查体：BP148/90mmHg，昏睡状，瞳孔等大。球结膜水肿。颈软。桶状胸，双肺可闻及较多干、湿啰音，心率120次/分，可闻及早搏。双下肢凹陷性水肿，未引出病理反射。对该病人首选的治疗措施是

- A、使用利尿剂
- B、使用祛痰药物
- C、持续低浓度吸氧
- D、使用支气管扩张剂
- E、气管插管或气管切开

答案：E

28、肺心病患者处于肺、心功能失代偿期，其主要临床表现是

- A、呼吸困难
- B、咯血
- C、胸闷、胸痛
- D、休克
- E、呼吸衰竭与心力衰竭

答案：E

29、下面对于心绞痛患者的用药指导，不妥的是

- A、坚持服用预防心绞痛发作的药物
- B、运动和情绪激动前含服硝酸甘油，预防发作
- C、随身携带硝酸甘油片
- D、硝酸甘油应避光保存，放置在固定地点
- E、每年更换一次药物

答案：E

30、女，56岁，胆石症病史10年。上腹部剧痛伴呕吐。疑为急性胰腺炎，其治疗措施，下列错误的是

- A、抗感染
- B、应用生长抑素
- C、应用胰酶抑制剂
- D、应用吗啡止痛
- E、应用抗胆碱药物

答案：D

31、患者男，65岁。有肺心病史6年，1咳嗽加重，气促加重。查体示：肺气肿体征。查血气：pH7.30，PaCO₂50mmHg，PaO₂60mmHg，应如何指导病人改善缺氧

- A、持续吸入高浓度氧
- B、持续吸入低浓度氧
- C、间歇吸入纯氧
- D、间歇吸入高浓度氧
- E、呼气末正压呼吸

答案：B

32、患者女性，36岁，间断发作下腹部疼痛伴腹泻2年，每天排便3~4次，为脓血便，常有里急后重，排便后疼痛缓解。该患者最可能的诊断是

- A、慢性腹泻
- B、阿米巴脓肿
- C、肠结核

D、肠易激综合征

E、溃疡性结肠炎

答案：E

33、确定病人有无呼吸衰竭，以下最有价值的是

A、血常规

B、肺功能检查

C、胸部 X 线

D、肺部 CT

E、动脉血气分析

答案：E

34、结核菌素试验阴性可见于

A、重症结核病

B、严重营养不良

C、用免疫抑制剂

D、上都正确

E、以上都不对

答案：D

35、长期服用噻嗪类利尿剂的慢性心力衰竭病人，最常出现的不良反应是

A、低钾血症

B、高钾血症

C、低钠血症

D、高钠血症

E、氮质血症

答案：A

36、男，43岁。大量饮酒致急性水肿型胰腺炎，对其采取的处理措施哪项不妥

A、抗胆碱药物

B、腹痛严重者给予吗啡

C、胃肠减压

D、应用抗生素

E、静脉补液

答案：B

37、患者女性，34岁。诊断“急性心肌梗死”住院治疗，护士嘱患者注意避免便秘和用力排便，目的是为了防止

A、心脏骤停

- B、晕厥
- C、心脏扩大
- D、血管破裂
- E、脑血栓形成

答案：B

38、护士为社区的慢性阻塞性肺疾病患者进行呼吸训练的指导时，应指导患者吸气与呼气时间比最好控制在

- A、吸气：呼气=2:1
- B、吸气：呼气=1.5:1
- C、吸气：呼气=1:1.5
- D、吸气：呼气=1:2
- E、吸气：呼气=1:2.5

答案：D

39、肺心病心力衰竭时可出现以下常见症状和体征，除了

- A、咳粉红色泡沫状痰
- B、颈静脉怒张
- C、水肿
- D、尿少
- E、肝肿大和压痛

答案：A

40、肺结核病人发热的最典型热型是：

- A、稽留热
- B、弛张热
- C、波浪热
- D、间歇热
- E、午后低热

答案：E

41、某病人6分钟走了500m，出现心悸、气急。考虑该病人心功能等级为

- A、I级
- B、II级
- C、III级
- D、IV级
- E、V级

答案：B

42、选用下列哪种药物时，最需密切观察血压变化

- A、利多卡因
- B、奎尼丁
- C、洋地黄
- D、多巴酚丁胺
- E、硝普钠

答案：E

43、患者，女性，63岁，肺气肿多年。近日因咳嗽、咳痰、气急、精神恍惚、发绀而入院。动脉血气分析：pH7.3，PaO₂ 50mmHg，PaCO₂60mmHg。护理评估该患者的首优护理问题是

- A、气体交换受损
- B、营养缺乏：低于机体需要量
- C、清理呼吸道无效
- D、有组织完整性受损的危险
- E、体液不足

答案：A

44、急性心肌梗死患者，鼓励其24小时内开始在床上做四肢的轻微活动，是为了

- A、预防压疮
- B、增加消化功能
- C、避免肌肉萎缩
- D、防止血栓形成
- E、促进心功能恢复

答案：D

45、治疗肝性脑病正确的措施有

- A、高蛋白饮食
- B、肥皂水清洁灌肠
- C、静注多巴胺
- D、进粗糙食物
- E、谷氨酸钾静脉滴注

答案：E

46、急性纤维蛋白性心包炎常见的临床症状是

- A、心力衰竭
- B、发绀
- C、心包摩擦音
- D、心前区疼痛

E、腹水

答案：D

47、三腔二囊管放置 24 小时后，需放气并放松牵引的目的是

A、防止胃受压

B、避免胃扩张

C、暂时解除胃底贲门受压

D、证实出血是否停止

E、预防囊壁和胃黏膜粘连

答案：C

48、胸部 X 线检查心影呈梨形提示

A、心包积液

B、三尖瓣关闭不全

C、二尖瓣关闭不全

D、二尖瓣狭窄

E、主动脉瓣狭窄

答案：D

49、流行性感冒传染性最强的时间是

A、病后 1~7 天

B、病初 2~3 天

C、病后 4~5 天

D、潜伏期

E、恢复期

答案：B

50、患者女性，37 岁。因风心病需口服地高辛治疗。护士在给药前首先需注意

A、心肌酶变化

B、询问有无恶心、呕吐，听心率、心律

C、加用钙剂

D、测量体温

E、观察呼吸节律

答案：B

51、患者，男性，27 岁，咳血痰 2 天，今日咯血 300ml。数年前有类似情况，平时无明显咳嗽、咳痰。体检：体温 37.7℃，胸廓和呼吸运动正常，肺部听诊右肩胛下局限性少量湿啰音，首先考虑的情况是

A、慢性支气管炎

- B、支气管哮喘
- C、肺炎
- D、肺结核
- E、支气管扩张症

答案：E

52、女性，45岁。上腹部饱胀，隐痛不适，反酸暖气、食欲不振，恶心、查体：上腹部有轻度压痛。肝脾未触及。可能的诊断为

- A、慢性胃炎
- B、急性胃炎
- C、慢性胃溃疡
- D、慢性十二指肠溃疡
- E、慢性胰腺炎

答案：A

53、某慢性心功能不全患者表现为夜间阵发性呼吸困难、尿量减少等症状，给予药物治疗后，上述症状好转，但是出现心慌、恶心、呕吐、食欲不振、头晕、头痛、黄视、视物模糊等，应考虑为

- A、慢性心功能不全症状反复
- B、利尿剂的副作用
- C、洋地黄类药物中毒
- D、扩血管药物的不良反应
- E、洋地黄药物用量不足

答案：C

54、某老年男性，呼吸衰竭，近日呼吸困难加重，并出现头痛、头胀、日轻夜重，昼睡夜醒，伴局限性肌群抽搐、神志恍惚等，应考虑病人发生了

- A、A
- B、肺性脑病
- C、脑梗塞
- D、脑疝
- E、脑瘤

答案：B

55、肺心病病人，为使肺动脉压力降低，减轻右心负荷，最好的治疗措施是

- A、呋塞米
- B、限制钠盐摄入
- C、吸氧以改善缺氧状态

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/476151115120010045>