

妇产科复习题（附参考答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、某孕妇，孕 39 周，孕妇产于胎动时感觉腹痛，检查时发现宫高、腹围小于同期正常妊娠孕妇，子宫的敏感度较高，轻微的刺激即可引起宫缩，临产后阵痛剧烈，宫缩不协调，宫口扩张缓慢，产程延长。临床诊断为羊水过少。关于羊水过少，下列说法正确的是

- A、多发于妊娠早期
- B、容易发生胎儿宫内窘迫
- C、羊水过少者宫高、腹围增长迅速
- D、羊水性质不黏稠、不浑浊
- E、羊水量少于 500ml

正确答案：B

2、自月经周期第 5 天起，每晚服 1 片，连服 22 天不间断，若漏服必须于次晨补服。这种服用方法的避孕药是指

- A、长效口服避孕药
- B、左炔诺孕酮三相片
- C、探亲避孕药
- D、外用避孕药
- E、复方短效口服避孕药

正确答案：E

3、关于孕激素治疗功血的说法正确的是

- A、也称“子宫内膜修复法”
- B、可迅速提高体内性腺激素水平
- C、促使子宫内膜生长
- D、使子宫内膜由增生期转化为分泌期
- E、适用于青春期功血患者

正确答案：D

4、妊娠合并心脏病者，心功能III级的诊断标准是

- A、不能胜任任何体力活动
- B、休息状态下即出现心力衰竭症状
- C、体力活动明显受限
- D、心脏扩大
- E、一般体力活动稍受限制

正确答案：C

5、第一产程的临床表现，错误的是

- A、肛查发现胎先露逐渐下降
- B、胎头拨露
- C、宫口近开全时胎膜破裂
- D、宫口扩张
- E、宫缩持续时间渐长，收缩力不断增强，间歇时间缩短

正确答案：B

6、王女士，34岁，初产妇，心功能Ⅱ级，现孕38周，自然临产。该产妇在分娩期正确的护理措施是

- A、严密观察产程进展，防止心力衰竭发生
- B、胎盘娩出后，腹部放置10kg沙袋
- C、延长第二产程
- D、产后立即肌注麦角新碱
- E、常规低流量吸氧

正确答案：A

7、孕12周末宫底可达

- A、平脐
- B、脐耻之间
- C、脐上2指
- D、耻骨联合上2~3指
- E、脐下3指

正确答案：D

8、患者，女性，28岁。高处骑跨式摔落，外阴受伤，自诉疼痛难忍，体检发现外阴血肿，最可能的损伤部位是

- A、小阴唇
- B、前庭大腺
- C、处女膜
- D、阴蒂部
- E、大阴唇

正确答案：E

9、30岁，初产妇，妊娠38+5周，规律宫缩5小时，枕左前位，估计胎儿体重3000g，胎心136次/分。阴道检查：宫口开大3cm，未破膜，S+1，骨盆外测量未见异常。待产第11小时，宫缩逐渐减弱，胎膜已破，宫口开大8cm，此时恰当的处理是

- A、调整宫缩节律
- B、静脉注射麦角新碱
- C、静脉滴注缩宫素
- D、合理使用腹压
- E、立即行剖宫产术

正确答案：C

10、第二产程后胎心听诊的频率为

- A、25 分钟
- B、3 分钟
- C、15 分钟
- D、10 分钟
- E、1 小时

正确答案：D

11、某产妇，30 岁，胎儿娩出后，短时间内产妇突然出现烦躁不安、寒战、呕吐、咳嗽、呼吸困难、发绀，首先应考虑

- A、脑血管意外
- B、产后感染
- C、先兆子痫
- D、癫痫
- E、羊水栓塞

正确答案：E

12、李女士的月经周期可以被描述成 13，3~5/29 天，末次月经是在 2011 年 6 月 30 日。她的初潮年龄是

- A、13 岁
- B、3~5 岁
- C、30 岁
- D、24 岁
- E、29 岁

正确答案：A

13、阴道灌洗时碳酸氢钠的适宜浓度为

- A、0.04
- B、0.075
- C、0.06
- D、0.005

E、0.1

正确答案：A

14、初产妇，25岁，顺产第3天，以下表现异常的是

- A、体温 36.8℃
- B、哺乳时有轻微宫缩痛
- C、分泌的乳汁少
- D、多汗
- E、子宫底脐平

正确答案：E

15、子宫内膜脱落不全患者诊刮取内膜活检的时间为

- A、月经干净后 3 天
- B、月经期第 5 日
- C、月经来潮 6 小时内
- D、两次月经之间
- E、月经期来潮前 1 天

正确答案：B

16、有关孕期检查的四步触诊法，下列错误的是

- A、第三步是双手置于耻骨联合上方，判断先露部为头还是臀
- B、第二步是双手分别置于腹部两侧，辨别胎背及胎肢的方向
- C、第四步是双手向骨盆入口方向插入，进一步检查先露部，并确定入盆程度
- D、第一步是双手置于子宫底部了解宫底高度，并判断是胎头还是胎臀
- E、可以了解子宫的大小、胎先露、胎方位

正确答案：A

17、张女士，第一胎，足月顺产，当胎儿娩出后，记阴道出血约 500ml，血液呈鲜红色，很快凝集成血块，此时胎盘尚未娩出，根据上述情况，考虑出血的原因最大可能是

- A、宫缩乏力
- B、胎盘残留
- C、软产道损伤
- D、胎盘滞留
- E、凝血功能障碍

正确答案：C

18、与子宫肌瘤发病相关的因素有

- A、体内雌激素水平过高
- B、高血压、糖尿病、肥胖
- C、饮食环境
- D、环境因素
- E、早婚早育、性生活紊乱

正确答案：A

19、孕妇，36岁，孕2产0，妊娠35周，1年前因妊娠5个月死胎而作引产术。产前检查：血压130/80mmHg，宫高36cm，胎心率140次/分，空腹血糖7mmol/L，尿糖(+)。该产妇足月分娩的新生儿，以下哪项处理措施不必要

- A、注意新生儿有无低血钙
- B、注意新生儿有无反应性低血糖
- C、按早产儿的护理原则护理
- D、给予早期哺乳
- E、经鼻气管插管加压给氧

正确答案：E

20、王某，28岁，经产妇，妊娠37周，以“阴道无痛性多量流血5小时”为主诉急诊入院。查体示：血压80/60mmHg，脉搏110次/分。无宫缩，宫底在剑突下2横指，臀先露，胎心率90次/分，骨盆外测量正常。针对该患者最恰当的处理是

- A、密切随访观察
- B、静滴缩宫素
- C、立即剖宫产
- D、立即人工破膜
- E、外转胎位术

正确答案：C

21、王女士，现孕30周，长时间仰卧后，出现血压下降、头晕、心悸等症状，分析导致这些症状的主要原因是

- A、脉率增快
- B、脉压增大
- C、回心血量增加
- D、回心血量减少
- E、脉压减少

正确答案：D

22、绝经后期的表现应除外

- A、性功能减退
- B、阴道分泌物增多
- C、易导致膀胱炎
- D、阴道黏膜变薄
- E、生殖器官萎缩

正确答案：B

23、骨盆入口前后径短，横径正常者，属于

- A、均小骨盆
- B、扁平骨盆
- C、漏斗骨盆
- D、男性骨盆
- E、畸形骨盆

正确答案：B

24、慢性宫颈炎的典型临床表现是

- A、外阴灼热感
- B、外阴瘙痒
- C、白带增多
- D、外阴疼痛
- E、外阴湿疹

正确答案：C

25、孕妇，孕 34 周，因妊娠高血压综合征入院。该综合征最基本的病理变化是

- A、胎盘供血不足
- B、水、钠潴留
- C、蛋白尿
- D、弥散性血管内凝血
- E、全身小动脉痉挛

正确答案：E

26、慢性宫颈炎的典型症状是

- A、白带增多
- B、外阴瘙痒有灼热感
- C、凝乳状白带
- D、泡沫状白带

E、下腹坠胀

正确答案：A

27、某孕妇，孕 14 周，在安胎治疗中，突然阴道流血、腹痛加剧。妇查：宫口已开，可见胚胎组织堵塞在宫颈口。应属流产的哪一阶段？

A、感染性流产

B、胎死宫内

C、先兆流产

D、难免流产

E、不全流产

正确答案：D

28、下列哪项是滴虫性阴道炎治愈的标准

A、月经干净后复查，连续 3 次复查滴虫为阴性

B、月经干净后复查，连续 4 次复查滴虫为阴性

C、月经干净后复查，连续 5 次复查滴虫为阴性

D、月经干净后复查，滴虫为阴性

E、月经干净后复查，连续 2 次复查滴虫为阴性

正确答案：A

29、孕妇，36 岁，孕 29 周，因乘坐公交车受到挤压，出现下腹部突发性持续疼痛，无阴道流血。首先应考虑

A、妊娠合并急性阑尾炎

B、妊娠合并急性胆囊炎

C、腹部外伤导致子宫破裂

D、站立过久导致胎盘早剥

E、腹部外伤导致胎盘早剥

正确答案：E

30、协调性子宫收缩乏力的主要特征是

A、宫缩时手按宫底部可出现凹陷

B、宫缩间歇期宫底部不能完全松弛

C、宫缩失去对称性和极性

D、产妇疼痛难忍

E、出现子宫痉挛性狭窄环

正确答案：A

31、某妇女流产后出现月经不调，表现为月经周期正常，经期延长，伴下腹坠胀、乏力，疑诊黄体萎缩不全。下列支持该诊断的是

- A、经期伴下腹坠胀
- B、育龄妇女
- C、用药后效果不佳
- D、周期正常，经期延长
- E、月经不规则

正确答案：D

32、分娩时最主要的产力是

- A、子宫收缩力
- B、肛提肌收缩力
- C、膈肌收缩力
- D、腹腔的压力
- E、腹肌收缩力

正确答案：A

33、患者，女，40岁，确诊为重度宫颈糜烂，拟行宫颈电烙术。下列健康教育内容哪项不正确

- A、有急性生殖器炎症者禁忌行电烙术
- B、术后需用抗生素预防感染
- C、若有发热，应暂时取消电烙术
- D、术后禁止性生活6个月
- E、治疗前应常规做宫颈刮片行细胞学检查

正确答案：D

34、患者25岁，急产，胎儿娩出后产妇突然发生呼吸困难，紧张，迅速出现循环衰竭、休克及昏迷。该孕妇最大可能出现了

- A、休克
- B、虚脱
- C、子痫
- D、心力衰竭
- E、羊水栓塞

正确答案：E

35、患者，女，34岁，葡萄胎二次清宫后2个月，阴道不规则流血持续存在，尿HCG阳性，B超检查发现子宫肌呈蜂窝样改变。应考虑患者可能为

- A、子宫内膜癌
- B、侵蚀性葡萄胎

- C、子宫肌瘤
- D、绒癌
- E、胎血部位滋养细胞肿瘤

正确答案：B

36、患者，女性，28岁，葡萄胎确诊，首选治疗方案是

- A、子宫切除
- B、预防性化疗
- C、清宫术
- D、定期随访
- E、放疗为主

正确答案：C

37、某妇女因会阴部奇痒无比前来就诊，检查发现阴道有大量白色稠厚豆渣样白带。该患者想知道该病的诱发因素，则下列不正确的为

- A、长期使用抗生素
- B、长期口服避孕药
- C、妊娠
- D、糖尿病
- E、月经

正确答案：E

38、有关宫缩乏力性产后出血的临床表现，下列正确的是

- A、宫体较软，宫底不硬
- B、胎盘未剥离前即出血不止，多伴有第三产程延长
- C、宫缩时出血量增多
- D、血色暗红无凝块
- E、胎儿娩出后即见血液不断流出

正确答案：A

39、某初产妇，从分娩后第2天起，持续3天体温在37.5℃左右，查体：子宫收缩好，无压痛，会阴伤口无红肿、疼痛，恶露淡红色，无臭味，双乳肿胀有硬结。推测其发热的原因最可能是

- A、产褥感染
- B、会阴伤口感染
- C、乳腺炎
- D、上呼吸道感染
- E、乳汁淤积

正确答案：E

40、患者，女性，62岁。诉阴道口有一肿物脱出1年余，医生诊断为子宫脱垂。护理评估生育史4-0-1-3，有难产史。考虑该患者导致子宫脱垂的最主要原因是

- A、排便困难
- B、分娩损伤
- C、慢性咳嗽
- D、雌激素水平下降
- E、盆底组织萎缩退化

正确答案：B

41、某产妇，30岁，产前检查被诊断为慢性乙型肝炎。4小时前自然临产，护士对她进行了分娩期护理和健康指导。为了防止新生儿感染乙型肝炎，下列健康指导和护理措施中不正确的是

- A、指导家属人工喂养新生儿
- B、积极给新生儿免疫接种乙型肝炎疫苗
- C、尽早进行母婴同室管理
- D、新生儿应隔离4周
- E、注意不得使用雌激素回奶

正确答案：C

42、王女士，25岁，G1P0，现孕39+2周，腹部阵痛6小时入院。产科检查：骨盆外测量正常范围，宫高32cm，腹围96cm，胎方位LOA，宫缩30~40秒/3~4分钟，胎心率142次/分，肛查宫口开大4cm，产妇很紧张，不停喊叫疼痛，多次询问能不能顺产。以下关于产程图的说法哪项是错误的

- A、产程图横坐标为临产时间，纵坐标为宫缩程度
- B、产程图横坐标为临产时间，纵坐标为宫口扩张程度
- C、产程图右侧为先露部下降程度
- D、产程图有利于细致观察产程
- E、产程图绘成两条曲线，分别为宫口扩张曲线和胎头下降曲线

正确答案：A

43、会阴侧切时可能损伤到的盆底肌肉是

- A、会阴深横肌，会阴浅横肌，坐骨海绵体肌
- B、会阴浅横肌，球海绵体肌
- C、会阴深横肌，球海绵体肌，耻骨尾骨肌

D、会阴深横肌，坐骨海绵体肌

E、会阴深横肌，耻骨尾骨肌

正确答案：C

44、孕妇陈某，28岁，G1/P0，孕39周，未经产前检查，诉下肢水肿半月，近3日头痛，今晨头痛加重，出现视物不清，且呕吐3次，查尿蛋白2.5g/24h。若测血压150/100mmHg，该患者可能的问题是

A、轻度子痫前期

B、重度子痫前期

C、妊娠合并慢性肾炎

D、妊娠期高血压

E、妊娠合并原发性高血压

正确答案：B

45、产褥病率是指

A、产后24小时至10天内每4小时用口表测体温1次，有连续2次达到或超过38℃

B、产后12天每4小时测体温1次，有2次体温达到或超过38℃

C、产后12小时后每4小时测体温1次，体温2次达到或超过38℃

D、产褥期内2次体温达到或超过38℃

E、产后每4小时测体温1次，有2次体温达到38℃

正确答案：A

46、缺铁性贫血占妊娠期贫血的

A、0.5

B、0.75

C、0.85

D、0.65

E、0.95

正确答案：E

47、患者，女性，29岁，妊娠7个月。产前检查的尿液化验结果提示尿糖(+++)，血标本检查结果示空腹血糖7.5mmol/L，餐后2小时血糖16.4mmol/L，诊断为妊娠期糖尿病。护士告诉患者如果治疗中出现极度乏力、出冷汗、头昏、心悸等，最有可能发生的情况是

A、低血糖反应

B、高血糖反应

C、糖尿病酮症酸中毒

D、急性左心衰竭

E、妊娠高血压

正确答案：A

48、协调性子宫收缩乏力时，孕妇宫缩小于

A、3次/10分钟

B、5次/10分钟

C、4次/10分钟

D、1次/10分钟

E、2次/10分钟

正确答案：E

49、下列有关胎膜早破的说法，哪项不正确

A、可导致早产率增加

B、指临产前胎膜自然破裂

C、是少见的分娩期并发症

D、对妊娠和分娩均不利

E、使产褥感染率增加

正确答案：C

50、孕妇，28岁，孕38周，头痛，呕吐伴自觉胎动减少一天来院。血压180/110mmHg，尿蛋白(+++)，胎心130次/分。还需做的检查不恰当的是

A、肝肾功能测定

B、测血细胞比容和血黏度

C、测凝血功能

D、腹部CT检查

E、测全血细胞计数

正确答案：D

51、患者，女性，28岁，妇科检查：阴道、子宫未见异常，左侧附件可触及5cm×6cm×7cm囊性包块，表面光滑，活动良好。该患者首先考虑的疾病是

A、卵巢良性肿瘤

B、卵巢内膜样癌

C、卵巢转移性肿瘤

D、异位妊娠

E、子宫内膜异位症

正确答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/487030006165006036>