

# 2022 年河南省濮阳市全科医学（中级）专业知识

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(30 题)

1.某校食堂数十人进食海虾后 6 小时，陆续出现上腹部疼痛，大便为水样或血水样。你认为最可能的诊断是

A.肉毒菌食物中毒 B.葡萄球菌肠毒素食物中毒 C.副溶血性弧菌食物中毒 D.变形杆菌食物中毒 E.沙门菌食物中毒

2.某地出生男婴数除以出生女婴数是

A.出生性别比 B.男婴构成比 C.女婴构成比 D.男婴出生率 E.女婴出生率

3.若炎性肠病患者合并糖尿病，其治疗应选择

A.甲硝唑 B.质子泵抑制剂 C.雷尼替丁 D.免疫抑制剂 E.肾上腺皮质激素

4.最常伴发急性左心功能衰竭的疾病是

A.肺梗死 B.室间隔缺损 C.肺动脉瓣狭窄 D.急进性高血压 E.主动脉窦瘤破裂入右心室

5.结合流行病学定义概括该学科的特征有

A.

群体特征、分布为起点特征、对比特征、概率论和数理统计学特征、社会医学特征、预防为主特征

B.预防为主特征、分布特征、概率论特征、实用性特征、评价特征、对比特征

C.预防为主特征、描述特征、人群分布特征、宏观特征、多因论特征理论特征

D.测量特征、概率论特征、数理特征实用特征、随机特征、观察性特征

E.方法学特征、实用性特征、评价特征、对照特征、多学科特征、数理统计特征

6.患者，女性，35岁。发现晨起眼睑水肿2年，腰酸。体格检查BP 167/93mmHg 双踝部凹陷性水肿。血红蛋白 101g/L，尿常规：蛋白(++)，红细胞 10~15个/HP,白细胞 0~3个/HP,24小时尿蛋白定量 1.8g,血浆白蛋白 34g/L,血 Cr133.8umol/L,BUN 10.5mmol/L。最可能的诊断是  
A.缺铁性贫血 B.急性肾小球肾炎 C.慢性肾小球肾炎 D.肾病综合征 E.原发性高血压

7.患者，男性，20岁。奔跑后出现呼吸困难、喘憋。查体：双肺布满哮鸣音。最可能的诊断是

A.急性支气管炎 B.上呼吸道感染 C.运动性哮喘 D.心源性哮喘 E.气胸

8.下一部应进行

A.A.继续服药治疗 12 周 B.加用抗 Hp 药物 C.纤维胃镜检查 D.X 线钡餐复查 E.手术治疗

9.在治疗结肠 Crohn 病患者，首选

A.考来烯胺 B.阿托品 C.硫唑嘌呤 D.柳氮磺胺吡啶 E.肾上腺糖皮质激素

10.上呼吸道感染的治疗原则不正确的是

A.一般治疗，休息，多喝水  
B.注意呼吸道隔离  
C.预防并发症  
D.对症治疗：高热给予退热治疗，高热抽搐，给予镇静、止惊等处理  
E.早期积极使用抗生素

11.桡神经深支损伤有

A.腕下垂 B.掌指关节不能主动伸直，拇指不能外展 C.两者均有 D.两者均无

12.男，52 岁，便血 3 个月，为鲜红色，不伴肛门及下腹疼痛，无大便习惯改变接诊首选检查是

A.A.便常规及大便隐血 B.肛门镜检查 C.乙状结肠镜检查 D.钡灌肠 E.纤维结肠镜检查

13.关于慢性肾炎，下述哪项说法正确

- A.多数患者无急性肾炎病史
- B.多数由急性肾炎发展而来
- C.多数是致病菌侵犯肾小球所致
- D.多数因治疗不当或贻误治疗而引起
- E.多数由链球菌感染而发病

14.下列哪一项不是治疗肝硬化腹水治疗必须遵循的原则

- A.腹水患者必须限制钠、水的摄入
- B.留钾利尿剂和排钠利尿剂并用
- C.服用呋塞米利尿时应补充氯化钾
- D.腹水减退后，仍需限制钠的摄入
- E.快速利尿消退腹水可促使病情缓解

15.诊断溶血最可靠的指标是

- A.网织红细胞比例升高
- B.血清结合珠蛋白减少
- C.红细胞寿命缩短
- D.骨髓幼红细胞显著增生
- E.外周血中出现少量幼红细胞

16.甲状腺危象时，首先选用的药物是

- A.心得安
- B.甲基硫氧嘧啶
- C.丙基硫氧嘧啶
- D.碘化钠静脉滴注
- E.氢化可的松静脉滴注

17.下列症状属自主神经功能失调引起的是( )

- A.眼球震颤、尿频、视力障碍、抽搐、意识模糊
- B.头痛、头晕或眩晕、耳鸣
- C.异常兴奋、发热、出汗、口干、皮肤潮红、手足震颤
- D.以上都不是

18.有利于急性肾小球肾炎诊断的血液生化改变是

- A.血浆蛋白明显下降
- B.血清胆固醇升高
- C.抗链“O”滴度升高
- D.血清免疫球蛋白升高
- E.血清 C3 暂时下降

19.关于肾综合征出血热临床表现描述完全正确的是

- A.典型病例具有发热、休克和肾脏损害三大主要特征
- B.分为发热期、低血压休克期、肾衰竭期和恢复期四个阶段
- C.非典型和轻型病例可以出现越期现象
- D.重症患者可出现发热期、休克期和肾衰竭期之间相互重叠
- E.三痛是指头痛、肌肉痛、眼眶痛

20.甲氧西林金黄色葡萄球菌抗菌治疗首选

- A.苯唑西林
- B.去甲万古霉素
- C.第二、三代头孢菌素
- D.亚胺培南
- E.氟康唑

21.恶性贫血患者的治疗维持时间是

A.酌情停药 B.完全消失 C.无原发病 D.终生 E.半年到 1 年

22.患者，男性，20岁。因乏力、食欲下降、厌油、恶心1周，尿黄4天就诊。查体：血压120/75mmHg，皮肤及巩膜黄染，无蜘蛛痣，无明显肝掌，浅表淋巴结无肿大，腹平软，肝肋下1cm，轻度触痛，肝区叩击痛阳性，移动性浊音（-）。下列项目中暂不予考虑的检查是

A.甲肝抗体 B.乙肝两对半 C.肝功能检查 D.电子胃镜 E.腹部B超

23.下列不属于绞窄性肠梗阻特点的是

A.持续性剧烈腹痛 阵发性加重 B.早期出现休克 C.明显腹膜刺激征 D.胃肠减压抽出液为血性 E.X线检查示大、小肠充气扩张

24.作用于壁细胞H<sub>2</sub>受体，抑制胃酸和胃蛋白酶的分泌

A.甲氰咪胍 B.阿托品 C.前列腺素 D.吗丁啉 E.奥美拉唑

25.胃溃疡的好发部位是

A.胃窦大弯侧 B.胃窦小弯侧 C.胃体小弯侧 D.小弯胃角附近 E.胃底部

26.发热伴寒战最不常见于哪一项

A.大叶性肺炎 B.败血症 C.药物热 D.淋巴瘤 E.输血反应

27.不符合大肠癌的描述是

A.炎症性肠病为本病的高危因素

B.盲肠、升结肠癌最多见

- C.左半结肠癌易引起肠梗阻
- D.黏膜内癌可经结肠镜切除治疗
- E.CEA 测定有助于判定癌的预后估计与术后复发监测

28.以下属于二线抗结核药的是( )。

- A.利福平 B.丙硫异烟肼 C.吡嗪酰胺 D.乙胺丁醇

29.患者，男性，30岁。咳嗽1个月余，伴发热、痰中带血5天。胸片示：左肺上叶尖段片状阴影。诊断为左上肺浸润性肺结核。最需与哪种疾病鉴别

- A.癌性空洞伴感染 B.支气管炎 C.支气管扩张 D.肺脓肿 E.左上肺炎

30.隐性黄疸时，血清总胆红素含量为

- A.1.71 ~ 3.42 $\mu\text{mol/L}$
- B.5.13 ~ 6.84 $\mu\text{mol/L}$
- C.8.55 ~ 15.4 $\mu\text{mol/L}$
- D.17.1 ~ 34.2 $\mu\text{mol/L}$
- E.73.4 $\mu\text{mol/L}$

## 二、专业知识(10题)

31.AMI



病人半夜突然出现呼吸困难，咳粉红色泡沫痰，第一心音减弱，舒张期奔马律，心尖可闻及 2 级收缩期杂音，该患者诊断为

A.右心衰竭 B.室壁瘤 C.急性左心衰竭 D.支气管肺炎 E.心肌梗死后综合征

32.结核病最重要的传染源是

A.原发性肺结核患者 B.血行播散型肺结核患者 C.干酪性肺结核患者  
D.慢性纤维空洞性肺结核患者 E.浸润性肺结核患者

33.(87~88 题共用备选答案)

87. 发病率最高的甲状腺癌为

A.乳头状腺癌 B.未分化癌 C.滤泡状癌 D.髓样癌 E.腺瘤癌变

34.女，24 岁，多饮、多食 10 年，空腹血糖经常大于  $10.8\text{mmol/L}$ 。  
近 2 个月来眼睑及下肢轻度水肿，血压  $160/100\text{mmHg}$ ，尿蛋白(++)。  
最可能的诊断为

A.高血压病 B.糖尿病肾病 C.糖尿病合并肾盂肾炎 D.糖尿病合并膀胱炎  
E.糖尿病合并心功能不全

35.(83--85 题共用题干) 30 岁已婚女性，公司职员，发现明显消瘦 2 个月，近 1 个月进食增多，并感觉疲乏，常有心慌，怕热多汗，易激动而住院 体格检查最可能的发现是

A.紧张，消瘦，甲状腺结节性肿大，心率快，律不齐

B.精神萎靡，皮肤干燥，甲状腺弥漫性肿大，手颤

C.稍胖，皮肤色素脱失，心脏增大，心律齐

D.紧张，消瘦，眼突，甲状腺肿大，心率快

E.消瘦，皮肤结膜苍白，心率快，下肢肿

36.男性，40岁，反复出现胸骨后烧灼样疼痛，多在餐后1小时出现，卧位时症状加重。其最可能的诊断是

A.变异型心绞痛 B.反流性食管炎 C.慢性胆囊炎 D.慢性胰腺炎 E.慢性胃炎

37.一般认为在服毒后多长时间问内洗胃最佳

A.0~1h B.1~3h C.4~6h D.6~12h E.12~24h

38.再生障碍性贫血的主要诊断依据是

A.全血细胞减少 B.网织红细胞减少 C.骨髓检查 D.一般抗贫血治疗无效 E.无肝、脾、淋巴结肿大

39.关于乳腺癌，下列哪些说法正确

A.首先是一种全身性疾病

B.早期常表现为乳房无痛、质硬肿块

C.乳腺癌淋巴结转移最初多见于腋窝

D.根据病史和临床检查，多数乳房肿块可得出诊断

E.治疗以化疗和放疗为主

40.(67 ~ 68 题共用题干) 患者，男，52 岁。突然剧烈头痛后，短暂意识丧失，肢体抽搐，醒后仍剧烈头痛并呕吐，体检：T37°C，BP135 / 85mmHg，嗜睡，瞳孔右 6mm，左 3mm，右眼玻璃体下出血，肢体有自主活动，颈有抵抗。最可能的诊断是

A.癫痫 B.蛛网膜下腔出血 C.脑栓塞 D.脑膜炎 E.脑出血

### 三、共用题干单选题(5 题)

41.(题干)患者，男性，25 岁，不洁性接触后 3 天，尿道口发痒、红肿、疼痛，并有脓性分泌物。应做下列何种检查，以便及早治疗

A.尿常规，涂片查细菌，中段尿培养，菌落计数及药敏试验

B.尿道分泌物普通培养

C.膀胱镜检查+尿道分泌物培养结核菌

D.尿常规

E.血常规

42.应立即如何处置

A.强心、利尿、扩血管 B.使用泰能控制感染 C.上呼吸机 D.使用肝素

抗凝溶栓 E.积极内科治疗 12 ~ 24 小时无效应立即手术

43.进一步确诊需做的检查是

A.乳酸脱氢酶 B.血沉 C.反应蛋白 D.鼻咽镜 E.淋巴结活检

44.(题干)患者，男性。18岁，骑单车时被汽车撞倒，神志清，GCS

评分 15 分，右侧大腿痛，畸形，不能站立及行走，右下肢纵向叩击痛 (+)，踝关节活动好，双下肢皮肤感觉无特殊。此患者最可能的诊断是  
A.腰椎骨折 B.右股骨骨折 C.偏瘫 D.右胫骨骨折 E.右坐骨神经损伤

45.(题干)患者，男性，60 岁。慢性肺心病患者，近 10 余天来受凉后出现病情加重，神志欠清，发绀、躁动、痰不易咳出。双肺呼吸音低，可闻及干湿性啰音。白细胞计数及分类增高。为提供有效治疗，应首选以下哪项检查

A.痰培养 + 药敏 B.胸片 C.动脉血气分析 D.电解质测定 E.二氧化碳结合力测定

参考答案

1.C 副溶血性弧菌在含盐 3% ~ 4% 的食物中生长良好。常因食用海鱼、虾、蟹及贝类等海产品而引起副溶血性弧菌食物中毒。

2.A 出生性别比是指某一时期内出生男婴与女婴的数量之比的反映。其数值为每 100 名女婴对应的男婴数。

3.D

D。肾上腺皮质激素及免疫抑制剂对炎症性肠病有效，但肾上腺皮质激素可导致糖耐量减低，血糖升高，故炎症性肠病合并糖尿病的患者应选用免疫抑制剂治疗。

4.D

本题考点：伴发急性左心功能衰竭的疾病。引发急性左心功能衰竭的常见疾病：①与冠心病有关的急性广泛性前壁心肌梗死，乳头肌梗死断裂，室间隔破裂穿孔等；②感染性心内膜炎引起的瓣膜穿孔，腱索断裂所致瓣膜性急性反流；③高血压心脏病血压急剧升高，在原有心脏病的基础上出现快速性心律失常或严重缓慢性心律失常；④输液过多等。

5.A 流行病学的特征有群体特征、分布为起点特征、对比特征、概率论和数理统计学特征、社会医学特征和预防为主特征。

6.C

7.C 激烈运动是支气管哮喘常见诱因，该患者奔跑后出现呼吸困难，首先应考虑是否为突发自发性气胸，但查体双肺布满哮鸣音，不支持该诊断；其次考虑是否为心源性哮喘，该患者为年轻男性，无心血管基础病史，因此最可能的诊断为 C。

8.C

溃疡有良、恶性之分，应进一步行胃镜及组织病理检查明确溃疡性质。

9.D 结肠 Crohn 病患者治疗首选柳氮磺胺吡啶，激素适用于对柳氮磺胺吡啶疗效不佳者，中、重度活动者，对上述两药无效者使用免疫抑制剂如硫唑嘌呤。

10.E 病毒性上呼吸道感染无论轻重都不需要使用抗生素，更不需要预防使用抗生素，主要以对症支持治疗为主。如果是细菌性上呼吸道感染则应给予抗菌治疗。因此选 E。

11.B

12.A

A。以便血为主要表现的患者，接诊首选的检查是便常规及大便隐血。

13.A 慢性肾炎起病的形式有:①大多数病理无急性肾炎病史,病前无感染史,发病已为慢性肾炎;②少数由急性肾炎迁延不愈超过1年以上转为慢性肾炎或急性肾炎临床“已愈”,经若干时间后又表现为慢性肾炎。

14.E 肝硬化大量腹水时不可过于快速利尿,以体重减轻不超过0.5kg/d为宜。过快利尿可诱发肝性脑病、肝肾综合征等。

15.C 溶血是指红细胞遭到破坏,寿命缩短的过程,也就是诊断溶血最可靠的指标。其余项均不是。

16.C

当临床上怀疑有危象时,应立即口服丙基硫氧嘧啶(PTU)600mg,以后150~200mg每日3次。心得安、利血平可降低周围组织对甲状腺素反应,其他支持治疗包括吸氧、物理降温、纠正水电解质紊乱、抗感染、监护心肾功能和血压,躁动不安时加用镇静剂。肾上腺皮质激素可加强应急反应能力。

17.C

18.E

19.C 本病表现不一,复杂多变,典型病例具有发热、出血和肾脏损害三大主要特征,以及发热期、低血压休克期、少尿期、多尿期和恢复期五个阶段。三痛:头痛、腰痛、眼眶痛。非典型和轻型病例,可以出现越期现象,而重症患者可出现发热期、休克期和少尿期之间相互重叠。

20.A

21.D 恶性贫血患者需终生维持治疗。

22.D



患者有乏力、食欲下降、厌油、恶心，尿黄消化道疾病症状，肝大，考虑肝疾病；年轻男性，无蜘蛛痣，无明显肝掌，腹平软，移动性浊音（一），暂无肝硬化失代偿期表现，暂不考虑电子胃镜检查。

23.E

24.A

甲氰咪胍为 H<sub>2</sub> 受体拮抗剂，能抑制胃酸和胃蛋白酶的分泌。

25.D

26.D

无痛性进行性淋巴结肿大和局部肿块是淋巴瘤的特征性表现，一般不发热。

27.B 大肠癌最好发部位是直肠与乙状结肠。

28.B

29.E 该患者最需与肺炎鉴别。肺炎可有咳嗽、发热、痰中带血等临床表现，胸片示：左肺上叶片状阴影。而癌性空洞伴感染多发生在老年人，影像学表现有空洞形成；肺脓肿影像学表现有空洞，内有液平面形成；支气管扩张多在肺左下叶发生；支气管炎肺纹理增粗，而没有片状阴影。

30.D 黄疸是指血中胆红素浓度增高，导致巩膜、黏膜、皮肤及体液发生黄染的现象。血清胆红素浓度为  $17.1 \sim 34.2 \mu\text{mol} / \text{L}$  时，肉眼看不出黄疸，称隐性黄疸。

31.CAMI 患者由于心脏病变引起心排血量显著、急骤降低导致组织器官灌注不足和急性肺淤血，称为急性心衰，临床表现为突发呼吸困难，大汗、烦躁，咳粉红色泡沫痰等，听诊第一心音减弱，同时有舒张早期第三心音而构成奔马律，肺动脉瓣第二心音亢进。

32.D

慢性纤维空洞性肺结核是肺结核的晚期类型，多系浸润肺结核发展恶化的结果。病程长，病情的好转与恶化，空洞的形成与纤维修补交替出现，病灶广泛纤维化。此类病人经常大量排菌，为社会的重要传染源。

33.A

34.B 糖尿病病史在 10 年以上时可引起肾脏病变。临床主要表现为蛋白尿、水肿及高血压，血清肌酐、尿素氮升高，最终发生肾衰竭。

35.D 甲状腺功能亢进可表现为高代谢症状、甲状腺肿，GD 患者可伴浸润性突眼。

36.B 反流性食管炎是指胃内容物反流入食管引起胸骨后烧灼感等症状。卧位加重，多发生于餐后。

37.C 一般服毒物后 4~6 小时洗胃最佳，超过 4~6 小时，大部分毒物已吸收，但如服毒物量较大，部分毒物仍可留在胃内，多数仍有必要洗胃，洗胃通常采用胃管洗胃法，洗胃液每次不超过 500ml(小儿酌减)，过多则易将毒物驱入肠内。洗胃液一般采用温清水。

38.C 再生障碍性贫血的诊断依据：极严重贫血，尤其伴出血和感染，血象呈全血细胞减少，而脾不肿大，应考虑再障可能。确诊须依靠骨髓穿刺检查。骨髓象显示至少有一部分增生减低或重度减低(如增生活跃，须有巨核细胞明显减少)，骨髓小粒成分中应见非造血细胞增多。

39.E 目前乳腺癌的治疗是以早期手术为主，辅以化学抗癌药物、放射、激素、免疫等措施的综合治疗。

40.B

41.A

42.E

43.E 根据题干信息，要考虑淋巴瘤、鼻咽癌淋巴结转移、淋巴结结核及

非特异性淋巴结炎等，血象及骨髓象正常可排除白血病。确诊必须依靠淋巴结的组织病理学检查结果。

44.B

45.C

肺心病患者感染诱发呼吸衰竭、肺性脑病时，首要检查手段是血气分析以了解患者的氧合情况，呼吸衰竭的程度和酸碱平衡情况，从而为有效治疗提供手段。

## 2022 年河南省濮阳市全科医学（中级）专业知识

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

### 一、单选题(30 题)

1.某校食堂数十人进食海虾后 6 小时，陆续出现上腹部疼痛，大便为水样或血水样。你认为最可能的诊断是

A.肉毒菌食物中毒 B.葡萄球菌肠毒素食物中毒 C.副溶血性弧菌食物中毒 D.变形杆菌食物中毒 E.沙门菌食物中毒

2.某地出生男婴数除以出生女婴数是

A.出生性别比 B.男婴构成比 C.女婴构成比 D.男婴出生率 E.女婴出生率

3.若炎性肠病患者合并糖尿病，其治疗应选择

A.甲硝唑 B.质子泵抑制剂 C.雷尼替丁 D.免疫抑制剂 E.肾上腺皮质激素

4.最常伴发急性左心功能衰竭的疾病是

A.肺梗死 B.室间隔缺损 C.肺动脉瓣狭窄 D.急进性高血压 E.主动脉窦瘤破裂入右心室

5.结合流行病学定义概括该学科的特征有

A.群体特征、分布为起点特征、对比特征、概率论和数理统计学特征、社会医学特征、预防为主特征

B.预防为主特征、分布特征、概率论特征、实用性特征、评价特征、对比特征

C.预防为主特征、描述特征、人群分布特征、宏观特征、多因论特征理论特征

D.测量特征、概率论特征、数理特征实用特征、随机特征、观察性特征

E.方法学特征、实用性特征、评价特征、对照特征、多学科特征、数理统计特征

6.患者，女性，35岁。发现晨起眼睑水肿2年，腰酸。体格检查 BP 167/93mmHg 双踝部凹陷性水肿。血红蛋白 101g/L，尿常规：蛋白(++)，红细胞 10~15个/HP,白细胞 0~3个/HP,24小时尿蛋白定量 1.8g,血浆白蛋白 34g/L,血 Cr133.8umol/L,BUN 10.5mmol/L。最可能的诊断是  
A.缺铁性贫血 B.急性肾小球肾炎 C.慢性肾小球肾炎 D.肾病综合征 E.原发性高血压

7.患者，男性，20

岁。奔跑后出现呼吸困难、喘憋。查体：双肺布满哮鸣音。最可能的诊断是

A.急性支气管炎 B.上呼吸道感染 C.运动性哮喘 D.心源性哮喘 E.气胸

8.下一部应进行

A.继续服药治疗 12 周 B.加用抗 Hp 药物 C.纤维胃镜检查 D.X 线钡餐复查 E.手术治疗

9.在治疗结肠 Crohn 病患者，首选

A.考来烯胺 B.阿托品 C.硫唑嘌呤 D.柳氮磺胺吡啶 E.肾上腺糖皮质激素

10.上呼吸道感染的治疗原则不正确的是

A.一般治疗，休息，多喝水  
B.注意呼吸道隔离  
C.预防并发症  
D.对症治疗：高热给予退热治疗，高热抽搐，给予镇静、止惊等处理  
E.早期积极使用抗生素

11.桡神经深支损伤有

A.腕下垂 B.掌指关节不能主动伸直，拇指不能外展 C.两者均有 D.两者均无



12.男，52岁，便血3个月，为鲜红色，不伴肛门及下腹疼痛，无大便习惯改变接诊首选检查是

A.便常规及大便隐血 B.肛门镜检查 C.乙状结肠镜检查 D.钡灌肠 E.纤维结肠镜检查

13.关于慢性肾炎，下述哪项说法正确

A.多数患者无急性肾炎病史  
B.多数由急性肾炎发展而来  
C.多数是致病菌侵犯肾小球所致  
D.多数因治疗不当或贻误治疗而引起  
E.多数由链球菌感染而发病

14.下列哪一项不是治疗肝硬化腹水治疗必须遵循的原则

A.腹水患者必须限制钠、水的摄入  
B.留钾利尿剂和排钠利尿剂并用  
C.服用呋塞米利尿时应补充氯化钾  
D.腹水减退后，仍需限制钠的摄入  
E.快速利尿消退腹水可促使病情缓解

15.诊断溶血最可靠的指标是

A.网织红细胞比例升高 B.血清结合珠蛋白减少 C.红细胞寿命缩短 D.骨髓幼红细胞显著增生 E.外周血中出现少量幼红细胞



16.甲状腺危象时，首先选用的药物是

A.心得安 B.甲基硫氧嘧啶 C.丙基硫氧嘧啶 D.碘化钠静脉滴注 E.氢化可的松静脉滴注

17.下列症状属自主神经功能失调引起的是( )

A.眼球震颤、尿频、视力障碍、抽搐、意识模糊  
B.头痛、头晕或眩晕、耳鸣  
C.异常兴奋、发热、出汗、口干、皮肤潮红、手足震颤  
D.以上都不是

18.有利于急性肾小球肾炎诊断的血液生化改变是

A.血浆蛋白明显下降 B.血清胆固醇升高 C.抗链“O”滴度升高 D.血清免疫球蛋白升高 E.血清 C3 暂时下降

19.关于肾综合征出血热临床表现描述完全正确的是

A.典型病例具有发热、休克和肾脏损害三大主要特征  
B.分为发热期、低血压休克期、肾衰竭期和恢复期四个阶段  
C.非典型和轻型病例可以出现越期现象  
D.重症患者可出现发热期、休克期和肾衰竭期之间相互重叠  
E.三痛是指头痛、肌肉痛、眼眶痛

20.甲氧西林金黄色葡萄球菌抗菌治疗首选

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/488120107131006065>