

口腔颌面外科学(A 型题)

一、A1 型题：每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 哪一项不属于导致骨折延期愈合或不愈合的因素

- A. 未能及时复位、固定
- B. 复位不准确
- C. 固定不牢靠
- D. 未行颌间结扎
- E. 清创不充分

正确答案:D

2. 颌骨骨折愈合过程中，骨痂形成的时间应距骨折发生

- A. 1~2 周
- B. 3~4 周
- C. 5~6 周
- D. 7~8 周
- E. 9~10 周

正确答案:A

3. 颞下颌关节紊乱综合征患病率最高的组群是

- A. 10~19 岁
- B. 20~30 岁
- C. 31~40 岁
- D. 41~50 岁
- E. 51~60 岁

正确答案:B

4. 颞下颌关节紊乱综合征致病的多因素理论，已广为接受。其主要致病因素是

- A. 偏侧咀嚼习惯与口腔不良习惯
- B. 夜磨牙与紧咬牙
- C. 关节内微小创伤和精神心理因素
- D. 免疫学因素
- E. 双侧关节不对称与关节囊薄弱等解剖因素

正确答案:C

5. 颞下颌关节紊乱综合征发生发展，哪一种说法是错误的

- A. 功能紊乱阶段是三阶段之一
- B. 结构紊乱阶段是三阶段之一
- C. 器质性破坏阶段是三阶段之一
- D. 病期较长，反复发作

E. 虽有自限性，但有的病例最终可能发生关节强直

正确答案:E

6. 哪一种说法不符合颞下颌关节紊乱综合征的主要症状

- A. 开闭运动出现关节绞锁
- B. 开口型及开口度异常
- C. 关节区及周围肌群随关节运动疼痛
- D. 症状严重的将出现关节区和周围肌群的自发痛
- E. 下颌运动中常出现弹响音、摩擦音和破碎音

正确答案:D

7. 关于颞下颌关节紊乱综合征的防治原则，哪一种说法是错误的

- A. 根据病情轻重，分别选用可逆性不可逆性保守治疗和手术治疗
- B. 遵循合乎逻辑的治疗程序
- C. 应对患者进行医疗知识教育
- D. 治疗局部关节症状同时改善全身状况和精神状态
- E. 采取对症治疗和消除或减除关节病同时的综合治疗

正确答案:A

8. 颞下颌关节紊乱综合征的诊断，不能采用下列哪一项

- A. 病史询问
- B. 临床检查
- C. 许勒位及经咽侧位 X 光片
- D. 关节造影片
- E. 颞下颌关节区手术探查

正确答案:E

9. 颞下颌关节脱位中，最常见的类型是

- A. 单侧侧方脱位
- B. 双侧侧方脱位
- C. 急性前脱位
- D. 复发性脱位
- E. 陈旧性脱位

正确答案:C

10. 关于引起颞下颌关节急性前脱位的病因，哪一项是错误的

- A. 张口状态下，受到外力打击
- B. 突然大张口
- C. 长时间开口过度或使用暴力
- D. 脱位处理不当或制动时间不够
- E. 咬大块食物

正确答案:D

11. 下列症状当中，哪一个是颞下颌关节双侧急性前脱位的特有症状

- A. 呈开口状不能闭口
- B. 双侧耳屏前触诊

有凹陷

- C. 流涎
- D. 言语不清
- E. 咀嚼及
吞咽困难

正确答案:B

12. 颞下颌关节急性前脱位的治疗中, 哪一种最常用

- A. 全麻下复位
- B. 切开复位
- C. 颌间复位
- D. 口外法手法复位
- E. 口内法手法复位

正确答案:E

13. 颞下颌关节复发性脱位的病因, 哪一项是错误的

- A. 急性前脱位治疗不当
- B. 长期翼外肌痉挛
- C. 老年人
- D. 慢性长期消耗性疾病
- E. 韧带及关节囊松弛

正确答案:B

14. 颞下颌关节复发性脱位的治疗方法, 不包括哪一项

- A. 关节镜外科
- B. 关节结节增高术
- C. 髁突状切除术
- D. 关节结节凿平术
- E. 关节囊紧缩术

正确答案:C

15. 颞下颌关节内强直的病因, 哪一项是错误的

- A. 化脓性中耳炎
- B. 颞下颌关节紊乱综合征
- C. 颞部对冲性损伤
- D. 外伤直接损伤颞下颌关节
- E. 血源性化脓性关节炎和类风湿性关节炎

正确答案:B

16. 诊断真性颞下颌关节强直的主要依据是

- A. 张口受限
- B. 关节动度减低或消失
- C. X线证实关节内呈致密骨性团块影
- D. 关节邻近区域炎症史
- E. 小下颌畸形

正确答案:C

17. 诊断假性颞下颌关节强直的主要依据是

- A. 张口受限
- B. 关节动度减低或消失
- C. 颌间有瘢痕条索或骨性粘连
- D. 下颌发育畸形
- E. 走马牙疳病史

正确答案:C

18. 以下何种情况不属于拔牙适应证

- A. 恶性肿瘤放射治疗前口内的残根
- B. 腭侧错位牙，食物嵌塞，形成深龋
- C. 滞留乳牙，无松动，恒牙先天缺失
- D. 下磨牙远中、合面、颊面大面积龋坏达龈下 2mm
- E. 上前牙冠折 1/3 合并根折

正确答案:C

19. 患有除了下述何种心脏病时应禁忌拔牙

- A. 前壁心梗 3 个月
- B. 充血性心力衰竭
- C. 频发的室性早搏，未治疗
- D. 完全性右束支传导阻滞
- E. 不稳定的心绞痛

正确答案:D

20. 以下哪种情况应暂缓拔牙

- A. 妊娠第 4、5、6 月
- B. 糖尿病的血糖 150mg / dL 尿糖(+)无酸中毒
- C. 急性智齿冠周炎伴嚼肌间隙感染
- D. 甲状腺机能亢进治疗后心率低于 100 次 / min
- E. 高血压血压控制在 21.3~13.3kPa(160 / 100mmHg)

正确答案:C

21. 关于妊娠期妇女拔牙哪项是正确的

- A. 妊娠第 1、2、3 月期间
- B. 妊娠第 4、5、6 月期间
- C. 妊娠第 7、8、9 月期间

- D. 拔牙对妊娠妇女无影响
- E. 妊娠期间禁忌拔牙

正确答案:B

22. 单纯性高血压无其他合并症，血压高于多少时应先进行治疗后再拔牙

- A. 21. 3~12. 7kPa(160 / 95mmHg)
- B. 22. 7~12. 7kPa(170 / 95mmHg)
- C. 24~13. 3kPa(180 / 100mmHg)
- D. 25. 3~13. 3kPa(190 / 100mmHg)
- E. 25. 3~14kPa(190 / 105mmHg)

正确答案:C

23. 下列何种情况患牙应尽可能保留

- A. 下颌仅余右下 34，I 度松动，牙槽嵴低平
- B.

. 上颌仅余右上 34，I 度松动，牙槽脊丰满

- C. 左上下 8 已正位萌出建合，常咬颊，左上下 8 完好
- D. 残根 x 线片示根短粗，上颌多个缺失牙
- E. 牙髓牙周联合症根充治疗并行根尖手术后局部仍反复肿痛

正确答案:A

24. 糖尿病患者，血糖低于多少且无酸中毒症状时可考虑拔牙

- A. 150mg / dl
- B. 160mg / dl
- C. 170mg / dl
- D. 180mg / dl
- E. 190mg / dl

正确答案:B

25. 患有下列疾病的患者在拔牙前后应给予抗生素以预防并发症，但不包括

- A. 糖尿病
- B. 先天性心脏病
- C. 慢性肝炎
- D. 风湿性心脏病
- E. 曾做过房间隔缺损修补术的患者

正确答案:C

26. 关于拔牙前的准备工作，哪项是错误的

- A. 术前做好解释工作，保持患者情绪稳定
- B. 术前简要询问病史，了解有无拔牙禁忌证

- C. 对高血压患者术前应测血压
- D. 简单检查局部情况，确定牙位
- E. 术前应对术中可能出现的问题进行预测并制定对策

正确答案:D

27. 关于拔牙时患者的体位下列哪项是错误的
- A. 在拔牙过程中应使患者处于一种自然舒适的体位
 - B. 拔除下颌牙时患者张口时下颌牙平面应与地面平行
 - C. 拔除下颌牙时，患者下颌应与术者肘关节在同一高度或稍低
 - D. 拔除上颌牙时患者头稍后仰，上颌牙平面与地面呈 45°。
 - E. 拔除上颌智齿时患者头尽量后仰，上颌牙平面与地面呈 60°。

正确答案:E

28. 牙拔除术手术区域的处理，哪项是错误的
- A. 口腔为有菌环境但不能忽视无菌技术
 - B. 术前应尽量减少口腔内细菌数量
 - C. 所用敷料应为清洁敷料，但无须严格消毒处理
 - D. 所用器械因需反复使用，应严格消毒
 - E. 拔牙操作中，应注意预防交叉感染

正确答案:C

29. 关于拔牙器械的描述哪项是正确的
- A. 牙挺由挺刃和柄两部分组成
 - B. 牙挺工作原理包括杠杆原理和轮轴原理两种
 - C. 使用牙挺各种工作原理应单独使用，避免综合使用而造成严重损伤
 - D. 牙钳由钳喙、钳柄和关节构成
 - E. 使用牙钳拔牙因力量易控制，故无需进行保护

正确答案:D

30. 关于牙挺使用中应遵循的原则，下列哪项是错误的
- A. 使用中必须以手指保护防止滑脱
 - B. 拔除上颌智齿阻力较小，可以健康的邻牙为支点
 - C. 龈缘水平处的舌侧骨板不应作为支点
 - D. 龈缘水平处的颊侧骨板不应作为支点
 - E. 使用中注意力量的控制，不可使用过大力量

正确答案:B

31. 关于刮匙的作用，下列哪项是错误的
- A. 探查拔牙窝
 - B. 刮除异物
 - C. 刮除根尖炎性肉芽
 - D. 搔刮根尖瘻管
 - E. 刮净根尖脓肿脓液

正确答案:E

32. 关于牙钳的描述哪项是错误的

- A. 上颌双尖牙钳亦称万能牙钳
- B. 牛角钳是专为拔除下 8

设计的

- C. 上前牙钳常用于上 123 的拔除
- D. 上颌磨牙钳有左右之分
- E. 上颌双尖牙钳常用于近中阻生下 8 的拔除

正确答

案:B

33. 关于分离牙龈正确的说法是

- A. 可减少拔牙时软组织阻力
- B. 应分离至釉牙骨质界
- C. 乳牙拔除时可不用分离牙龈
- D. 分离牙龈的目的是避免牙钳夹伤牙龈
- E. 上 4 正畸减数时可不用分离牙龈

正确答案:D

34. 安放牙钳时下述何种方法是错误的

- A. 正确选用拔牙钳
- B. 钳喙应与牙长轴平行
- C. 钳喙应置于牙冠釉质上并与其帖紧
- D. 安放时钳喙应沿颊腭侧插入
- E. 安放好牙钳后应再次核对牙位

正确答案:C

35. 关于牙钳使用, 下列正确的是

- A. 钳喙应尽量向根方夹持
- B. 夹持不可太紧, 否则易断根
- C. 多个牙拔除时尽量选用万能牙钳
- D. 手掌握持时应尽量靠近牙钳关节
- E. 使用牙钳只能唇(颊)舌(腭)向摇动, 否则易断根

正确答案:A

36. 牙拔除时不宜使用旋转力的牙为

- A. 上颌中切牙
- B. 上颌侧切牙
- C. 上颌尖牙
- D. 下颌中切牙
- E. 下颌双尖牙

正确答案:D

37. 关于拔牙时力的应用下列说法错误的是

- A. 摇动力适用于扁根牙或多根牙
- B. 摇动顺序应向阻力小的一侧进行
- C. 扭转力适用于单个锥形根的牙
- D. 扭转力应按牙根纵轴方向进行
- E. 牵引力不应与摇动力及扭转力结合使用以防损伤临牙

正确答案:E

38. 牙挺使用时

- A. 可代替牙钳且更有效
- B. 可代替骨凿用于增隙
- C. 牙钳使用不奏效时
- D. 拔残根时不宜使用
- E. 保护不当, 易造成邻近组织损伤

正确答案:E

39. 旋转力除可用于上前牙拔除外, 还可用于

- A. 上颌双尖牙
- B. 上颌智齿
- C. 下前牙
- D. 下颌双尖牙
- E. 下颌智齿

正确答案:D

40. 关于上颌中切牙下列哪项是错误的

- A. 唇侧牙槽骨壁薄
- B. 单根弯向远中, 断面呈三角形
- C. 先使用唇腭侧摇动力
- D. 应用旋转力效果好
- E. 最后沿牙根纵轴方向牵引脱位

正确答案:B

41. 关于拔除牙的检查及拔牙创的处理, 下列错误的是

- A. 检查拔除牙根是否完整
- B. 牙龈有无撕裂
- C. 过高牙槽间隔应待其自行吸收
- D. 刮除拔牙窝内残留物
- E. 牙槽窝压迫复位

正确答案:C

42. 关于上颌双尖牙, 哪项描述是正确的

- A. 常为扁根, 多为双根

- B. 根周骨质腭侧较颊侧疏松
- C. 脱位方向应向腭侧牵引
- D. 拔除时以摇动力为主
- E. 脱位时可适当使用扭转力

正确答案:D

43. 下列描述错误的是

- A. 上下颌牙齿除上 1 下 12 外，牙根大都向远中弯曲
- B. 下颌牙舌侧骨阻力小，拔牙时应从舌侧脱位
- C. 上颌牙颊侧骨阻力小，拔牙时应从颊侧脱位
- D. 上颌第一恒磨牙三根分叉过大时应先分根再

拔除

- E. 牙拔除时主要用摇动力，单个圆可配合扭转力

正确答案:B

44. 下列叙述错误的是

- A. 遗留牙槽窝中时间较长的牙根为残根
- B. 拔牙术中折断的牙根为断根
- C. 即使断根很小且无炎症，也必须取出
- D. 原则上各种断根皆应在拔牙的同时取出
- E. 病员体质弱且掏根手术复杂时，可延期拔除断根

正确答案:C

45. 断根拔除前的准备工作中可不包括

- A. 拔除前必须拍摄 X 线片
- B. 向病员做必要的解释
- C. 必须准备合适的器械
- D. 必须了解断根的数目、大小、部位
- E. 必须了解与周围组织关系

正确答案:A

46. 关于翻瓣去骨拔除断根的方法，下列哪项是错误的

- A. 瓣的基底部应宽以提供充足的血运
- B. 翻瓣时应将骨膜保留在骨面以防术后骨感染
- C. 瓣应足够大，使视野清楚
- D. 保证足够去骨间隙，防止去骨损伤软组织
- E. 缝合后应保证切口下方有骨支持

正确答案:B

47. O. 关于下颌第一恒磨牙下列哪项是错误的

- A. 多分为两根，即近中根和远中根
- B. 两根的颊舌径较大彼此平行略向远中弯曲
- C. 有时可分为三根，即远中根分为远中颊根及远中舌根
- D. 患牙牢固时，可先用牙挺以颊舌侧骨板为支点挺松后再拔除
- E. 拔除时以颊舌向摇动为主，最后向颊侧脱位

正确答案:C

48. 拔除断根应在下列情况下进行，但不包括

- A. 专用的诊椅
- B. 清楚的视野
- C. 良好的照明
- D. 合适的器械
- E. 良好的止血

正确答案:A

49. 关于阻生牙的概念错误的是

- A. 阻力可来源于邻牙
- B. 阻力可来源于骨
- C. 阻力可来源于软组织
- D. 只能部分萌出或完全不能萌出
- E. 常见阻生牙为下颌第三磨牙及上颌双尖牙

正确答案:E

50. 下列类型阻生齿是根据阻生齿长轴与第二磨牙的关系而分类的，但不包括

- A. 垂直阻生
- B. 倒置阻生
- C. 中位阻生
- D. 近中阻生
- E. 舌向阻生

正确答案:C

51. 下列关于牙根拔除方法，错误的是

- A. 对于高过牙龈的高位残根可用根钳拔除
- B. 对于牙钳无法夹住的低位残根应使用牙挺
- C. 使用牙挺时注意不能以腭侧骨板为支点
- D. 牙挺挺刃的大小宽窄应与牙根相适应
- E. 某些低位残根在去除少许牙槽骨壁后也可用牙钳拔除

正确答案:C

52. 拔除过程中可使用旋转力的牙齿是

- A. 上颌双尖牙
- B. 上颌第二磨牙
- C. 下颌中切牙
- D. 下颌双尖牙

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/516132233224010055>