

精神分裂症模拟试题与答案

一、A1 型题

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题

1. 关于 I 型精神分裂症，下列何种说法是错误的
A. 以阳性症状为特征
B. 对抗精神病药物反应良好
C. 无认知功能改变
D. 预后差
E. 生物学基础是多巴胺功能亢进

答案：D

[解答 I 型精神分裂症(阳性精神分裂症)以阳性症状为特征，对抗精神病药物反应良好，无认知功能改变，预后良好，生物学基础是多巴胺功能亢进；II 型精神分裂症(阴性精神分裂症)以阴性症状为主，对抗精神病药物反应差，伴有认知功能改变，预后差，脑细胞丧失退化(额叶萎缩)，多巴胺功能没有特别变化。

2. 精神分裂症最突出的感知觉障碍是
A. 言语性幻听
B. 错觉
C. 内感性不适
D. 非真实感
E. 空间知觉障碍

答案：A

3. 关于精神分裂症的临床特点，错误的是
A. 多数在青壮年发病
B. 自知力丧失

- C. 常慢性起病、病程多迁延
- D. 偏执型是最常见类型
- E. 常有意识障碍和智能障碍

答案：E

4. 氯丙嗪治疗精神分裂症最明显的不良反应是
- A. 肝损害
 - B. 粒细胞减少
 - C. 过敏反应
 - D. 抗胆碱能作用
 - E. 药源性抑郁

答案：D

5. 对第二代抗精神病药物的描述，正确的是
- A. 能够有效地控制精神分裂症的阴性症状
 - B. 除能拮抗中枢神经系统多巴胺受体外，还能拮抗中枢去甲肾上腺素受体
 - C. 在治疗精神病的阳性症状方面不如传统的抗精神病药物
 - D. 多数药物锥体外系副作用相对较多但其他副作用较少
 - E. 主要包括氯普噻吨、氯氮平、利培酮

答案：A

[解答 非经典抗精神病药物通过平衡阻滞 5-HT 与 D2 受体，起到治疗作用，不但对幻觉妄想等阳性症状有效，对情感平淡、意志减退等阴性症状也有一定疗效。治疗剂量通常较少或不产生锥体外系副反应和催乳素的水平的升高。代表药物有利培酮、奥氮平、奎硫平、氯氮平等。

6. 关于精神分裂症的概述正确的是
- A. 一组病因未明的精神疾病
 - B. 多起病于青壮年
 - C. 缓慢起病，病程迁延
 - D. 有思维、情感、行为方面的障碍

E. 通常有意识障碍及智能减退

答案：E

7. 关于精神分裂症单纯型，下列何种说法不正确

- A. 多在青少年期起病
- B. 病程缓慢
- C. 生活疏懒
- D. 兴趣及活动逐渐减退
- E. 常伴有幻觉、妄想

答案：E

8. 使用过量氯丙嗪的精神病患者，如使用肾上腺素后，主要表现为

- A. 升压
- B. 降压
- C. 血压不变
- D. 心率减慢
- E. 心率不变

答案：B

9. 不属于抗精神病药物引起的锥体外系；症状是

- A. 急性肌张力障碍
- B. 静坐不能
- C. 震颤麻痹综合征
- D. 意识障碍
- E. 迟发性运动障碍

答案：D

10. 精神分裂症最常见的幻觉是

- A. 幻听
- B. 幻视
- C. 幻味
- D. 幻触

E. 幻嗅

答案：A

11. 下列抗精神病药物哪一种为非经典药物

A. 氟哌啶醇

B. 氯普噻吨

C. 奥氮平

D. 舒必利

E. 氯丙嗪

答案：C

12. 关于精神分裂症的维持治疗正确的是

A. 第一次发作维持治疗 1~2 年

B. 反复多次者不需维持治疗

C. 经典抗精神药物维持治疗量应为急性期治疗量的 1/3 左右

D. 非经典抗精神病药物维持治疗量即急性期治疗量

E. 维持治疗期，不宜单一用药

答案：A

13. 针对有幻觉妄想及情感平淡、意志减退的患者，宜选用的非经典抗精神病药物是

A. 氯丙嗪

B. 安定(地西洋)

C. 氟哌啶醇

D. 利培酮

E. 泰尔登

答案：D

14. 有关经典药物(又称第一代抗精神病药物)的特点，下列何种说法是错误的

A. 阻断中枢多巴胺 D2 受体

B. 可以产生锥体外系副反应

- C. 不产生催乳素的水平的升高
- D. 可以产生心血管副反应
- E. 可以产生肝脏副反应

答案：C

15. 不属于精神分裂症阳性症状的是
- A. 言语性幻听
 - B. 影响妄想
 - C. 思维破裂
 - D. 思维贫乏
 - E. 紧张性木僵

答案：D

16. 根据 CCMD-3，下列哪项不符合精神分裂症的诊断标准
- A. 反复出现的言语性幻听
 - B. 原发性妄想
 - C. 自知力障碍
 - D. 社会功能严重受损
 - E. 一般继发于意识障碍

答案：E

17. 有关非经典药物抗精神病药物利培酮的作用机制，以下哪一种说法是正确的

- A. 阻断中枢神经系统多巴胺受体还能拮抗中枢去甲肾上腺素受体
- B. 阻断中枢神经系统 5-羟色胺受体
- C. 阻断中枢去甲肾上腺素受体
- D. 阻断中枢神经系统多巴胺受体和 5-羟色胺受体
- E. 阻断中枢神经系统多巴胺受体和乙酰胆碱受体

答案：D

18. 单纯型精神分裂症与神经衰弱最主要的鉴别点在于
- A. 病程迁延

- B. 无自知力
- C. 起病缓慢
- D. 有幻觉妄想
- E. 头痛失眠较轻

答案： B

19. 精神分裂症的强迫症状与强迫性神经病的鉴别是前者

- A. 强迫症状明显
- B. 缺乏自知力及痛苦感
- C. 起病缓慢
- D. 与情绪有关
- E. 有反强迫意愿

答案： B

20. 精神分裂症最多见的症状是

- A. 物理影响妄想
- B. 关系被害妄想
- C. 夸大妄想
- D. 罪恶妄想
- E. 嫉妒妄想

答案： B

21. 紧张综合征主要见于

- A. 精神分裂症紧张型
- B. 精神分裂症青春型
- C. 癔症
- D. 神经衰弱
- E. 躁狂症

答案： A

22. 下列哪种症状对诊断精神分裂症的意义最大

- A. 思维奔逸，情感欣快

- B. 思维迟缓，意志活动减弱
- C. 情感焦虑，紧张
- D. 情感淡漠，思维破裂
- E. 交替出现的情感高涨、情感低落

答案：D

23. 精神分裂症的特征性症状

- A. 失眠
- B. 注意力不集中
- C. 意识范围缩小
- D. 被洞悉感
- E. 遗忘

答案：D

二、A2 型题

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 女性，21 岁，患精神分裂症 1 年，由于有支气管哮喘病，临床给予适当剂量奋乃静治疗，其主要不良反应是

- A. 锥体外系症状
- B. 肝损害
- C. 粒细胞减少
- D. 内分泌变化
- E. 迟发性运动障碍

答案：A

2. 27 岁，男性，病程 5 年，性格孤僻，不上班，将自己的东西都卖掉，流浪街头，睡门洞，在饭店讨饭吃，时有自言自语，经常呼唤着因病过世的母亲的名字。精神检查：意识清晰，衣着不整，表情淡漠，对人冷淡，常对人冷笑，孤僻离群，时有奇怪想法，如“不能利用出现的一种倾向掩盖另一种倾向”。躯体及神经系统检查无异常，该患者诊断是

- A. 分裂性人格
- B. 精神分裂症
- C. 抑郁症
- D. 精神发育迟滞
- E. 脑器质性精神障碍

答案：B

3. 男性，24岁。最近2月常感到非常害怕，并称：“家中有窃听器、摄像机监视，马路上有人跟踪，全家被人下毒。”你认为这是什么症状

- A. 思维散漫
- B. 被害妄想
- C. 被控制感
- D. 错觉
- E. 关系妄想

答案：B

4. 男性，23岁，木匠，近1年来，不能专心做工，时常发呆，情绪低落，有时烦躁，认为邻居要加害于他，感到自己的事情还未说出来，别人就已经知道了，因此更认为自己不安全，时常无故哭泣，自言自语“为什么这样对我，我怎么办？”体检及神经系统检查无异常。该病人最可能的诊断是

- A. 抑郁症
- B. 恐惧症
- C. 心因性反应
- D. 精神分裂症
- E. 焦虑症

答案：D

5. 女性，16岁。诊断为精神分裂症青春型，患者的病情特点中下列哪项不符合

- A. 联想散漫

- B. 片段幻想妄想，行为紊乱
- C. 情感平淡
- D. 急性或亚急性起病
- E. 治疗效果差

答案：C

6. 24岁，女性，病程6年，说有人要害她，常自笑，好追求异性，有时打人摔东西，话多内容凌乱。精神检查：意识清晰，兴奋多语，思维松弛，欣快，主动接触异性，有被害妄想及非系统性妄想，活动增多而无目的性，躯体及神经系统检查未见著征，该患者诊断为

- A. 精神分裂症
- B. 情感障碍(躁狂型)
- C. 脑器质性精神障碍
- D. 人格障碍
- E. 躯体疾病所致精神障碍

答案：A

7. 女性，35岁，3年前开始怀疑丈夫对其不忠，时常争吵，近1年来，跟踪丈夫，搜查丈夫的文件包，常听到脑子里有一女子声音说“你可怜”“你真蠢”之类的话，因此不愿与家人同餐，不敢喝家中水，认为饭里、水里被放了毒药，认为丈夫与外人联合起来害她，病人常常哭泣。体检及神经系统检查无异常，此病人患有精神分裂症的哪种分型

- A. 紧张型
- B. 单纯型
- C. 偏执型
- D. 青春型
- E. 未分化型

答案：C

8. 男性，59岁，病程3~4年，主要表现不愿与他人接触，喜独处沉思，自言自语，大吵大闹，无故打人，言语少，情感淡漠，孤僻，赤足露

胸，生活懒散，衣着不整，不洗澡，随地便溺，需要什么用手打手势示意，思维贫乏，自发言语杂乱无章。躯体检查：神经系统检查均正常，诊断为

- A. 精神分裂症(衰退型)
- B. 老年性痴呆
- C. 人格改变
- D. 脑器质性精神障碍
- E. 精神发育退缩

答案：A

9. 29岁，女性，十个月前起病，言语错乱，别人难以理解，骂人毁物，逐渐言语活动减少，不能与周围人沟通，近三个月来呆坐少语，自笑，认为自己的事别人都能知晓，有人要害自己。查：意识清晰，目光表情呆滞，耳边有命令性幻听，被害妄想，被洞悉感，有思维中断，躯体及神经系统检查无著征，该患者诊断为

- A. 抑郁症
- B. 精神分裂症
- C. 脑肿瘤所致精神障碍
- D. 内分泌疾病所致精神障碍
- E. 偏执性精神障碍

答案：B

10. 男性，32岁，近3个月来失眠，情绪烦躁，时常自言自语，说听到许多人在耳边议论他，有时是表扬他，有时是批评他；工作漫不经心，无故旷工，家人劝说，则有打骂毁物行为，体检及神经系统无异常发现。该病情的诊断考虑是

- A. 焦虑性神经症
- B. 躁狂症
- C. 精神分裂症
- D. 人格障碍

E. 神经衰弱

答案：C

11. 女性，30岁。将自己的衣服反穿，以表示自己为人“表里一致”，这是什么症状

- A. 强迫性思维
- B. 病理性象征性思维
- C. 童样痴呆
- D. 思维散漫
- E. 思维贫乏

答案：B

12. 病人男性，30岁，近半年总觉得有人跟踪他，常听见有人在议论如何对付他，继而出现闷闷不乐，整天闭门不出，写信到公安局要求保护。该病人最可能诊断是

- A. 反应性抑郁
- B. 抑郁症
- C. 躁狂症
- D. 精神分裂症偏执型
- E. 精神分裂症单纯型

答案：D

13. 男，28岁，以前精神正常，到某地出差刚下火车，突然感到要爆发战争了，因为好多人都往出口处跑。最可能的症状是

- A. 错觉
- B. 幻觉
- C. 感知综合障碍
- D. 原发性妄想
- E. 继发性妄想

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/577201164164006036>