

口腔颌面外科学测试题与答案

1、关于干槽症的治疗，不正确的是

- A、给予抗感染、止痛治疗
- B、彻底清创
- C、隔离外界刺激
- D、给予措施促进肉芽组织生长
- E、局部使用止血药物

答案：E

2、好发于颈侧部，穿刺可抽出黄色或棕色液体的囊肿

- A、皮脂腺囊肿
- B、皮样或表皮样囊肿
- C、甲状舌管囊肿
- D、腮裂囊肿
- E、舌下囊肿

答案：D

3、颞下颌关节紊乱病，错误的是

- A、有自限性
- B、关节间隙改变常见
- C、有时需与鼻咽癌鉴别
- D、严重者可致关节强直
- E、关节弹响和杂音是主要症状

答案：D

4、丹毒的致病菌是

- A、梭状芽孢杆菌
- B、白色念珠菌
- C、金黄色葡萄球菌
- D、 β -溶血性链球菌
- E、表皮葡萄球菌

答案：D

5、若上颌骨确诊骨折，急救首先是

- A、止血
- B、复位
- C、止痛
- D、防治感染
- E、保持呼吸道通畅及止血

答案：E

6、腭裂修复手术宜选择在何时进行

- A、出生后 3~6 个月
- B、出生后 6~8 个月
- C、出生后 8~18 个月
- D、青春期后
- E、成年后

答案：C

7、痈好发于

- A、上颌骨
- B、下颌骨
- C、上唇
- D、下唇
- E、鼻

答案：C

8、舌癌转移的特点下列哪种说法是错误的

- A、舌癌常发生早期颈淋巴结转移，且转移率较高
- B、舌前部的癌多向下颌下及颈深淋巴结上、中群转移
- C、发生于舌背或越过舌体中线的舌癌，可以向对侧颈淋巴结转移
- D、舌癌的颈淋巴结转移常在一侧
- E、舌癌可发生远处转移

答案：E

9、舌系带过短进行正确治疗的最佳时间是

- A、1 岁以内
- B、1-2 岁
- C、3-4 岁
- D、5-6 岁
- E、7-8 岁

答案：B

10、患者女，9 岁。因上唇外伤性缺损行下唇组织瓣转移修复上唇缺损，其组织瓣成活后断蒂的时间为

- A、术后 1 周
- B、术后 3 周
- C、术后 10 天
- D、术后 1 个月

E、术后 2 个月

答案：B

11、患者男，30 岁。左腮腺后下极腺淋巴瘤 2cmx3cm 大小，进行区域切除术，术中发现腮腺下极有数个淋巴结，对这些淋巴结的处理应是

A、无需特殊处理

B、保留，但术后需放疗

C、保留与瘤体粘连的淋巴结

D、与肿瘤发生有关，应摘除

E、术中冷冻切片决定是否切除

答案：D

12、如果患者拔牙后 4 天出现发热、开口困难和吞咽疼痛，检查发现拔牙窝舌侧黏膜红肿及压痛。最可能的诊断是

A、咽峡前间隙感染

B、干槽症

C、术后反应

D、舌侧骨板骨折

E、翼颌间隙感染

答案：A

13、以下哪一肿瘤只发生在颌骨

A、成釉细胞瘤

B、骨纤维异常增殖症

C、尤文肉瘤

D、骨巨细胞瘤

E、骨瘤

答案：A

14、普鲁卡因穿透力较弱，不宜用于

A、硬膜外麻醉

B、浸润麻醉

C、传导麻醉

D、表面麻醉

E、蛛网膜下腔麻醉

答案：D

15、成釉细胞瘤内含有

A、血性液体

B、黄褐色液体

- C、透明、淡黄色水样液体
- D、草黄色液体
- E、黄白色蛋白样液体

答案：B

16、以下关于唇腭裂的叙述，哪项是错误的

- A、外科手术整复是主要的治疗方法
- B、应采用综合序列治疗来达到功能与外形的恢复
- C、单纯唇裂患者无法形成“腭咽闭合”
- D、腭裂患者术后应做语音训练
- E、颌骨继发畸形的治疗常在16岁以后进行

答案：C

17、患者男，34岁。右上6死髓、劈裂，要求拔除。拔除时应采用的麻醉包括

- A、上颌结节麻醉+腭大孔麻醉
- B、上颌结节麻醉+腭大孔麻醉+6腭侧近中局部浸润麻醉
- C、上颌结节麻醉+腭大孔麻醉+6颊侧近中局部浸润麻醉
- D、腭大孔麻醉+6颊侧近中局部浸润麻醉
- E、腭大孔麻醉+6腭侧近中局部浸润麻醉

答案：C

18、始基囊肿属于

- A、胚胎性软组织囊肿
- B、潴留囊肿
- C、牙源性囊肿
- D、面裂囊肿
- E、血外渗性囊肿

答案：C

19、腮腺扪诊的正确方法为

- A、双手合诊
- B、以示、中、无名指3指平触为宜
- C、以示、中、无名指3指提拉式扪诊为宜
- D、以中指、示指挤触
- E、以拇指、示指挤触

答案：A

20、对放疗高度敏感的恶性肿瘤为

- A、骨肉瘤

- B、乳头状瘤
- C、鳞状细胞癌
- D、恶性淋巴瘤
- E、牙龈瘤

答案：D

21、男，30岁。双侧髁突高位骨折且有前牙开（牙合），后牙早接触，治疗上宜选用

- A、切开复位内固定
- B、切开内固定后颌间牵引
- C、颌间结扎
- D、髁突摘除术
- E、颅颌弹性绷带牵引

答案：A

22、进行唇裂整复术最合适的年龄为

- A、出生后即刻
- B、1~2个月，体重达5~6kg
- C、3~6个月，体重达5~6kg
- D、10~12个月，体重达5~6kg
- E、1~2岁

答案：C

23、玫瑰红染色试验用于

- A、口腔癌
- B、牙石检查
- C、慢性腮腺炎
- D、舍格伦综合征
- E、口腔癌前病变

答案：D

24、费时较长的手术选用

- A、利多卡因
- B、阿替卡因
- C、丁卡因
- D、布比卡因
- E、普鲁卡因

答案：D

25、疼痛和张口受限，无弹响

- A、翼外肌功能亢进
- B、翼外肌痉挛
- C、咀嚼肌群痉挛
- D、肌筋膜炎
- E、滑膜炎

答案：B

26、患者女，30岁。拔牙后3天开口逐渐受限，下颌下淋巴结肿大。除下颌支后缘稍丰满压痛外，其余无阳性体征。最可能的诊断是

- A、翼下颌间隙感染
- B、下颌下间隙感染
- C、颞间隙感染
- D、咬肌间隙感染
- E、干槽症

答案：A

27、患者，男，64岁，因舌部肿物1年入院。检查：肿物位于左舌中段1/3侧靠近舌侧缘，肿物大小约2.5cm×2.5cm，突出舌表面，呈菜花状，右颈部扪及肿大淋巴结。为明确诊断，需进一步检查，最有意义的是

- A、头颈部CT
- B、活检
- C、颈部B超
- D、颌骨X线片
- E、头颈部MRI

答案：B

28、对口腔颌面部有张力创口处理的方法中，错误的是

- A、充分潜行分离
- B、减张缝合
- C、应用辅助减张法
- D、附加切口
- E、尽力拉拢缝合

答案：E

29、恶性肿瘤化疗期间进行血常规检查，下列哪组检测值指示应予停药

- A、白细胞4000以下
- B、白细胞3000以下
- C、血小板10万以下
- D、血红蛋白90g/L以下

E、白细胞 2000 以下

答案：B

30、如选用唇交叉瓣，断蒂时间为

A、5 天

B、1 周

C、2~3 周

D、4 周

E、5 周

答案：C

31、最易造成下颌骨边缘性骨髓炎的是

A、翼颌间隙感染

B、颞深间隙感染

C、咽旁间隙感染

D、咬肌间隙

E、咽旁间隙

答案：D

32、以下不宜行组织活检术的恶性肿瘤为

A、舌癌

B、唇癌

C、恶性淋巴瘤

D、恶性黑素瘤

E、肉瘤

答案：D

33、患者，女，24 岁。因车祸造成面部外伤。x 线片显示右侧上颌骨骨折，骨折线横过鼻背、眶部，经颧骨上方到达翼突。正确的诊断是

A、LeFort I 型骨折

B、LeFort II 型骨折

C、LeFort III 型骨折

D、颧弓骨折

E、鼻骨骨折

答案：C

34、为观察后牙牙槽骨顶部的骨吸收状况，最好采用

A、根尖片

B、（牙合）翼片

C、全景片

- D、侧位片
- E、横断（牙合）片

答案：B

35、通常不会引起开口受限的间隙感染

- A、咬肌间隙感染
- B、翼下颌间隙感染
- C、颞间隙感染
- D、颊间隙感染
- E、颞下间隙感染

答案：D

36、碘酊用于口腔内消毒剂的浓度是

- A、2.50%
- B、2.00%
- C、1.50%
- D、1%
- E、0.50%

答案：D

37、拔牙钳喙与牙长轴平行是为了

- A、夹住患牙
- B、省力
- C、防止邻牙损伤
- D、避免牙龈损伤
- E、利于使用扭转力

答案：C

38、单个毛囊及其所属的皮脂腺的急性化脓性感染是

- A、疖
- B、痈
- C、丹毒
- D、急性蜂窝织炎
- E、脓肿

答案：A

39、患者男，65岁。因扁桃体癌欲进行放疗，放疗前应

- A、对仍能保留的龋坏磨牙治疗后进行金属全冠修复
- B、对无法治愈的病牙予以拔除并进行活动义齿修复
- C、对仍能保留的龋坏牙治疗后进行金属全冠修复

- D、牙周洁治，取出口腔内已有的金属
- E、对所有龋齿、牙周炎等病牙均予以拔除

答案：D

40、患者男，26岁。右侧下颌下区无痛性肿块4个月余，抗感染治疗无效，触诊质地柔软，穿刺为蛋清样液体，口内无异常，诊断是

- A、右下颌下淋巴管瘤
- B、右下颌下腺多形性腺瘤
- C、右下颌下腺囊肿
- D、右舌下腺囊肿口外型
- E、右下颌下淋巴结炎

答案：D

41、关于口腔临床全身应用抗菌药物的基本原则的叙述，不正确的是

- A、用药前应尽可能明确病原菌并进行药敏试验
- B、根据患者生理、病理、免疫状态调整用药剂量
- C、一种抗菌药物可以控制的感染，不采用多种药物联合应用
- D、可用广谱抗生素者不用窄谱
- E、抗菌药物治疗方案应综合患者病、病原菌种类及抗菌药物特点制定

答案：D

42、若上颌咬合片示上前牙区牙槽骨骨折。常用的固定方法是

- A、单颌牙弓夹板固定
- B、无需处理，观察
- C、克氏针内固定
- D、皮质骨螺钉固定
- E、切开复位，骨间固定

答案：A

43、患者右侧下颌骨体部被钝器打击后，出现左侧后牙早接触，前牙开HE，左侧颞下颌关节区肿胀疼痛，可能是

- A、左侧翼外肌痉挛
- B、左侧髁状突颈部骨折
- C、左侧关节盘穿孔破裂
- D、双侧髁状突颈部骨折
- E、左侧颞颌关节急性前脱位

答案：B

44、对三叉神经痛有明显止痛作用的是

- A、颠痛定

- B、酰胺咪嗪
- C、地巴唑
- D、阿司匹林
- E、氯丙嗪

答案：B

45、临床上对局麻药中毒的抢救措施不包括

- A、给氧
- B、补液
- C、抗惊厥
- D、应用激素
- E、应用降压药

答案：E

46、影响下颌骨骨折段移位的因素不包括

- A、骨折部位
- B、出血、软组织肿胀及颌骨本身的重量
- C、骨折线方向
- D、外力大小和方向
- E、咀嚼肌牵引的力量

答案：B

47、对于颌骨发育异常所致的反（牙合）的形成机制中，不包括

- A、真性下颌前突
- B、上颌发育不足
- C、上、下颌骨发育不足
- D、下颌前突，上颌发育不足
- E、颏部前突

答案：E

48、进行牙槽突裂植骨术的最佳年龄在

- A、4~6岁
- B、9~11岁
- C、13~18岁
- D、25岁以后
- E、出生后任何时间

答案：B

49、麻醉上颌前牙腭侧牙龈、粘骨膜和牙槽骨应阻滞

- A、上牙槽前神经

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/587111040154006050>