

麻醉科三基考试题库及答案

1、下列关于俯卧位的说法，错误的是

- A、长时间俯卧位致上呼吸道黏膜水肿会形成术后气道梗阻
- B、不会导致臂丛神经过度伸展或受压
- C、眼部受压可引起视力障碍
- D、有可能出现气管导管扭曲或移位
- E、髋关节过于屈曲导致股静脉回流障碍易产生术后深静脉栓塞 答案：B

2、肌间沟法臂丛阻滞哪一项不正确

- A、肥胖病人或不合作小儿较适用
- B、上臂.肩部阻滞完全
- C、高位阻滞不引起气胸
- D、易于掌握
- E、并发症相对较少

答案：D

3、对颈部某些结构体表投影的描述，正确的是()

- A、颈外静脉的体表投影为乳突尖与下颌角连线的中点
- B、颈外静脉为下颌角至锁骨中点的连线上
- C、胸锁乳突肌前缘中点处是臂丛神经阻滞麻醉的部位
- D、胸膜顶的体表投影是距锁骨上缘约 1cm
- E、锁骨下动脉距锁骨上缘约 3cm

答案：B

4、老年人全身麻醉以下哪项做法是不对的：()

- A、诱导要平稳
- B、保持呼吸道通畅
- C、维持较深的麻醉
- D、选择毒性较小的药物
- E、尽量快苏醒

答案：C

5、一般不主张术前停用抗高血压药，但应除外下列哪一种药？()

- A、尼群地平
- B、艾司洛尔
- C、卡托普利
- D、美托洛尔
- E、尼莫地平

E、芬太尼在胃壁. 肺组织分布多。

答案：D

44、具有镇痛作用的静脉麻醉药是

- A、氯胺酮
- B、 γ -OH
- C、硫喷妥钠
- D、咪达唑仑
- E、依托咪酯

答案：A

45、对于困难气道的病人，全身麻醉诱导前“给氧去氮”是非常重要的，其氧流量应大于多少？（）

- A、6L/min
- B、4L/min
- C、2L/min
- D、1L/min
- E、0.5L/min

答案：A

46、COPD 患者上腹部术后易出现肺部并发症，诱因多是

- A、上腹部肌肉受损
- B、血流动力学不稳定
- C、术后感染
- D、引流不畅
- E、膈肌功能受损和咳嗽受抑制

答案：E

47、抢救重度支气管哮喘哪项错误 0

- A、静脉补液
- B、氧气吸入
- C、注射强心剂
- D、静脉滴注氨茶碱
- E、静脉滴注糖皮质激素

答案：C

48、关于肺通气/血流比值：（）

- A、0.8 是各部位的综合值
- B、上部比值大于 1

- C、上部比值等于 1
- D、中部比值等于 1
- E、下部比值恰为 0.8

答案：A

49、下列哪种麻醉药增加颅内压 0

- A、氯胺酮
- B、硫喷妥钠
- C、异丙酚
- D、依托米脂
- E、米达唑仑

答案：A

50、引起输血发热反应，最常见的原因是

- A、细菌污染
- B、致热原
- C、血型不合
- D、红细胞破坏
- E、过敏物质

答案：B

51、以下哪项不是梗阻性休克的病因

- A、肺栓塞
- B、大量心包积液
- C、左房黏液瘤
- D、夹层动脉瘤
- E、急性大面积心肌梗死

答案：E

52、机械通气患者脱机失败的常见原因，不包括

- A、高血糖
- B、心功能差
- C、呼吸肌失用性萎缩
- D、肺部感染未控制
- E、呼吸中枢功能失常

答案：A

53、下列有关全麻脊髓麻醉的叙述不正确的是：。

- A、心率减慢
- B、上肢能自主活动
- C、神志消失
- D、呼吸停止
- E、心搏停止

答案：B

54、普奈洛尔治疗心律失常的药理作用基础是

- A、 β 受体阻断
- B、内在拟交感活性
- C、膜稳定作用
- D、钠通道阻滞
- E、以上都不对

答案：A

55、男，58岁，有房颤病史多年，患肺癌行右上肺叶切除后两小时，在ICU行心电、血压、SpO₂及呼气末CO₂监测，突然心率加快达118次/分，血压短暂上升后下降，SpO₂下降至87%，气道压上升，呼气末CO₂由原来的38mmHg下降至15mmHg，请问最可能发生了什么情况？（）

- A、心肌梗死
- B、肺梗塞
- C、气道梗阻
- D、呼吸机接头脱落
- E、以上都不是

答案：B

56、患者男性，79岁。腹胀呕吐4天，诊断为粘连性肠梗阻，有肠绞窄可能，拟行急诊剖腹探查。最重要的化验室检查是：（）

- A、电解质
- B、血常规
- C、肝功能
- D、肾功能
- E、血气

答案：A

57、正常人100%氧过度通气3分钟，维持PaO₂>120mmHg的呼吸停止最长时间是

- A、1分钟
- B、2分钟

C、3 分钟

D、4 分钟

E、5 分钟

答案：D

58、在手术协议中要求病人本人或其家属签字，这是尊重病人的什么权利()

A、知情同意

B、人格尊重

C、医疗监督

D、平等医疗

答案：A

59、有关 ASA 分级与麻醉死亡率哪一项是正确的：()

A、ASA Ⅱ级，麻醉死亡率近 1/1000

B、ASAⅢ级，麻醉死亡率近 28/1000

C、ASAⅣ级，麻醉死亡率近 74/1000

D、ASAⅤ级，麻醉死亡率近 155/1000

E、以上都对

答案：E

60、阿托品用作麻醉前用药的目的是

A、促进胃肠蠕动，减少术后恶心、呕吐

B、减少腺体分泌

C、增强心血管的迷走神经反射

D、增强胃肠道张力

E、以上都不是

答案：B

61、急性下呼吸道梗阻，禁用的药物是

A、阿托品

B、异丙肾上腺素

C、氢化可的松

D、 β_2 受体阻滞剂

E、琥珀酰胆碱

答案：D

62、外周递质是()

A、传入神经释放的递质

B、传出神经释放的递质

- C、周围神经释放的递质
- D、脊神经元释放的递质
- E、边缘系统释放的递质

答案：C

63、氧在血液中运输方式主要是 0

- A、溶解在血浆中
- B、与血红蛋白结合
- C、以碳酸盐的形式
- D、以上均是
- E、以上均不是

答案：B

64、麻黄碱的适应证除外：（）

- A、防治椎管内麻醉的低血压
- B、预防支气管哮喘发作
- C、感冒引起的鼻塞
- D、过敏性休克
- E、缓解荨麻疹的皮肤黏膜症状

答案：D

65、确定室性心动过速诊断的心电图表现是哪项？（）

- A、QRS 波群形态畸形
- B、心室率 100-200 次/分
- C、心室律可稍不规则
- D、房室分离
- E、心室夺获或室性融合波

答案：E

66、下列不是神经-肌接头兴奋传递特点的是

- A、1 : 1 传递
- B、单向传递
- C、时间延搁
- D、对内环境变化和药物敏感
- E、不易疲劳

答案：E

67、等效剂量条件下起效最快的肌松药是：（）

- A、阿曲库钱
- B、维库澳铉
- C、罗库溴铵
- D、潘库澳铵
- E、哌库澳铉

答案：C

68、二氧化碳在血液中运输方式主要是 0

- A、溶解在血浆中
- B、与血红蛋白结合
- C、以碳酸盐的形式
- D、以上均是
- E、以上均不是

答案：C

69、哪一项血气参数最能反映肺通气状况 ()

- A、BE
- B、SaO₂
- C、PaO₂
- D、PaCO₂
- E、Ph

答案：D

70、连枷胸突出的临床表现是

- A、血压升高
- B、心率加快
- C、呼吸功能障碍
- D、胸痛
- E、咳嗽

答案：C

71、有关脊髓叙述错误的是 ()

- A、与脊神经直接相连
- B、在 L1-2 腰椎穿刺可能损伤脊髓
- C、被止于第二腰椎水平的硬脊膜所包裹
- D、发出全部颈神经的根
- E、被脑脊液直接包围着

答案：D

72、下列高钾血症的病因中，不正确的是

- A、钾输入过多
- B、创伤. 缺氧
- C、急性肾衰竭
- D、盐皮质激素分泌过多
- E、溶血. 酸中毒

答案：D

73、下列引起局麻药毒性反应的原因中，错误的是

- A、局麻药过量
- B、局麻药中未加用肾上腺素
- C、药物误注入血管
- D、注射部位血供丰富，局麻药吸收过快
- E、患者一般情况差，对局麻药的耐受力下降

答案：B

74、有关脾破裂的临床表现，下列选项不正确的是

- A、休克**
- B、腹痛，腹膜刺激症状
- C、脾区叩击痛
- D、膈肌刺激征
- E、左上腹皮肤过敏征

答案：E

75、以下哪种心脏病发生心力衰竭不宜用强心苷治疗()

- A、心脏瓣膜病所致心力衰竭
- B、高血压所致心力衰竭
- C、动脉硬化所致心力衰竭
- D、先天性心脏病所致心力衰竭
- E、缩窄性心包炎所致心力衰竭

答案：E

76、择期全麻气管插管的绝对禁忌证是()

- A、急性喉水肿
- B、气管内肿瘤
- C、凝血功能障碍

D、喉返神经麻醉痹

E、内高压

答案：A

77、下列哪一项不是血管扩张药的适应症()

A、手术期间的控制性降压

B、缺血性心脏病

C、高血压危象

D、心源性休克

E、过敏性休克

答案：E

78、对于小儿麻醉前评估，不正确的是

A、特别注意近期有无上呼吸道感染病史

B、先天性疾病往往合并其他系统的异常

C、了解学龄儿童牙齿松动情况

D、了解儿童和家长的心理状态，建立彼此信赖关系

E、新生儿择期手术前血红蛋白不低于 100g/L

答案：E

79、一急腹症病人体温 39℃, 术前用药应避免使用

A、苯巴比妥钠

B、地西洋

C、哌替啶

D、阿托品

E、东莨菪碱

答案：D

80、下列表现可由交感神经的兴奋而引起的是

A、支气管平滑肌舒张

B、瞳孔缩小

C、胃肠平滑肌蠕动增强

D、冠状动脉轻度收缩

E、心律减慢，收缩力减弱

答案：A

81、快速输液提升中心静脉压的潜在危险性是：（）

A、右房前负荷过重

- B、急性右心功能不全
- C、急性左心功能不全
- D、体循环高血压
- E、体循环淤血

答案：C

82、下列不属于中暑致病因素的是

- A、高温
- B、强体力劳动
- C、高湿
- D、营养不良
- E、强辐射

答案：D

83、成人硬脊膜终止于

- A、腰 1
- B、腰 2
- C、舐 1
- D、舐 2
- E、舐裂孔

答案：D

84、关于脊柱的描述，正确的是()

- A、有 8 块颈椎
- B、有 4 块骶椎
- C、胸部运动最灵活
- D、腰曲凸向前
- E、颈曲凸向后

答案：D

85、《执业医师法》规定，医师应当履行的义务不包括下列哪一项 0

- A、进行学术交流
- B、遵守职业道德，履行医师职责
- C、保护患者的隐私
- D、遵守技术规范
- E、对患者进行健康教育

答案：A

86、颅脑外伤伴充血性心力衰竭时，哪项措施不可取

- A、呋塞米
- B、过度换气
- C、限制入液量
- D、甘露醇
- E、肾上腺皮质激素

答案：D

87、心脏骤停早期最佳诊断指标是

- A、测不到血压
- B、瞳孔突然明显散大
- C、呼吸停止
- D、颈动脉和股动脉搏动消失
- E、面色苍白和口唇发绀

答案：D

88、肺大疱手术麻醉时，下列哪项不恰当

- A、麻醉力求平稳
- B、呼吸压力 $>15\text{cmH}_2\text{O}$
- C、维持足够的麻醉深度
- D、保持充足的呼气时间
- E、监测呼气末 CO_2 浓度

答案：B

89、关于琥珀胆碱升眼压的作用哪项错误

- A、一般发生在 30 秒内，6 分钟左右恢复，持续约 5min
- B、预先用非去极化肌松剂可减轻其升眼压作用
- C、内眼手术和开放性眼外伤手术不宜用琥珀胆碱
- D、与眼外肌纤维成束收缩和一过性眼外肌张力增高有关
- E、已有眼压增高的患者，琥珀胆碱可明显再增高眼压

答案：E

90、下列最易增强心肌对儿茶酚胺敏感性的吸入麻醉药是

- A、乙醚
- B、氟烷
- C、甲氧氟烷
- D、恩氟烷（安氟酸）
- E、异氟烷（异氟酸）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/598123060005006037>