

2023 年助理医师资格证考试之口腔助理医师模考模拟试题(全优)

单选题（共 100 题）

1、牙源性角化囊性瘤穿刺囊液（ ）。

- A. 乳白色豆渣样
- B. 黄白色角化物
- C. 草黄或草绿色，含胆固醇
- D. 棕褐色
- E. 白色凝乳状

【答案】 B

2、单侧唇裂修复术的最佳手术年龄是（ ）。

- A. 1~2 个月
- B. 3~6 个月
- C. 7~11 个月
- D. 12~17 个月
- E. 18~24 个月

【答案】 B

3、下唇麻木是哪种阻滞麻醉注射成功的标志

- A. 上牙槽后神经
- B. 腭前神经
- C. 鼻腭神经
- D. 下牙槽神经

E. 颊神经

【答案】 D

4、面神经下颌缘支损伤，临床上可出现的症状是

A. 患侧口角下垂，流口水

B. 同侧面肌麻痹，同侧舌前 2/3 味觉丧失，唾液分泌障碍

C. 鼻唇沟变浅或消失、上唇运动力减弱或偏斜以及食物积存于颊部等症状

D. 眼睑不能闭合

E. 同侧额纹消失

【答案】 A

5、用汽油—空气吹管熔金器熔化中熔合金时，熔化金属的最佳火焰层是

A. 混合焰

B. 燃烧焰

C. 还原焰

D. 氧化焰

E. 还原氧化焰

【答案】 C

6、单侧唇裂，唇红至鼻底未完全裂开属于（ ）。

A. I 度

B. II 度

C. III 度

D. IV 度

E. V度

【答案】 B

7、有抗组胺作用和较强的中枢抑制作用的药物是

A. 异丙嗪

B. 西咪替丁

C. 前列腺素

D. 抗眩啶

E. 扑尔敏

【答案】 A

8、患者，女，8个月，3天前出现轻度发热、流涎、拒食、烦躁不安。昨日出现口腔黏膜广泛充血水肿，有成簇小水疱及小溃疡。今日形成大面积糜烂，患儿疼痛、拒食、哭闹。拟诊断为

A. 疱疹样口炎

B. 多形红斑

C. 原发性疱疹性口炎

D. 复发性疱疹性口炎

E. 重型口疮

【答案】 C

9、下列何种情况不属于烤瓷熔附金属全冠的禁忌证

A. 青少年未发育完成的恒牙

B. 未经治疗的牙髓腔宽大的患牙

C. 深覆

- D. 四环素牙
- E. 患者不配合治疗

【答案】 D

10、孙某是一肝癌晚期患者，现到其住所地的某医疗机构门诊就诊，要求长期使用麻醉药品。

- A. 一级以上医院
- B. 二级以上医院
- C. 三级以上医院
- D. 接诊的医院
- E. 以上都不是

【答案】 B

11、发生光化学烟雾事件的主要污染物是

- A. SO
- B. 烃类和 SO
- C. 烃类和 NO
- D. SO
- E. 颗粒物和烃类

【答案】 C

12、患者，女性，22岁，4天前因劳累出现左侧下后牙龈胀痛，进食吞咽时加重。昨日起出现局部自发性跳痛，面部肿胀，张口受限，伴发热。检查：左侧颊部肿胀，局部皮温增高，压痛明显，局限于咬肌前缘处，并及凹陷性水肿；张口度约二指，左下颌第三磨牙近中低位阻生，牙龈瓣覆盖其上，充血肿胀，

并见糜烂，挤压局部少量脓液溢出。同侧第一磨牙前庭沟丰满充血，压痛存在，第一磨牙叩诊（-），无松动，无龋坏，未及牙周袋。

- A. 根尖脓肿
- B. 牙周脓肿
- C. 根尖囊肿继发感染
- D. 第三磨牙冠周脓肿扩散引起
- E. 颊间隙感染引起

【答案】 D

13、医学模式转变对医师提出的根本性医学伦理学要求是

- A. 学习伦理学
- B. 学习生命价值论
- C. 学习公益理论
- D. 更加关注处于社会关系中的、作为一个整体的患者的人文方面
- E. 注重改变传统的医学道德观念

【答案】 D

14、IL-1 的功能不包括

- A. 促进 T 细胞的增殖
- B. 激活单核-吞噬细胞
- C. 大量 IL-1 进入血流能诱导急性期蛋白
- D. 抑制 NK 细胞
- E. 可作为内源性致热原

【答案】 D

15、两牙之间都以近中面相接触的是

- A. 中切牙与中切牙
- B. 中切牙与侧切牙
- C. 侧切牙与尖牙
- D. 尖牙与前磨牙
- E. 前磨牙与前磨牙

【答案】 A

16、患者左上第一磨牙缺失，左上第二磨牙近中颈部龋洞，诊断为中龋，其制备的洞形为

- A. 邻面的单面洞
- B. 邻
- C. 邻
- D. 邻舌面洞
- E. 邻颊面洞

【答案】 A

17、人体氟最主要的来源是

- A. 动物性食物
- B. 植物性食物
- C. 饮水
- D. 空气
- E. 氟化物的局部应用

【答案】 C

18、正常张口度的简易测量

- A. 检查者示、中、环指三指末节的宽度
- B. 检查者示、中、环指三指中节的宽度
- C. 被检查者示、中、环指三指末节的宽度
- D. 被检查者示、中、环指三指中节的宽度
- E. 被检查者除拇指外的任意三指宽度

【答案】 C

19、下颌骨的薄弱部位不包括

- A. 正中联合
- B. 颞孔区
- C. 下颌角
- D. 乙状切迹
- E. 髁突颈部

【答案】 D

20、预防地方性氟中毒的最根本性措施是

- A. 供给低氟饮水
- B. 减少氟的摄入量
- C. 控制高氟食物的摄入
- D. 防止高氟煤烟的污染
- E. 对高氟水源化学降氟

【答案】 B

21、较大型角化囊肿主要采用

- A. 刮治术
- B. 纯截骨术
- C. 截骨+植骨
- D. 颌骨矩形切除术
- E. 截骨+钛板植入

【答案】 A

22、三羧酸循环中有底物水平磷酸化的反应是

- A. α -酮戊二酸-琥珀酸
- B. 苹果酸-乙酸
- C. 琥珀酸-延胡索酸
- D. 柠檬酸-酮戊二酸
- E. 延胡索酸-苹果酸

【答案】 C

23、下列属于社会行为的是

- A. 性
- B. 母性行为
- C. 好奇
- D. 攻击
- E. 防御

【答案】 D

24、牙瘤的特点是（ ）。

- A. 成牙组织的错构或发育畸形
- B. 良性、单囊或多囊、发生于颌骨内的牙源性肿瘤
- C. 肿瘤生长缓慢，可侵犯包膜，易复发
- D. 有完整包膜，术后很少复发
- E. 良性肿瘤，呈局部浸润性生长

【答案】 A

25、男性，40岁。拟拔除上颌第二磨牙，调整椅位时应

- A. 头后仰至上颌
- B. 头后仰至上颌
- C. 头直立，利用口镜反光操作
- D. 头偏向右侧，以便面对术者
- E. ，头略后仰，利用口镜协助操作

【答案】 B

26、哪颗牙距上颌窦最近

- A. 上颌中切牙
- B. 上颌尖牙
- C. 第三磨牙
- D. 上颌第一磨牙
- E. 上颌第一前磨牙

【答案】 D

27、患者上前牙充填后三天出现自发痛，不敢咬合。查：

- A. 牙髓坏死
- B. 急性牙髓炎
- C. 慢性牙髓炎
- D. 急性根尖炎
- E. 可复性牙髓炎

【答案】 D

28、龋病按发病进展速度可分为（ ）。

- A. 浅、中、深龋
- B. 釉质龋、牙本质龋
- C. 慢性龋、急性龋
- D. 窝沟龋、根面龋
- E. 原发龋、继发龋

【答案】 C

29、否认自己有病，不及时就医是患者角色的

- A. 角色行为强化
- B. 角色行为缺如
- C. 角色行为异常
- D. 角色行为减退
- E. 角色行为冲突

【答案】 B

30、美国一女患者，患有严重的脑综合征、慢性压疮（褥疮）、心脏病、糖尿病等，对环境没有感觉，只有原始的脑功能，有自主呼吸，没有认识、行为能力，且无改善的希望，住院不久即插入鼻饲管以维持生命。她的监护人要求取走鼻饲管，被主管医师拒绝，监护人向法院起诉要求强迫取走，法院同意并下令取走；但受理上诉的法院否定了这个决定，认为中止喂饲就是杀人。3年后，女患者死亡，她的鼻饲管仍保留着

- A. 完全正确
- B. 完全错误
- C. 基本上错误，侵犯了患者家属自主权
- D. 基本上正确，但应弄清患者本人意愿，彻底维护患者权益
- E. 以上都不是

【答案】 D

31、患者，男，28岁，车祸致头面部损伤半小时。查体：意识模糊，烦躁不安，面度轻度发绀，吸气时锁骨上窝、剑突下、肋间隙内陷。面部检查见上颌骨无活动，下牙弓变窄，下前牙骨段活动、后移，口腔内无明显异物。

- A. 缝合时尽量纵缝
- B. 缝合时尽量横缝
- C. 应用细针、细线缝
- D. 仅缝合舌黏膜
- E. 缝合时创距应尽量小

【答案】 A

32、牙膏成分中占比例最高的是

- A. 摩擦剂

- B. 洁净剂
- C. 润湿剂
- D. 芳香剂
- E. 防腐剂

【答案】 A

33、男性，25岁。口腔内上下前牙龈乳头消失并凹陷，呈反波浪形，牙龈间乳头颊舌侧分离，可从牙面翻开，下方有牙石、牙垢，无龈坏死。可能的原因是（ ）。

- A. 疱疹性龈口炎
- B. 中性粒细胞缺乏引起龈坏死
- C. 慢性龈缘炎
- D. 慢性坏死性龈炎
- E. 龈乳头炎

【答案】 D

34、根管治疗时，根尖渗出液多时，应选用（ ）。

- A. 氧化锌丁香油糊剂
- B. 碘仿糊剂
- C. 牙胶尖
- D. 氢氧化钙糊剂
- E. 酚醛树脂液

【答案】 B

35、黏液囊肿

- A. 囊肿位于上颌或下颌中线区
- B. 囊肿含有不同发育阶段牙齿，牙冠一般朝向囊腔
- C. 囊肿常无上皮衬里
- D. 囊肿位于鼻腭管内
- E. 囊肿位于根尖周围

【答案】 C

36、某校儿童食堂食用色泽鲜艳的熟肉制品后出现口唇、指尖青紫，头痛、头晕和无力。

- A. 注射大剂量亚甲蓝
- B. 口服或注射小剂量亚甲蓝
- C. 阿托品
- D. 硫代硫酸钠
- E. 肾上腺皮质激素

【答案】 B

37、不提出需要矫正的问题是

- A. 自由联想
- B. 移情
- C. 厌恶疗法
- D. 非指令性治疗
- E. 放松训练法

【答案】 D

38、临床工作的道德特点

- A. 维护患者利益，但患者利益要先服从社会效益
- B. 开展躯体疾病服务的同时，还要注重经济效益和社会效益
- C. 注重病人的主诉是诊断疾病的主要条件
- D. 发挥医务人员主导性的同时，关注疾病，注意与病人沟通，调动病人的主体性
- E. 与病人的沟通比关注疾病本身更重要

【答案】 D

39、属于流行病学分析性研究的是

- A. 现况调查
- B. 病例对照研究
- C. 观察药物治疗的疗效
- D. 基础实验室检查
- E. 将调查数据建立流行病数学模型

【答案】 B

40、下面关于舌杆的描述，不正确的是

- A. 位于下颌舌侧龈缘与舌系带、黏膜皱褶之间
- B. 下颌舌侧牙槽骨形态呈斜坡型者舌杆应离开黏膜 0.5mm
- C. 下颌舌侧牙槽骨形态呈倒凹型者舌杆在倒凹区之上
- D. 下颌舌侧牙槽骨形态呈垂直型者舌杆与黏膜平行接触
- E. 舌杆上缘应距龈缘 3~4mm

【答案】 B

41、继发性龋形成的原因如下，除外

- A. 充填物边缘破碎
- B. 使用树脂类材料充填时未进行酸蚀
- C. 治疗中未将病变组织去净
- D. 修复材料与牙体组织不密合
- E. 窝洞周围牙体组织破裂

【答案】 B

42、治疗脊髓损伤引起的肌强直的药物是（ ）。

- A. 苯妥英钠
- B. 地西洋
- C. 异丙嗪
- D. 乙琥胺
- E. 氯丙嗪

【答案】 B

43、患者，52岁。因左下颌骨膨隆6个月余就诊。曲面断层片示左下颌骨体区2cm×3cm的圆形多房低密度影，其分房大小不等，互相重叠，边界清楚，无死骨形成及新骨增生。最可能的诊断是

- A. 牙源性角化囊性瘤
- B. 成釉细胞瘤
- C. 下颌骨骨髓炎
- D. 含牙囊肿
- E. 原发性骨内癌

【答案】 B

44、初戴全口义齿时，发现下颌总义齿左右翘动，加力时患者有痛感。

- A. 缓冲过长基托
- B. 重新制作义齿
- C. 垫底
- D. 缓冲压痛处硬区的基托组织面
- E. 调

【答案】 D

45、排出体内氟的主要途径是

- A. 粪便
- B. 肾脏—尿
- C. 汗腺—出汗
- D. 头发
- E. 指（趾）甲

【答案】 B

46、引起妊娠期龈炎的直接病因是（ ）。

- A. 咬合创伤
- B. 菌斑微生物
- C. 牙石刺激
- D. 妊娠本身
- E. 营养不良

【答案】 B

47、患者，女性，46岁，右下颌第一磨牙金属全冠修复1年余，昨日脱落，于我院求诊。检查发现金属全冠面存在左右孔洞，冠内基牙继发龋，无松动。分析修复体脱落的原因最可能是

- A. 金属选择不当
- B. 咀嚼过硬食物
- C. 粘固剂使用不当
- D. 基牙预备间隙不足
- E. 咬合关系不正常

【答案】 D

48、拔牙时晕厥的处理不恰当的为

- A. 嗅闻刺激性气体
- B. 立即停止手术保持呼吸道畅通
- C. 吸氧
- D. 输液纠正酸碱平衡紊乱
- E. 必要时静脉输注高渗葡萄糖

【答案】 D

49、患儿男，13岁，身体健康。牙龈增生影响咀嚼多年。检查见全口牙龈增生，覆盖牙面2/3以上，质地坚实，其父亲有同样的病史。应诊断为

- A. 药物性牙龈增生
- B. 增生性龈炎
- C. 牙龈纤维瘤病

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/635342244003011200>