

耳鼻喉科知识题库含参考答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、吸气性呼吸困难四凹征指的是

- A、胸骨上窝、锁骨上窝、锁骨下窝和肋间隙的吸气性软组织凹陷
- B、胸骨下窝、锁骨上窝、上腹部和肋间隙的吸气性软组织凹陷
- C、胸骨上窝、胸骨下窝、锁骨上窝和肋间隙的吸气性软组织凹陷
- D、胸骨上窝、锁骨上窝、上腹部和肋间隙的吸气性软组织凹陷
- E、胸骨上窝、锁骨上窝、锁骨下窝和肋间隙的吸气性软组织凹陷

正确答案：D

2、以下哪个不是面神经的分支

- A、岩浅大神经
- B、鼓索神经
- C、岩浅小神经
- D、镫骨肌神经
- E、下颌缘支

正确答案：C

3、40 岁男性，右鼻腔新生物，病理结果为“内翻性乳头状瘤”，其最佳治疗方案是

- A、化疗
- B、根治性切除
- C、分次经鼻腔摘除肿物
- D、放疗
- E、上颌骨切除术

正确答案：B

4、耳声发射临床应用不包括

- A、估计听敏度
- B、耳蜗性聋早期定量诊断
- C、选配助听器
- D、鉴别耳鸣的性质
- E、婴幼儿听力筛选

正确答案：D

5、引起急性鼻炎常见的病毒不包括

- A、冠状病毒
- B、流感病毒

C、EB 病毒

D、腺病毒

E、鼻病毒

正确答案：C

6、有关鼻腔湿润的主要来源，错误的是

A、对呼出气体热湿回收

B、嗅膜下嗅腺分泌液

C、黏膜上皮内杯状细胞的分泌液

D、从毛细血管渗出的液体

E、鼻前庭鼻毛凝结的水汽

正确答案：E

7、鼻中隔血肿和鼻中隔脓肿的鉴别方法是

A、鼻内镜检查

B、CT 或 MRI 检查

C、B 超看鼻中隔内有无积液

D、询问有无手术史并结合前鼻镜检查

E、鼻中隔穿刺

正确答案：E

8、患儿，3 岁，发热 2 天(39℃左右)，咽痛，不敢进食，讲话含糊不清，但无明显声嘶。夜间睡眠时出现呼吸困难，急症就诊。检查见：患儿急性病容，呈 II 度吸气性呼吸困难，口咽部检查无明显异常，肺部无阳性体征，间接喉镜检查不能配合。应首先考虑的诊断是

A、小儿急性喉炎

B、小儿急性扁桃体炎

C、小儿急性会厌炎

D、小儿急性喉气管支气管炎

E、喉白喉

正确答案：C

9、能使声带变短和松弛的肌肉是

A、环杓侧肌

B、环杓后肌

C、甲杓肌

D、杓间肌

E、环甲肌

正确答案：C

10、临床上婴幼儿期较常见的疾病是

- A、咽旁脓肿
- B、急性型咽后脓肿
- C、扁桃体周脓肿
- D、慢性型咽后脓肿
- E、鼻咽纤维血管瘤

正确答案：B

11、下列哪项不符合外科感染特点

- A、常为单一细菌感染
- B、局部症状明显
- C、多为混合感染
- D、受累组织愈合后形成瘢痕
- E、关节感染愈合后影响功能

正确答案：A

12、不能维持正常呼吸运动的是

- A、以上均是
- B、小儿急性喉支气管炎
- C、胸廓开放性损伤
- D、慢性阻塞性肺气肿
- E、重度贫血

正确答案：A

13、有关上颌窦恶性肿瘤，下列选项中错误的是

- A、T4 期肿瘤已侵及筛板
- B、鳞癌最多
- C、可有持续性鼻塞，脓性分泌物有血丝
- D、较易早期发现，预后较差
- E、是鼻窦恶性肿瘤发病率最高的

正确答案：D

14、鼻真菌病中常见的致病菌

- A、念珠菌
- B、曲霉菌
- C、鼻孢子菌
- D、申克孢子菌

E、毛真菌

正确答案：B

15、患者呼吸时发生吹哨声应考虑患有

A、鼻中隔大穿孔

B、鼻中隔前段小穿孔

C、鼻中隔血肿

D、鼻中隔后段小穿孔

E、慢性鼻炎

正确答案：B

16、阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征患者的呼吸暂停指数一般大于

A、15

B、25

C、20

D、10

E、5

正确答案：E

17、气管肿瘤可能有

A、黏脓痰

B、粉红色泡沫状痰

C、痰有臭味

D、大量脓痰

E、痰中带血

正确答案：E

18、多发性鼻息肉多来源于

A、筛窦

B、上颌窦

C、额窦+上颌窦

D、中鼻道

E、中鼻甲

正确答案：A

19、患者，女，24岁，吞服碳酸氢钠数分钟，正确的治疗方法是

A、立即口服适量盐酸，以中和碳酸氢钠

B、立即口服橘汁或分次少量服用食醋

C、早期钡餐透视以确定受伤的程度、位置

D、立即行气管切开术，预防或解除喉阻塞

E、伤后尽早行胃造瘘术，以防营养不良

正确答案：B

20、属于闭合性喉外伤的是

A、接触性肉芽肿

B、喉挫伤

C、喉火器伤

D、环杓关节脱位

E、喉烧灼伤

正确答案：B

21、前鼻镜检查时第一头位观察不到下列哪项结构

A、鼻中隔前下

B、嗅裂

C、下鼻道

D、鼻腔底

E、下鼻甲

正确答案：B

22、脑脊液鼻漏确诊依靠葡萄糖定量分析，其含量需超过

A、30mg/dl

B、40mg/dl

C、20mg/dl

D、10mg/dl

E、50mg/dl

正确答案：A

23、嗅裂积脓一般提示

A、额窦炎

B、全鼻窦炎

C、前组鼻窦炎

D、上颌窦炎

E、后组鼻窦炎

正确答案：E

24、下列关于上切牙至食管各个平面距离的数据中，错误的是

A、以上均不准确

B、左主支气管压迫食管处约 27cm

- C、食管入口约 16cm
- D、横膈处狭窄约 40cm
- E、主动脉弓压迫食管处约 23cm

正确答案：A

25、儿童鼾症最常见的原因是

- A、哮喘
- B、肥胖
- C、鼻窦炎
- D、腺样体肥大和慢性扁桃体炎
- E、支气管肺炎

正确答案：D

26、鼓膜面积比镫骨底板面积大

- A、13 倍
- B、1.3 倍
- C、17 倍
- D、51 倍
- E、22.1 倍

正确答案：C

27、下列疾病中，没有咀嚼障碍的是

- A、面瘫
- B、咬合不正
- C、颞部放线菌病
- D、颞颌关节强直
- E、喉返神经麻痹

正确答案：E

28、发病机会相对较少的鼻窦是

- A、蝶窦
- B、筛窦
- C、额窦
- D、上颌窦
- E、无差别

正确答案：A

29、各类休克的共同点为

- A、四肢湿冷

B、有效循环血量的急剧减少

C、烦躁不安

D、皮肤苍白

E、血压下降

正确答案：B

30、重度阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征（OSAHS）患者经综合治疗后，AHI 为 15 次/小时，症状明显减轻，疗效评定应为

A、有效

B、治愈

C、一般

D、无效

E、显效

正确答案：E

31、经高压蒸汽灭菌的物品一般可保留

A、10 天

B、14 天

C、7 天

D、5 天

E、21 天

正确答案：B

32、青年女性患者，咽部异物感 10 余年，反复发作咽痛，偶伴发热，每年约发作 2~3 次，最符合的诊断是

A、慢性咽炎

B、咽异感症

C、茎突过长

D、慢性鼻咽炎

E、慢性扁桃体炎

正确答案：E

33、根据鼻窦炎海口会议分型分期标准，全组鼻窦炎伴多发鼻息肉属于

A、1 型 2 期

B、2 型 3 期

C、1 型 1 期

D、1 型 3 期

E、2 型 1 期

正确答案：B

34、气管异物最常发生于

- A、7岁以下儿童
- B、6岁以下儿童
- C、10岁以下儿童
- D、1岁以下儿童
- E、3岁以下儿童

正确答案：E

35、咯血是指

- A、以上都对
- B、鼻咽部的血经口排出
- C、消化道内出血，经口吐出
- D、气管、支气管、肺出血经口咳出
- E、牙齿大量出血，成口咳出

正确答案：D

36、关于局限性迷路炎临床表现，错误的是

- A、自发性眼震，快相向患侧
- B、自发性眼震，快相向健侧
- C、听力减退
- D、瘘管试验阳性
- E、阵发性或激发性眩晕

正确答案：B

37、鼻腔局部用药原则中正确的是

- A、应为低渗液
- B、注意滴药的体位和方法
- C、以上都不对
- D、滴剂应为弱碱性
- E、刺激性应小

正确答案：B

38、胸骨上间隙不包括以下哪项

- A、脂肪组织
- B、颈静脉弓
- C、甲状腺下静脉
- D、淋巴结

E、颈前静脉

正确答案：C

39、哪一项不是分泌性中耳炎的病因

A、鼻咽癌

B、免疫反应

C、腭裂

D、航空性中耳炎

正确答案：A

40、可引起吞咽困难的是

A、咽肌痉挛

B、软腭瘫痪

C、咽异感症

D、咽缩肌瘫痪

E、舌咽神经痛

正确答案：D

41、Bezold 三联征指的是

A、低频听阈提高、Rinne 试验阴性、Schwabach 试验骨导延长

B、低频听阈提高、Rinne 试验阴性、Schwabach 试验骨导缩短

C、低频听阈提高、Rinne 试验阳性、Schwabach 试验骨导延长

D、低频听阈降低、Rinne 试验阴性、Schwabach 试验骨导缩短

E、低频听阈降低、Rinne 试验阴性、Schwabach 试验骨导延长

正确答案：A

42、患者男，15岁，鼻咽纤维血管瘤患者，该病的病理表现是

A、由胶原纤维及多核成纤维细胞组成网状基质，其间分布大量管壁薄、无弹性血管

B、空泡细胞和黏液基质，瘤细胞被纤维组织分隔成小叶

C、多为囊性，成单房或多房，囊壁光滑

D、肿瘤由复层鳞状上皮、细胞间桥和角质蛋白构成

E、属于低分化鳞癌

正确答案：A

43、人类在运动中或相对的静止状态下保持身体平衡的因素是

A、小脑

B、前庭、视觉和本体感觉三者的协调

C、视觉

D、本体感觉

E、前庭

正确答案：B

44、梅尼埃病的诊断要点不包括

A、第一次发作眩晕不能诊断梅尼埃病

B、排除了其他系统疾病

C、波动性耳鸣、耳闷胀感

D、反复发作眩晕

E、无听力改变

正确答案：E

45、下列关于全身性外科感染的叙述，哪项是错误的？

A、真菌感染时血培养易发现

B、菌血症是脓毒症的一种

C、外科真菌感染属于条件性感染

D、当代外科感染中，革兰氏阴性杆菌感染已超过革兰氏阳性球菌感染

E、伴有厌氧菌感染时易形成脓肿

正确答案：A

46、下列哪种耳病引起传导性聋

A、先天性聋哑

B、中耳炎

C、噪声性聋

D、膜迷路积水

E、药物中毒性聋

正确答案：B

47、一鼻疖患者突然表现寒战、高热、头剧痛，应首先考虑并发

A、颊部蜂窝织炎

B、脑膜炎

C、海绵窦血栓性静脉炎

D、上唇蜂窝织炎

E、眼蜂窝织炎

正确答案：C

48、患者男，14岁，3天前患上呼吸道感染，后外耳道剧痛，听力下降，耳镜检查可见鼓膜表面和外耳道深部皮肤有数个紫红色的血疱，大小不等，鼓膜充血，最可能的诊断是

- A、坏死性外耳道炎
- B、大疱性鼓膜炎
- C、急性化脓性中耳炎
- D、颈静脉球体瘤
- E、外耳道胆脂瘤

正确答案：B

49、关于纯音听力检查各项中，错误的是

- A、双耳交替响度平衡试验听力曲线的波幅减小，表示重振试验阳性
- B、500~2000Hz 称为“语言音阈”
- C、平均听力损失如大于 30dB，则带来社会生活不便
- D、气骨导间距大于 10dB 提示传导性聋
- E、重振试验阳性表示迷路后聋

正确答案：E

50、患者男，37 岁，鼻塞、流脓涕 10 天，伴眩晕、恶心、呕吐 3 天。检查见患者有自发性眼震，轮替运动不能。鼻内镜检查见鼻腔有较多脓性分泌物。最可能的诊断是

- A、鼻窦炎并脑脓肿
- B、鼻窦炎并硬膜外脓肿
- C、鼻窦炎并硬膜下脓肿
- D、鼻窦炎并脑膜炎
- E、鼻窦炎并海绵窦血栓性静脉炎

正确答案：A

51、青年男性患者，左耳持续流脓 4 个月，脓液有臭味，颞骨 CT 示鼓室及乳突区内软组织团块影，无强化，其边缘浓密，最符合的诊断是

- A、慢性单纯性中耳乳突炎
- B、中耳癌
- C、颞骨骨折
- D、急性中耳乳突炎
- E、慢性胆脂瘤型中耳乳突炎

正确答案：E

52、如一患者有进行性鼻阻塞症状，并伴有鼻出血，血性鼻涕，就考虑

- A、全身因素所致鼻阻塞
- B、慢性鼻窦炎
- C、鼻中隔偏曲

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/666241150032010044>